

Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante à Soultz), soit à Mulhouse (Haut-Rhin).

# CATALOGUE

DES

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante, in Sultz, Oberrhein. Departement), gesandt werden.

## VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,

DISPONIBLES

Pour l'automne de 1846 et le printemps 1847, dans l'établissement d'Augustin et Napoléon BAUMANN, à Bollwiller et Mulhouse, Haut-Rhin (France).

## Preisverzeichniss

Der vorrätigen Gewächse aller Art, die für das Spätjahr 1846 und das Frühjahr 1847 in den Pflanzschulen von Aug. und Nap. Baumann, in Bollwiller und Mülhausen, im Oberrheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

# CATALOGUE

Of all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn 1846, and the Spring of 1847, in the nursery of Augustin and Napoléon BAUMANN, at Bollwiller and Mülhausen, Upper-Rhin-Departement (France).

MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1846.



# EN COMMISSION :

**Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.**

*Le Bon Jardinier*, Almanach pour l'année 1847, par A. PORETTEAU, 1 vol. in-8°, broché . . . . . Fr. 9 »  
 Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . . » 13 »  
 LOISEL, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° . . . . . » 2 »  
 Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.

LINDLEY, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. . Fr. 9 »  
*La Maison de campagne*, par Mad. AGLAÉ ADANSON Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol in-12. . . Fr. 7 »

## OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten = Instrumente und Garten = Geräthe.

ENTREPOSÉS CHEZ AUG. ET NAP. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. Baumann niedergelegt.

|   | fr. | c. |  | fr.  | c.     |   | fr.  | c.     |
|---|-----|----|--|------|--------|---|------|--------|
| 1° Des biches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. <i>Gefährte Gartenpaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form</i> . . . . .  | 5   | 50 | 9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. <i>Decultermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinernem Hest</i> . . . . .   | 2    | 50     | 16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. <i>Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen</i> . . . . .  | 4    | 50     |
| 2° Idem, qualité moyenne. Idem, moyenne forme. . . . .  | 5   | »  | 10° Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form . . . . .  | 1    | 50     | 17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers. <i>Baumsäge zum Spalierschnitt, sehr bequem</i> . . . . .  | 3    | »      |
| 3° Idem, petite qualité. Idem, petite forme . . . . .   | 4   | 50 | ° Idem, petite forme. Idem, petite forme . . . . .   | 1    | 25     | 18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur. <i>Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe</i> . . . . .  | 2 f. | à 3 50 |
| 4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins. <i>Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht</i> . . . . . | 3   | »  | 12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. <i>Besonders bequeme und schön formirte Rosenschneeren, zum Schnitt der Rosen nach ähnlicher Sträucher zu empfehlen</i> . . . . .                               | 5    | »      | 19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme. <i>Nach ganz englischer Forme, kleine Sorte</i> . . . . .   | 2    | 50     |
| 5° Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt . . . . .   | 2   | »  | 13° SECATEUR MIGNOT. Nous recommandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. <i>Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instrument</i> . . . . . | 6    | »      | 20° Idem, pour les pêcheurs. <i>Die Pfirsichbäume zu beschneiden</i> . . . . .  | 3    | »      |
| 6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes. <i>Sehr bequeme Blumenschneeren</i> . . . . .  | 3   | »  | 14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instruments de jardinage. <i>Vortreffliche Weg- oder Streichsteine, um die Gartenmesser oder Garteninstrumente zu schärfen</i> . . . . .  | 1 f. | à 1 50 | 21° Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tellsoni, Verbena, etc. <i>Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagelliformis und andere hängende Pflanzen zu ziehen</i> . . . . . | 1 f. | à 3 50 |
| 7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. <i>Raupenschneeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können</i> . . . . .  | 5   | »  | 15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode. <i>Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequem</i> . . . . .   | 3    | »      | 22° Idem bronzées. Idem bronzirt . . . . .  | 2 f. | à 4 50 |
| 8° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies. <i>Große Haagschneeren, Einfassungen und Häge zu schneeren</i> . . . . .  | 18  | »  |  |      |        | 23° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. <i>Maulwurfsfalle für die Gärten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen</i> . . . . .  | 2    | »      |

Les personnes qui désireraient visiter nos établissements, soit à MULHOUSE, soit à BOLLWILLER, peuvent compter sur une réception honnête; nous ferons notre possible pour leur laisser une impression agréable de leur visite.

### AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de débiller les envois de végétaux de pleine terre dans un état de gelée; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les débiller ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 25 degrés Réaumur, au dessous de glace, ne les atteignent pas.

### Wichtige Nachricht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrorenem Zustande auspacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Drangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nicht.



M

Nous avons l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1846 et le printemps 1847. Nous serions charmés que son inspection vous fournisse matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Par sa publication, notre but principal est de faire connaître aux amateurs les plantes en tous genres de notre établissement, qui occupe une très-grande surface de terrain dans diverses localités et diverses expositions de nos environs, selon le besoin des végétaux, de manière à ce que chaque espèce se trouve placée le plus convenablement possible pour sa belle venue et sa réussite à la transplantation.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligerons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause, il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources de bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les *Mélèzes*, *Pins de Corse*, *Pins d'Écosse*, de *Riga*, etc. Les *Pins* de l'Amérique et ses nombreuses espèces de *Chênes*, élevés sans abri et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur fleuraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, les *Azaleas*, les *Kalmias*, les *Magnolias*, les *Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Roses remontantes*, *Bengales*, *Mousseuses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc.; généralement toutes les plantes qui, soit par leur fleuraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines, toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, tant celui de Mulhouse que de Bollwiller, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompt expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettants la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commander, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Nous nous servons, dans leur

Mr.

Nous avons l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1846 et le printemps 1847. Nous serions charmés que son inspection vous fournisse matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Der Hauptzweck bei dessen Ausgabe ist, den Liebhabern die Gegenstände von allen Gattungen bekannt zu machen, welche sich auf den verschiedenen Theilen unserer weitläufigen Anlagen, nach Verhältniß des Bodens und der Lage die jedem am zuträglichsten ist, zerstreut finden; jeder Gattung dieser Pflanzen findet sich diejenige Lage angewiesen, deren größte Zweckmäßigkeit am geeignetsten ist ihr erwünschtes Fortkommen und gedeihlichen Wachsthum nach der Verpflanzung zu bestimmen.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unsrer Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu vernachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgesetzten Lage; dadurch sind die im Freien erzogenen Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zu Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hiedurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die *Fichten* Amerika's und dessen zahlreiche *Eichengattungen*, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen versetzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachsthum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Wuchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge *Allee- und Zierbäume*, von jeder Stärke und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von Zierbäumen und Gesträuchen sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechselndsten Zusammenstellungen in der Art. Die zarten und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen versehen; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverlässig fort.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschaun, welche die Verwunderung der Kenner erregt.

Bäume und Gesträuche in freier Heidenerde, als *Azaleen*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Magnolia*, etc., etc.

Eine zahlreiche Sammlung von immerblühenden *Bengale-*, *Moos-* und andern *Rosen*; sowohl wurzelachte als auch auf Hoch- und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten Orangerie- und Warmhauspflanzen, etc.

Von *Camellien*, alle anerkannt besten Varietäten; wir sagen alle anerkannt besten, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangen*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönsten was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis*, *Plox*, *Viola altaica major*, *Aster*, *Paeonia*, etc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse-, Wald- und andern Samereien aus den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Etablissements bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Straßburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichkeit zur schnellsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die



intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente: dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes, excepté aux arbres fruitiers; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement; ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes.

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

Nous entreprenons la plantation de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

schleunigste und im Verhältniß billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohl erhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag erteilt wird, die Obstbäume ausgenommen; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

Wir befragen uns unentgeltlich mit Befragung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeltliche Zugabe aufgewogen.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl, wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen, nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

## PREMIÈRE DIVISION.

### ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de nous donner les renseignements suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieure.

## Erster Abschnitt.

### Frucht- oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben :

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, ob es Pyramiden-, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pfirsich auf Mandeln, oder Pflaumen, die Kirschen auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Äpfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich unterragt.

## PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 60 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.

#### HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.

|  | ORDINAIRE. | GRANDE. | CHOISIE. |
|--|------------|---------|----------|
| ABRICOTIERS et PÊCHERS, la pièce . . . . .   | » »        | 1 50    | » »      |
| PÊCHERS, franc-pied, pêche de vigne et pêchers à fruit rouge, pour confire . . . . . | » »        | 1 »     | » »      |
| CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .                                  | » 80       | 1 »     | 1 25     |
| CERISIERS et POMMIERS en mélange et sans noms. o/o                                   | 50 »       |         |          |

#### MI-VENTS OU MI-TIGES.

|   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| CERISIERS. POIRIERS greffés sur coignassiers et sur francs. POMMIERS greffés sur doucins et sur francs. PRUNIERS. . . . . | » 80 | » 90 | 1 » |
|---|------|------|-----|

#### PYRAMIDES OU QUENOUILLES.

|   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . . | » 50 | » 60 | » » |
|---|------|------|-----|

#### ESPALIERS.

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| ABRICOTIERS et PÊCHERS. . . . .                     | » »  | 1 »  | 1 25 |
| Mélange . . . . . o/o                               | 50 » | » »  | » »  |
| CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . . | » 50 | » 60 | » »  |

#### ARBRES-NAINS.

|   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| ABRICOTIERS et PÊCHERS. . . . .                     | » »  | 1 »  | » » |
| Mélange . . . . . o/o                               | 50 » | » »  | » » |
| CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . . | » 50 | » 60 | » » |
| POIRIERS, mélange. . . . . o/o                      | 25 » | » »  | » » |
| POMMIERS, mélange . . . . . o/o                     | 25 » | » »  | » » |

SAUVAGEONS, pommiers francs, élevés de pepins . . . le 1000 20 fr.

## Preise der Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet, mit besonderm Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukate zu 11 Fr. 60 C., der Rthlr. zu 3 Fr. 60 C., und der Gulden im 24 fl. Fuß zu 2 Fr. 10 C., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.

#### Hochstämmige oder Luftbäume.

|  | Ge- wöhnliche. | Große. | Auserlesene Stärke. |
|--|----------------|--------|---------------------|
| Fr. C.   | Fr. C.         | Fr. C. |                     |
| Abrikosen- und Pfirsichbäume . . . . .                           | » »            | 1 50   | » »                 |
| Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche . . . . . | » »            | 1 »    | » »                 |
| Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .             | » 80           | 1 »    | 1 25                |
| Äpfel- und Kirschbäume im Rummel und ohne Namen o/o              | 50 »           |        |                     |

#### Halbstämmige oder halbohe.

|  |     |      |     |
|--|-----|------|-----|
| Äpfel auf St.-Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirschen auf Pflaumen . . . . . | » 8 | » 90 | 1 » |
|--|-----|------|-----|

#### Pyramiden oder Kunkeln.

|  |      |      |     |
|--|------|------|-----|
| Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . . | » 50 | » 60 | » » |
|--|------|------|-----|

#### Spalier- oder Geländerbäume.

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| Abrikosen und Pfirsiche . . . . .                    | » »  | » »  | 1 25 |
| Rummel . . . . . o/o                                 | 50 » | » »  | » »  |
| Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . . | » 50 | » 60 | » »  |

#### ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.

|  |      |      |     |
|--|------|------|-----|
| Abrikosen und Pfirsiche . . . . .                    | » »  | 1 »  | » » |
| Rummel . . . . . o/o                                 | 50 » | » »  | » » |
| Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . . | » »  | » 60 | » » |
| Äpfel, Rummel . . . . . o/o                          | 25 » | » »  | » » |
| Birnen, Rummel. . . . . o/o                          | 25 » | » »  | » » |

Wildlinge, Äpfel, aus Kernen gezogen . . . . . das 1000 20 Fr.



# FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.

## ABRICOTIERS. — Abrikosenbäume.

Ceux marqués d'un \* peuvent être fournis en haut-vent.  
Die mit \* bezeichneten Sorten können hochstämmig abgegeben werden.

|  | MATURITÉ.      |
|--|----------------|
| ABRICOT alberge (Duhamel), Alberge=Abrikose. . . . .   | Mi-Août.       |
| de Tours. Tourser Alberge=Abrikose. . . . .  | Août.          |
| * d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité.<br>Elfsäffer, neue, erster Qualität. . . . .                         | Mi-Août.       |
| Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois . . . . .   | Idem.          |
| blanc, le gros (Duhamel). Große weiße . . . . .  | C. de Juillet. |
| * commun ou ordinaire (T. Obst.). Gemeine weiße . . . . .  | C. d'Août.     |
| hâtif musqué (Duhamel). Frühe Mustateller . . . . .  | Fin Juin.      |
| de Hollande, Amande d'Aveline, abricot de Bréda<br>(Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas . . . . .           | Mi-Juillet.    |
| * de Nancy, autrefois abricot-pêche ou de War-<br>temberg (Duhamel). Ranziger, ehemals Pfirsich=<br>Abrikose . . . . . | Mi-Août.       |
| Musch Musch. Musch=Musch. . . . .  | Idem.          |
| noir. Schwarze. . . . .  | Idem.          |
| * précoce, le gros (Mayer). Große frühe. . . . .   | Mi-Juillet.    |
| * panaché (T. Obstg.). Bunte oder gescheckte . . . . .   | C. d'Août.     |
| royal. Königlische. . . . .  | Idem.          |

## CERISIERS. — Kirschbäume.

NB. Les espèces de Cerisiers marquées d'un \* seront four-  
nies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées  
d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Ste-Lucie,  
préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

NB. Die mit \* bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig  
auf Wildstämme veredelt; die mit † bezeichneten, hochstämmig auf  
Wildstämme, und niederstämmig auf Prunus Mahaleb veredelt  
abgegeben.

|   |                |
|---|----------------|
| * † ANGLAISE tardive (nouv. espèce). Späte englische Kirsche. . . . .   | Fin Juillet.   |
| * † ANGLETERRE hâtive, May-Ducke (Mayer), Frühe eng-<br>lische Kirsche . . . . .  | Mi-Juin.       |
| * † BELLE grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von<br>Ardèche. . . . .  | Mi-Juillet.    |
| * † BIGARREAU blanc (Duhamel). Weiße Herz-kirsche . . . . .   | C. de Juillet. |
| * † de Mai. Mai=Herz-kirsche. . . . .   | Fin Mai.       |
| * Laurmann ou Bigarr. Napoléon (T. Obstg.).<br>Laurmanns=Herz-kirsche, Napoléons=Herz-kirsche . . . . .   | Mi-Juillet.    |
| * noir, le gros. Große schwarze Herz-kirsche . . . . .  | Idem.          |
| * rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor=<br>Herz-kirsche . . . . .   | Idem.          |
| * † BRUNE de Bruxelles, Amarelle du nord, ou Griotte de<br>Hollande (Christ.). Brüsselsche braune, Nordamarelle oder<br>holländer Weichsel. . . . . | C. d'Août.     |
| * CERISE coularde ou griotte de Hollande (Mayer). Hollän-<br>der Weichsel . . . . .   | Fin Juin.      |
| * † de Spa, ou belle de Châtenay (nouv. espèce).<br>Schöne von Châtenay (neu und vorzüglich). . . . .   | Mi-Juillet.    |
| * † d'Elton (nouv. espèce). Eltoner Kirsche. . . . .  | Idem.          |
| * † d'Ostheim (Christ.). Ostheimer Weichsel . . . . .   | Fin Juillet.   |
| * † de Ravaen (nouv. espèce). Ravaener Kirsche. . . . .   | Idem.          |
| * † de Soissons. Soissoner Kirsche . . . . .  | Idem.          |
| * † tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duha-<br>mel) Prunus semper florens Wildenow. Aller=<br>heiligen Kirsche . . . . .                         | Août. Oct.     |
| * † DOUBLE natte (Christ.) Doppelte Natte . . . . .   | Mi-Juin.       |
| * † GRIOTTE d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel . . . . .   | C. de Juillet. |
| * † de Kleparow, ou la bonne polonaise, de<br>Gallicie. Kleparower oder polnische Weichsel. . . . .   | Juillet.       |
| * † GUIGNE blanche, la grosse (Duhamel). Große weiße Fleisch-<br>kirsche. . . . .   | Mi-Juin.       |
| * écarlate. Scharlach-kirsche . . . . .   | Idem.          |
| * jaune (Christ). Gelbe, Fleisch- oder Schwefelkirsche . . . . .  | Mi-Juillet.    |
| * noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleischkirsche,<br>die frühe. . . . .   | Mi-Juin.       |
| * royale double, ou royale grande. Große könig-<br>liche Fleischkirsche . . . . .   | Idem.          |
| * † MONTMORENCY à courte queue, ou gros Gobet (Mayer)<br>Kurzstielige Montmorency, oder englische<br>Weichsel. . . . .                              | Mi-Juin.       |
| * † à longue queue (C. de Char.). Lang-<br>stielige Montmorency. . . . .  | Fin Juin.      |
| * Nouvelle d'Angleterre, grosse cerise rouge-pâle, Duha-<br>mel? (C. de Char.) Neue englische . . . . .   | Idem.          |
| * TURKINE (Christ.). Turtine . . . . .  | Fin Juillet.   |

## PÊCHERS. — Pfirsichbäume.

NB. Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies

greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un \*  
seront aussi fournies à haute tige; celles marquées A greff-  
ées sur amandiers seulement.

NB. Die mit † bezeichneten Sorten können auf Mandel- und  
Pflaumenstämme veredelt abgegeben werden; die mit \* bezeichneten  
sind auch als Hochstämme veredelt; die mit A bezeichnet auf Man-  
deln nur.

|   |             |
|---|-------------|
| * ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne . . . . .  | Mi-Sept.    |
| ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran=Pfirsich oder<br>gelbe Alberge . . . . .                           | C. d'Août.  |
| AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe<br>frühe . . . . .                                      | Idem.       |
| * BELLE de Beaucaire (nouv. espèce). Die Schöne aus Beau-<br>caire . . . . .                                    | C. de Sept. |
| BRIGNON violet musqué (Mayer). Violette nackte Mustateller . . . . .  | Idem.       |
| * BOURDINE, Boudine (Duhamel). Burdiner . . . . .   | Mi-Sept.    |
| * CHANCELIERE (Duhamel). Ranzler . . . . .  | C. de Sept. |
| * † CHEVREUSE hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin . . . . .  | Fin d'Août. |
| DOUBLE de Troyes, ou petite Mignonne (Duhamel). Kleine<br>Prinzessin . . . . .                                  | Idem.       |
| GROSSE bonne. Große gute . . . . .  | Fin Sept.   |
| * † GROSSE mignonne, veloutée de Merlet (Mayer). Prin-<br>zessin . . . . .                                      | Fin d'Août. |
| * † hâtive (Bon Jard). Frühe Prinzessin . . . . .   | C. d'Août.  |
| * † MADELEINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen . . . . .   | Mi-Août.    |
| * † de Bollwiller (nouvelle espèce) Bollwiller<br>Magdalenen. . . . .   | Août.       |
| * † rouge, ou Madeleine de Courson, paysanne<br>(Duhamel). Rothe Magdalenen . . . . .                           | Mi-Sept.    |
| MONSTRUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Ca-<br>mus, grand Melocoton (Duhamel). Ungeheure große . . . . . | C. d'Oct.   |
| * † MONTAGNE précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe<br>Montagne, die große. . . . .                        | Mi-Août.    |
| PAVIE jaune ou de la Madeleine (Duh.). Gelber Hörtling . . . . .  | Fin Sept.   |
| de Newington (C. de Char.). Weißer Newingtons Hört-<br>ling . . . . .   | C. d'Août.  |
| PÊCHE Favier (nouvelle espèce). Favier's . . . . .  | Septembre.  |
| d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach<br>blühend. . . . .                                     | Idem.       |
| d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon<br>Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Hörtling . . . . . | Idem.       |
| * † de Malte, belle de Paris (Duhamel). Malttheser . . . . .  | Mi-Sept.    |
| * de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein<br>gezogen. . . . .   |             |
| PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen Pfirsich,<br>die gewöhnliche. . . . .                         | Fin Sept.   |
| * † POURPRÉE hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe groß-<br>blumige Purpurpfirsich . . . . .                 | C. d'Août.  |
| * † vineuse (Duhamel). Weinige Purpur . . . . .   | Fin d'Août. |
| * † ROYALE, Boudine (Duhamel). Königlische. . . . .   | Fin Sept.   |
| * SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut=Pfirsich . . . . .  | Mi-October. |
| elevée de noyaux. Aus Stein gezogen. . . . .  | Idem.       |
| * TÊTON de Vénus (Duhamel). Venus=Brust . . . . .   | Idem.       |
| A VIOLETTE hâtive, la petite (Duhamel). Kleine frühe Vio-<br>lette . . . . .                                    | C. de Sept. |
| A la grosse, temple nectarine (Duham.). Große<br>frühe Violette. . . . .  | Idem.       |

## PRUNIERS. — Pflaumenbäume.

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch- und niederstämmig.

|  |             |
|--|-------------|
| ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Abrikosenpflaume . . . . .  | C. de Sept. |
| BRICETTE (Duhamel). Brijette. . . . .  | Sept. Oct.  |
| COUETSCHÉ, Quetsche, prune d'Allemagne, la commune<br>(Christ) Gemeine Zwetsche . . . . .  | Août. Oct.  |
| de Brème (Christ). Bremer Zwetsche . . . . .   | Idem.       |
| d'Italie, un des fruits à noyau les plus recom-<br>mandables (nouvelle espèce). Italiänische oder<br>Fellenberger Zwetsche, eine der empfehlungswür-<br>digsten Steinobstfrüchte . . . . . | Août.       |
| DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascener=<br>pflaume . . . . .   | Fin d'Août. |
| le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascener . . . . .   | Septembre.  |
| de Tours (Duhamel). Große Tourser . . . . .  | Mi-Juillet. |
| violet (Duhamel). Violette, Tourser, Vielerpflaume. . . . .  | Idem.       |
| DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre . . . . .  | C. de Sept. |
| DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume<br>oder Meßer Mirabelle . . . . .  | Mi-Août.    |
| GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe<br>Eierpflaume . . . . .   | C. de Sept. |
| rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eier-<br>pflaume . . . . .  | Fin d'Août. |
| HULINGS superbe, gloire de New-York. New-Yorks Wunder. . . . .   | Août.       |
| IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiser=<br>pflaume . . . . .  | Mi-Juillet. |



|  | MATURITÉ.     |
|--|---------------|
| JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume . . . . .           | Fin de Juill. |
| MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle . . . . .                                       | Mi-Août.      |
| rouge (C. de Baum.). Rothe . . . . .   | C. d'Août.    |
| tardive (Quintinye). Späte Mirabelle . . . . .   | Mi-Sept.      |
| PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon . . . . .                                       | C. de Sept.   |
| blanc (Christ.). Weiße . . . . .   | Fin d'Août.   |
| PRUNE Abricot (nouvelle espèce). Abrikosen-Pflaume . . . . .                               | Septembre.    |
| d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'og.). Agener-Pflaume . . . . .         | Août. Sept.   |
| d'Autriche, ou Prune datte (Mayer). Dattenschwetsche oder ungarische Pflaume . . . . .     | Mi-Juillet.   |
| de Berlin. Berliner-Pflaume . . . . .  | Août. Sept.   |
| de Jérusalem, violette . . . . .   | Août.         |
| Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschen-Pflaume . . . . .                                       | Fin d'Août.   |
| de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume . . . . .   | Juill. Août.  |
| de Monsieur, hâtive (Duh.). Frühe Herzogs-Pflaume . . . . .                                | Fin de Juill. |
| REINE-CLAUDE, la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Große grüne Reine-Claude . . . . . | Août.         |
| violette (C. de Char.). Blaue oder violette . . . . .                                      | Mi-Sept.      |
| ROYALE (Duhamel). Königliche Pflaume . . . . .   | Mi-Août.      |
| de Tours (Duhamel). Königliche aus Tours . . . . .   | Fin de Juill. |
| SAINTE-CATHERINE (Duhamel). Sanct-Catharinepflaume . . . . .                               | Mi-Sept.      |

## FRUITS A PEPINS. — Kernobstsorten.

### POIRIERS. — Birnbäume.

NB. Les espèces de Poiriers marquées d'un \* et de \*\* peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs et sur coignassiers, excepté en mi-vents sur coignassiers; ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de \* et \*\*. Dans cette dernière catégorie, ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, on fournira des basses tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de \* et \* seront fournies en hautes et basses tiges; celles marquées d'une † seulement, à basses tiges sur francs. Enfin, les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour faire du poiré exquis et abondant.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Birnensorten können in allen Qualitäten, auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit \* und \*\* bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit \* und † bezeichneten Sorten, sind hoch- und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben; die nur mit † bezeichneten, niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten den besten und meisten Birnenmost.

|   |             |
|---|-------------|
| *** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Geseignete oder Liebesbirne . . . . .    | C. de Sept. |
| † * AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne . . . . .             | Fin d'Août. |
| ** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen . . . . .              | Nov. Mars.  |
| P * † Baum'sche Birne (Stuttgart). . . . .  | Sept. Oct.  |
| ** BELLE et bonne (Christ.). Schöne und gute . . . . .                                | Septembre.  |
| * BERGAMOTTE d'Angleterre (Christ.). Englische Bergamotte . . . . .                   | Sept. Oct.  |
| ** Crasanne (Duhamel). Crasanne . . . . .   | Nov. Déc.   |
| * † de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte . . . . . | Mai. Juin.  |
| † nonpareille (Christ.). Unvergleichliche Bergamotte . . . . .                        | Novembre.   |
| * † de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte . . . . .                                   | Janv. Mars. |
| ** rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte . . . . .              | Oct. Déc.   |
| * † de Soulers, ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte . . . . .          | Fév. Mars.  |
| P * † BERGLER (A. Freud.). Bergler . . . . .  | Octobre.    |
| ** BÉZY de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne . . . . .      | Nov. Fév.   |
| * † d'Héry (Duhamel). Rummelbirne . . . . .   | Oct. Déc.   |
| * † de Montigny (Duh.). Wildling aus Montigny . . . . .                               | Sept. Oct.  |
| *** de La Motte. Wildling von La Motte . . . . .                                      | Idem.       |
| † BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne . . . . .                                     | Octobre.    |
| † d'Andousson (Duhamel). Andousson's . . . . .  | Octob. Nov. |
| * † d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger . . . . .                                      | Nov. Déc.   |

|   | MATURITÉ.   |
|---|---|
| * † BEURRÉ d'Argenson, B. Beauchamp (nouv. espèce). Argenson's, Regentin . . . . .  | Nov. Déc.   |
| Passe-Colmar gris, Souveraine . . . . .   | Avril. Mai.                                       |
| † de Bollwiller. Bollwiller . . . . .   | Avril. Mai.                                       |
| ** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi (Duhamel). Weiße Butterbirne . . . . .  | Octobre.  |
| * † d'hiver. Winter . . . . .   | Déc. Mars.  |
| ** Gris, le Beurré (Duhamel). Graue . . . . .   | Sept. Oct.  |
| ** romain (Christ.). Römische . . . . .   | Fin Sept.   |
| *** van Marum. Van Marum's . . . . .  | Oct. Nov.   |
| ** BON CHRÉTIEN d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer-Gute-Christenbirne . . . . .   | C. de Sept.                                       |
| * † d'hiver (Duh.). Winter-Gute-Christb. . . . .  | Janv. Mai.  |
| P * † BRATBIRNE, à feuilles luisantes (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christ's Champagner-Weinbirne . . . . .                                     | Sept. Oct.  |
| P * † CARAZI de Metz. Carazi aus Metz . . . . .   | Octobre.  |
| *** CHEMINETTE. Cheminetsbirne . . . . .  | Déc. Janv.  |
| *** CHAIR A DAME, Chère Adame (Duhamel). Damenbirne . . . . .   | Août.   |
| *** CITRON de Sierentz (Christ.). Sierenger Citronenbirne . . . . .   | Juillet.  |
| ** CLOU-MARCEAU, excellent fruit. Köstliche Frucht . . . . .  | Fin Déc.  |
| *** COLMAR épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige . . . . .   | Déc. Mars.  |
| † CUISSE Madame (Duhamel). Francischtel . . . . .   | Fin Juillet.                                      |
| *** la grosse (Christ.). Große . . . . .  | Idem.   |
| * † DEUX fois l'an (Christ.). Zweimal tragende . . . . .  | Juillet. Oct.                                     |
| † DOUBLE calice, Poire à deux têtes (Pom. aust.). Zweibügler, Zweifeldige . . . . .   | Août. Sept.                                       |
| *** DOUBLE fleur, <i>Pyrus communis flore pleno</i> , Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne . . . . .   | Févr. Avril.                                      |
| * † DOYENNÉ gris (Duhamel). Graue Doyenne . . . . .   | Novembre.   |
| * † DUCHESSE d'Angoulême. Herzogin von Angoulême . . . . .  | Décembre.   |
| ** ECHASSERY, ou Bezy de Chassery (Duh.). Jagdbirne . . . . .   | Nov. Janv.  |
| ** EPARGNE, Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ., Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.) . . . . . | F. Juil. Août.                                    |
| ** EPINE d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommer-dorn oder schmelzende Mustatellerbirne . . . . .  | C. de Sept.                                       |
| * † d'hiver (Duhamel). Winterdorn . . . . .   | Nov. Janv.  |
| P * † FÄSSLIBIRNE (Suisse). Fästlibirne . . . . .   | Octobre.  |
| † FRANCHIPANNE (Duhamel). Franchipanne . . . . .  | Idem.   |
| * † Hofgeil . . . . .   | Déc. Mars.  |
| *** IMPÉRIALE, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub . . . . .   | Mars. Avril.                                      |
| * † KLOTZBIRNE (d'Alsace). Klotzbirne . . . . .   | Décembre.   |
| * † KRAMELSEBIRNE (d'Alsace). Kramelsbirne . . . . .  | Déc. Janv.  |
| * † LEDERBIRNE (d'Alsace). Lederbirne . . . . .   | Idem.   |
| * † MARGUERITE, la grosse, Poire hâtive (au Sandgau). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne . . . . .  | Août.   |
| ** MARQUISE (Duhamel). Marktgrafenbirne . . . . .   | Nov. Déc.   |
| ** MARTIN Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne . . . . .  | Nov. Janv.  |
| * † MARTIN Sir (Duhamel). Martin Sirbirne . . . . .   | Janv. Févr.                                       |
| ** MESSIRE Jean (Duhamel). Junterhansenbirne . . . . .  | Oct. Nov.   |
| * † MUSCAT petit, ou Sept en guenle (Duhamel). Kleine Mustatellerbirne . . . . .  | C. de Juillet.                                    |
| * † allemand (Duh.). Deutsche Mustatellerbirne . . . . .  | Mars. Mai.  |
| * † OESTERLING (Christ.), oder Faulenzer . . . . .  | Idem.   |
| * † POIRE au lard (Manger). Speckbirne . . . . .  | Août. Sept.                                       |
| ** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne . . . . .  | Janv. Avril.                                      |
| P * † de fer, à cuire (Manger). Schollen- oder Eisenbirne, Kochbirne . . . . .  | Déc. Févr.  |
| * † de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Waldb- oder Grauegute Birne . . . . .   | Fin Août.   |
| * † fortunée. Fortune . . . . .   | Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante. |
| * † de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duh.). Magdalena, oder Carmeliter-Citronenbirne . . . . .   | Juillet.  |
| * † de Kienzheim (Hl-Rhin). Kienzheimer Wegbirne . . . . .  | Septembre.  |
| * † de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltsebirne . . . . .   | Déc. Janv.  |
| * † de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnel'sche Birne . . . . .  | Août.   |
| * † Napoléon (Bruxelles). Napoleonsbirne . . . . .  | Oct. Nov.   |
| * † Nippse . . . . .  | Janv. Mars.                                       |
| * † pomme (Bruxelles). Apfelbirne . . . . .   | Idem.   |
| * † d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Besenbirne, Drehterbirne . . . . .   | Août.   |
| *** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Große Zwiebelbirne . . . . .   | Idem.   |
| * † de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne . . . . .  | Mi-Juillet.                                       |
| P * † au vin (Stuttgart). Weinbirne . . . . .   | Septembre.  |
| * † REINE d'hiver. (Stuttgart) Wintertönigin . . . . .  | Nov. Mars.  |
| * † RIEDBIRNE. Riechbirne . . . . .   | Déc. Mars.  |
| ** ROUSSELET, le gros (Duhamel). Die große . . . . .  | Sept. Oct.  |
| * † d'hiver (Duhamel). Winterrousselet . . . . .  | Févr. Mars.                                       |



|   | MATURITÉ.          |
|---|--------------------|
| * † ROUSSELET panaché. Sundgeschedte Rousselet . . . . .  | Septembre.         |
| ** de Rheims (Duhamel). Rheimscher Rousselet . . . . .  | Août. Sept.        |
| * † de Stuttgart (Christ.). Geißhirslebirne . . . . .   | Mi-Août.           |
| P* † ROUSSETTE (Haut-Rhin). Rôthelsbirne . . . . .  | Mars. Avril.       |
| ** ROSTIEZER . . . . .  | Août.              |
| * † ROYALE d'hiver (Duhamel). Königl. Winterbirne . . . . .   | Déc. Févr.         |
| P* † SAINT GALL, Poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne . . . . .                           | Déc. Mars.         |
| ** SAINT-GERMAIN, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermannsbirne . . . . .                              | Nov. Avril.        |
| ** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermannsbirne . . . . .                                      | Idem.              |
| * SANGUINOLE (Duhamel). Blutbirne . . . . .   | Août.              |
| * † SARAZIN (C. de Char.). Sarazenerbirne . . . . .   | D'un an à l'autre. |
| * † de Duhamel (Duhamel). Duhamels Saraz. . . . .   | Idem.              |
| † SEAKLEPEAR, Lamas, une des meilleures poires. Seaklebirne, eine der vorzüglichsten Birnen . . . . . | Septembre.         |
| P* † SEILE-BIRNE (Duhamel). Seilebirne . . . . .  | Octobre.           |
| ** SUCRÉE verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne . . . . .  | Août.              |
| *** d'Hoyerswerde (Christ.). Große Hoyerswerder Zuckerbirne . . . . .                                 | Fin Août.          |
| * † de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne . . . . .   | Août. Sept.        |
| * † SYLVANGE, Bergamotte Sylvange (Christ). Sylvansbirne . . . . .                                    | F. Oct. Nov.       |
| * † TRUITE (Christ.). Forellenbirne . . . . .   | Sept. Oct.         |
| *** VERTE longue d'automne, ou Mouille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saftbirne . . . . .       | Octobre.           |
| ** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne . . . . .                    | Idem.              |
| ** VIRGOULEUSE (Duhamel). Virgouleuse . . . . .   | Nov. Janv.         |
| P* † ZANKERSBIRNE (à Const.) Wasserbirne, Zankersbirne . . . . .                                      | Sept. Oct.         |

### POMMIERS. — Apfelbäume.

NB. Les espèces de Pommiers marquées d'une \* et de \*\*, peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St.-Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, qui ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de \*\*; celles d'une †, en basses-tiges greffées sur sauvageons; celles marquées d'une \* et d'une †, en hautes et basses-tiges sur francs; celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent être qu'en basses-tiges sur Pommiers St.-Jean et Paradis. Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten, auf Wildling-, St.-Johannis und Paradis-Stämme veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit \*\* bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge; die mit \* und † bezeichneten, hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt; die unbezeichneten, nur niederstämmig auf St.-Johann und Paradisstämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

|  |                    |
|--|--------------------|
| * API (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duham.) . . . . .  | Déc. Avril.        |
| Api, der große, oder Rosenapfel . . . . .  | Déc. Mars.         |
| * le petit (Duhamel) Kleine Apiapfel . . . . .   | Nov. Mars.         |
| * † Aportsapfel . . . . .  | D'un an à l'autre. |
| C* † Bohnapfel, der große (Christ.) . . . . .  |                    |
| * † BORSDOERFER, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde T. Obstg.). Winter-Borsdörfer, Raschanzterl in Oestreich . . . . . | Déc. Avril.        |
| * † Ognoniforme (T. Obstg.) Zwiebelborsdörfer . . . . .  | Idem.              |
| ** CALVILLE blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerkalwil . . . . .   | Août. Sept.        |
| † carmin . . . . .   | Janvier.           |
| ** d'hiver (Duhamel). Weißer Winterkalwil . . . . .  | Déc. Avril.        |
| ** rouge d'automne (Duham.). Rother Herbstk. . . . .   | Oct. Déc.          |
| ** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil . . . . .  | Nov. Janv.         |
| C* † CITRON (C. St.-Gall). Citronenapfel, Hausmütterchen, Ustcrapfel . . . . .   | Déc. Févr.         |
| * † EMPEREUR Alexandre de Russie . . . . .   | Nov. Mars.         |
| * † ESOPUS Spitzenberg . . . . .   |                    |
| C* † GRAUCH aigre (Canton Berne). Grauch der saure . . . . .   | Déc. Mars.         |
| C* † JEAN HURE (Bon Jard.). Johann Hure's . . . . .  | Octobre.           |
| * † König Wilhelm . . . . .  | Déc. Avril.        |
| C* † Luiten=Apfel (Stuttgart) . . . . .  | Nov. Avril.        |
| * MARGUERITE (Manger). Margarethen=Apfel, rother Jakobsapfel . . . . .   | Juillet.           |
| C* † MATHAPFEL à fleurs tardives (Christ.). Mathapfel, der spätblühende . . . . .  | Nov. Mars.         |
| MÉNAGÈRE, la plus grosse de toutes les pommes (T. Obstg.) Hausmütterchen oder Niesenapfel . . . . .                      | Oct. Nov.          |

|  | MATURITÉ.          |
|--|--------------------|
| ** MONSTRUEUSE, ou Gloria mundi, Glory of York . . . . .   | Nov. Mars.         |
| ** NÈGRE doré (Christ.). Goldmohr . . . . .  | Déc. Avril.        |
| * Paschapel oder Ostertalwil . . . . .   | Nov. Mars.         |
| * † PAWLKOWSKI . . . . .   | Idem.              |
| ** PEPIN d'or, ou Pomme d'or (Duhamel) Goldpepin . . . . .   | Déc. Mars.         |
| * POMME d'Astrakhan, ou transparente (Christ.). Astrakhanischer Zitapfel . . . . .   | Août.              |
| C* † d'Advent (au Sundgau). Adventapfel (Diel), kurzer Muser, Vaterapfel . . . . .   | D'un an à l'autre. |
| * † de Bâle (au Sundgau). Neugler, Bräutiger oder Mäucherapfel . . . . .   | Déc. Mai.          |
| * † Boutigné. Boutigneapfel . . . . .  | Déc. Mars.         |
| carrée, ou d'Alente (Christ.). Alent . . . . .   | Nov. Mars.         |
| C* † châtaigne du Léman (en Thur.) Frauenrothacher . . . . .   | Déc. Juin.         |
| C* † double rouge du Paradis (Christ.). Doppelter rother Paradiesapfel . . . . .   | Déc. Mai.          |
| * † Frangée. Fransenapfel . . . . .  | Déc. Mars.         |
| * Gräfenstein (Christ). Gräfensteiner=Apfel . . . . .  | Août. Sept.        |
| * hâtive avant toutes (Christ.). Früh=Apfel . . . . .  | Juillet.           |
| C* † Luiken (Stuttgart). Luiten=Apfel . . . . .  | Déc. Mai.          |
| * † OEillet. Nelkenapfel . . . . .   | Déc. Mars.         |
| * † de Rivière (Charente) . . . . .  | Déc. Mai.          |
| * † Rossäckerle, pomme d'Hanawühr (Ht-Rhin). Rosäckerle, Hunawührer=Apfel, Normännchen, J. D. G. Singapfel . . . . .                               | Nov. Févr.         |
| * de Saint-Louis. Ludowikus=Apfel . . . . .  | Fin d'Août.        |
| C* † suie (Bon Jard.). Rauchapfel . . . . .  |                    |
| * † POSTOPHE d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter=Postoph oder Pariser . . . . .  | Février. Mai.      |
| ** PRINCESSE noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Newporter Reinette, Casseler Reinette . . . . . | Nov. Janv.         |
| ** RABAU. Weißer Sommer-Rabau . . . . .  | Août.              |
| ** RAMBOUR franc (Duhamel). Sommer-Rambour . . . . .   | Août. Sept.        |
| ** REINETTE d'Aizerna, Rein. Bréda ou R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin . . . . .                                 | Janv. Avril        |
| Amande rouge . . . . .   | Nov. Mai.          |
| * d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Große englische Reinette . . . . .  | Déc. Mai.          |
| * Baumann. Baumann's Reinette . . . . .  | Idem.              |
| * blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weiße Reinette . . . . .  | Nov. Avril.        |
| caractère (Christ.). Charakter=Reinette . . . . .  | Déc. Mai.          |
| * Caux (de) . . . . .  | Janv. Mars.        |
| coin. Quitten=Reinette . . . . .   | Nov. Mai.          |
| coin française. Französische Quitten=Reinette . . . . .  | Idem.              |
| d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette . . . . .  | Déc. Mars.         |
| Evêque. Bischofs=Reinette . . . . .  | Nov. Mai.          |
| de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette . . . . .   | Oct. Nov.          |
| des hôpitaux d'Angleterre. Engl. Spital=Reinette dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold=Reinette, die Späte . . . . .                    | Déc. Mars.         |
| * dorée (Chris.). Gold=Reinette . . . . .  | Idem.              |
| dorée de Hollande. Holländische Gold=Reinette . . . . .  | Idem.              |
| ** franche (Christ.). Französische Reinette . . . . .  | D'un an à l'autre. |
| * Gomond . . . . .   | Déc. Janv.         |
| * grise d'hiver, la petite (Christ.). Kleine graue Winter=Reinette . . . . .   | Déc. Mai.          |
| ** grise dorée. Graue Gold=Reinette . . . . .  | Nov. Avril.        |
| jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette . . . . .   | Sept. Nov.         |
| ** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst=Reinette, Rabau. Menonitte. Menonitten Reinette . . . . .                      | Novembre.          |
| * Montbron (Christ.). Montbronner=Reinette . . . . .   | Nov. Mai.          |
| * Normandie (de). Normändische Reinette . . . . .  | Janv. Févr.        |
| panachée. Gestreifte Reinette . . . . .  | Déc. Mars.         |
| * piquée. Gestochene Reinette . . . . .  | Janv. Févr.        |
| rouge de Niemann . . . . .   | Déc. Mars.         |
| * Safran (Christ.). Safran=Reinette . . . . .  | Nov. Mai.          |
| sanguine. Blut=Reinette . . . . .  | Oct. Mars.         |
| * Sorgvliet. Sorgvlieter=Reinette . . . . .  | Déc. Mars.         |
| ** truite (Christ.). Forellen=Reinette . . . . .   | Mai.               |
| C* † RHEIN APFEL, der Saure (au Sundg.). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher . . . . .  | Nov. Avril.        |
| * † der Süsse. Rheinapfel, der süße Rodenheimer . . . . .  | Déc. Mars.         |
| * † Schafnase (Haut-Rhin) . . . . .  | Idem.              |
| C* † STREIFLING ou Sträumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling . . . . .  | Nov. Févr.         |
| C* † WACHS-APFEL (en Suisse). Wachs=Apfel . . . . .  | Déc. Janv.         |
| C* † WESSERLINGER (au Sundgau). Wesseringer . . . . .  | Sept. Avril.       |
| C* † Winter=Steiner (Christ.) . . . . .  | Déc. Mai.          |



**VARIETÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS** dans divers pays, et qui peuvent être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.

**Neugesammelte Obstsorten**, welche niederstämmig auf Kernen veredelt, zu 2 Fr. abgegeben werden können, als :

**Poiriers.**

Alberty.  
Angélique de Bordeaux.  
Argusbirne.  
Ascharpay.  
Aurate.  
Bal Armud.  
Belle de Bruxelles.  
Belle Fondante.  
Bergamotte Pentecôte.  
Bezy de Vindré.  
Bezy Vaat.  
Beurré Bosc.  
Beurré Calomat.  
Boehmische grosse.  
Bon chrétien d'Auch, panaché.  
Bonne de Malines.  
Bonne Louise ou Arranchine.  
Bourgmaster.  
Brugmann's.  
Canning.  
Carmosine.  
Cassimann.  
Chat grillé.  
Citron des Carmes, panaché.  
Coquette.

Cuvelier.  
Dix.  
Dubossary.  
Duguesne.  
Ezinoweser späte.  
Finger's späte.  
Fondante de Sickler.  
Francio.  
Gerstbacher beste Birne.  
Graf Canal's von Malabaila.  
Graf Michna's.  
Graue Weinbirne von Pfürth.  
Gulabie de la Géorgie.  
Indschere Armud.  
Johannot.  
Karabudy de Kilsjar.  
Keres Armud.  
Krinetzer punctierte Citronenbirne.  
Kronprinz Ferdinand von Preussen.  
Louvain.  
Luquet.  
Marie-Louise.  
Merveille de Charneux.  
Noirchain.  
Orak Armud.  
Parfum d'Aoust.

Poire de St.-Jaure.  
Poire-Melon.  
Poire St.-André.  
Régente (la).  
Roi de Rome.  
Royale musqué.  
Raymond.  
Sarrazin des Chartreux.  
Schæling Nierry de Russie.  
Schekiro.  
Sucré noir.  
Superfondante.  
Tarquin.  
William's double Bearing.  
Wilkinson's.  
Wiram's Kali.  
Wisbourg.  
Würtzer d'automne.  
Wurtzer on Thaien.  
Zezamuri de Tiflis.  
**Cerisiers.**  
Reine Hortense.  
**Pruniers.**  
Belle de Schoeneberg, fruit délicieux nouveau.  
Couetsche impériale hâtive, très-recommandable par la grosseur et la saveur de ses fruits.

**ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Verschiedene fruchttragende Bäume und Gesträucher.**

AMANDIER à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht, oder Prinzessin-Mandel. . . . . 1 »  
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht . . . . . 1 »  
des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel . . . . . 1 »  
à la Reine. Königin-Mandel . . . . . 1 »  
Sultane . . . . . 1 »  
AZEROLIER poirier, *Pyrus pollveria* (Linné). Azzerollen- oder Hautbutterbirne . . . . . 1 »  
CASSIS, ou groseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis-Traube, das Duzend. . . . . 2 »  
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück . . . . . » 50  
COIGNASSIER de la Chine. Chinesischer Quittenbaum . . . . . 1 50  
à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum . . . . . 1 »  
de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnenquitte . . . . . 1 »  
CORMIER, ou Sorbier à gros fruits, *Sorbus domestica* (Linné). Escherizen, Eschtrichen oder Speierbaum . . . . . 2 »  
CORNOUILLER à fruit jaune et rouge. Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht . . . . . 1 »  
FIGUIERS blanches de bonnes espèces, la pièce. Feigen von guter Art, das Stück . . . . . 1 50  
FRAMBOISIER, le 100 pêle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander . . . . . 10 »  
d'Amérique à fruit acide, la pièce . . . . . 1 50  
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St. le 100 plants de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen . . . . . » 50  
de tous les mois. Monatshimbeere . . . . . 15 »  
du Chili. Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht . . . . . » 50  
GROSEILLER à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglichen, runden, rothen, gelben, grünen und weißen Sorten, mit Namen assortirt . . . . . 20 »  
à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100. Englische Stachelbeere, unter einander, das 100 . . . . . 15 »  
à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück . . . . . » 50  
à grandes grappes blanches, de Hollande. Holländische große weiße Johannisbeere, das Stück . . . . . » 50  
idem, le 100 plants de deux ans. Die nämliche, das 100 zweijährige Pflanzen . . . . . 25 »

GROSEILLER à grandes grappes rouges, la pièce. Dito, mit großer rother Frucht, das Stück . . . . . » 50  
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100. Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100. . . . . 10 »  
CERISE très-belle, grand fruit, la pièce. . . . . 2 »  
MARRON Combale . . . . . 2 »  
de Lusignan, à haute tige. Lusignaner ächter Castanienbaum, hochstämmig. . . . . 2 »  
de Lucques . . . . . 2 »  
de Lyon . . . . . 2 »  
grosse Merle . . . . . 2 »  
noir. . . . . 2 »  
MARRONNIER privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce. Achte oder zahme Kastanien, hochstämmig, das Stück . . . . . 2 »  
MURIER noir, grande espèce, à haute tige. Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig, das Stück . . . . . 2 à 4 »  
NÉFLIER d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum . . . . . 1 »  
de Hollande, à grands fruits. Holländischer Mispelbaum monstrueux. Riesen-Mispelbaum . . . . . 1 »  
sans pepins. Kernloser Mispelbaum . . . . . 1 »  
NOISETIER. Haselnüssen.  
algérienne blanche . . . . . 1 50  
» rouge . . . . . 1 50  
arborescent. Baumartige Haselnuß . . . . . 1 »  
Baar's. Spanische . . . . . 1 »  
Barcelone. Barzellonische Haselnuß . . . . . 1 »  
Bürn Nart . . . . . 1 »  
à fruit rouge. Blutnuß, rothe Lambertenuß . . . . . 1 »  
Lichtwerdische Zellernuß . . . . . 1 »  
Gungelber Zellernuß . . . . . 1 »  
Hallische Niesennuß . . . . . 1 »  
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschligtem Laub . . . . . 1 »  
Nethingham's prolifé . . . . . 1 »  
Piémontaise rouge . . . . . 1 50  
Weiße lange Zellernuß . . . . . 1 »  
Bonnes espèces mélangées, le 100. Gute Sorten im Rummel, das 100 . . . . . 25 »  
NOYER, bonne espèce, haute tige. Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochstämmig . . . . . 1 »

**VIGNES. — Rebsorten.**

NB. Les espèces marquées d'une \* peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.

NB. Die mit einem \* bezeichneten Sorten können zu Tafeltrauben vorgezogen werden; die übrigen geben theils den feinsten theils den meistesten Wein.

†† L'ALLEMAND, Facun (Sprengel), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weißelben (Sprengel), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück . . . . . » 50



|  | fr. | c. |
|--|-----|----|
| †† L'ALLEMAND rouge. Rother Burger. . . . .  | »   | 50 |
| †† AUVERNAS blanc, Pinneau, Burot (Sprengel). Weiß-Kláfner. . . . .  | »   | 50 |
| †† gris, gentil-gris. Grau = Kláfner, Ruländer, Kláfner. . . . .   | »   | 50 |
| †† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Kláfner oder rother Burgunder. . . . .  | »   | 50 |
| †† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprengel), gentil-rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner, Traminer, Fleischweiner, Kewner! Heiligensteiner. Gibt einer der feinsten Weine (Sprengel) . . . . . | »   | 50 |
| *† BLUSSARD blanc. Blüssard, der weiße, weiße Eibebe. . . . .  | 1   | »  |
| *†† CHASSELAS blanc. Weißer Gutedel. . . . .   | »   | 50 |
| * bronze. . . . .  | 1   | »  |
| *†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weiße. . . . .  | »   | 50 |
| *†† de Fontainebleau (T. O.), ch. de Thomery. Weißer Fontainebleau, Gutedel. . . . .   | »   | 50 |
| *† blanc musqué (Bon Jard.). Mustateller Gutedel, der weiße Malwasier Mustateller? (Sprengel). . . . .   | 1   | »  |
| * précoce. Fendant blanc. Früher Gutedel (M. et B.). . . . .   | 1   | »  |
| *†† rouge. Rother Gutedel. . . . .   | 1   | »  |
| *† rouge royal (Bon Jard.). Königlich Gutedel. . . . .   | 1   | »  |
| * violet. Violetter Gutedel. . . . .   | 1   | »  |
| *† CIOUTAT, ou raisin d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien oder Österreichische Traube. . . . .   | »   | 50 |
| * CORINTHE la grande, avec pepins. Große Corinthe, mit Kernen. . . . .   | 1   | »  |
| *† la petite, sans pepins, Anguur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kismisch. Kismi, Uva passa bianca (Sprengel). . . . .   | 1   | »  |
| * CORNICHON violet (pour treille). Violetblaue Gutedeltraube (an Geländer). . . . .  | 1   | »  |
| * COUSSI, ou Querci noir, très-recommandable. Frühe dunkelblaue Coussitraube, sehr zu empfehlen. . . . .   | 1   | »  |
| *† De Candolle. Hellrothe Riesentraube. . . . .  | 1   | »  |
| *† FRANKENTHALER, gros noir (Sprengel). Frankenthaler, Judler, Vaccara? . . . . .  | 1   | »  |
| *† JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube, zu empfehlen. . . . .   | 1   | »  |
| ISABELLA, Vitis Isabella (a b c). Isabella aus Nordamerika (a b c). . . . .  | 1   | »  |
| *† KIENZHEIMER blanc précoce (Bacot, Sprengel). Kienzheimer früher weißer. . . . .   | 1   | »  |
| * KILIANER, très-précoce. Sehr früh. . . . .   | 1   | »  |
| * KISCH-MISCH, Sultan, raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Große, ohne Kernen. . . . .   | 1   | »  |
| * LISTAN blanc de Malaga. . . . .  | 1   | »  |
| LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen. . . . .  | »   | 50 |
| * MALAGA, le gros. Malaga, der Große. . . . .  | 1   | »  |
| * MALVOISIE blanc. Weißer Malwasier. . . . .   | 1   | »  |
| * rouge clair précoce. Früher hellrother Malwasier. . . . .  | 1   | »  |
| MELON du Jura. . . . .   | 1   | »  |
| *† MORILLON blanc, Murlon. Später weißer Burgunder (M. et B.). panaché. . . . .  | »   | 50 |
| * MOSCON. . . . .  | 1   | »  |
| * MUSCAT d'Alexandrie, passe longue musquée. Alexandrin Mustateller. . . . .   | 1   | 50 |
| *† blanc (Muscata bianca). Weißer Mustateller, Frontignan (Sprengel). . . . .  | 1   | »  |

|  | fr. | c. |
|--|-----|----|
| *† MUSCAT gris. Grauer Mustateller. . . . .  | 1   | »  |
| *† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Mustateller, schwarzer Weihrauch. . . . .   | 1   | »  |
| *† rouge. Rother Mustateller. . . . .  | »   | 50 |
| *† violet noir. Blauer Mustateller, violettblauer Mustateller. . . . .   | 1   | »  |
| NOIR, le gros, de la Lorraine. Der schwarze große Luthringer. . . . .  | »   | 50 |
| †† OLWER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Olwer, Hartälber, grün Olwer; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren. . . . .                       | »   | 50 |
| †† ORTLIEBER, Rauschling le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortliebischer, Ortlinger, kleiner Rauschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen. . . . .               | »   | 50 |
| * PASSALE blanche. . . . .   | 1   | »  |
| * PERLE blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder große weiße Perltraube. . . . .   | »   | 50 |
| * rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube. . . . .   | »   | 50 |
| RAISIN de Calabre, délicieux. Calabrische Traube. . . . .  | 1   | 50 |
| du Cap de Bonne-Espérance, Raisin de Constance. . . . .  | 1   | »  |
| * des Dames. . . . .   | 1   | »  |
| *† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue. Nicht Grautláfner. . . . .  | »   | 50 |
| * d'Ischia. . . . .  | 1   | »  |
| * Napoléon. . . . .  | 1   | »  |
| * Olivier noir. . . . .  | 1   | »  |
| * précoce de Montpellier. . . . .  | 1   | »  |
| †† REUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Rauschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen. . . . .  | »   | 50 |
| †† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Riesling, Risting (Sprengel), Klingelberger. . . . .  | »   | 50 |
| * SAINT-LAURENT le précoce, grand noir. Blauer großer früher St.-Laurent. . . . .  | 1   | »  |
| †† SYLVANER Sylvaner, Zierfahner, grüner. . . . .  | 1   | »  |
| † TEINTURIER, Roussillon. Färbetraube, Bay. . . . .  | »   | 50 |
| * TERRE promise. Traube aus dem gelobten Land. . . . .   | 2   | »  |
| * TOKAI des Pyrénées, précoce. . . . .   | 1   | »  |
| *† VALTELIN. Valteliner. . . . .   | »   | 50 |
| * ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre Ziegen-Zitzen. . . . .  | 1   | »  |
| La collection de 60 espèces de vigne, avec noms. Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen. . . . .  | 50  | »  |
| Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Dugend, von den mit einem † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu. . . . .                             | 4   | »  |
| Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu. . . . . | 8   | »  |
| Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces sans noms. Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, zu. . . . .                                  | 4   | »  |

NB. Les espèces recueillies dans les differens départemens de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel et par les frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de 30 cent. par sorte.

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbekannten Rebenforten, werden in Collectionen von 50 Sorten als Fehser, zu 30 Cent. per Sorte abgegeben.

## PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Küchengarten-Pflanzen, 1c.

|   | fr. | c. |
|---|-----|----|
| ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer-Artischofen, le 100. . . . .  | 20  | »  |
| ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische und Ulmer-Spargeln, le 100 de deux ans. . . . .   | 4   | »  |
| Le 100 de trois ans. . . . .  | 5   | »  |
| Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl. . . . .   | 6   | »  |
| CHOU marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (Voy. le Bon Jard.). Meer Kohl oder Crambe maritima, eine Gemüspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzt, le 100. . . . . | 15  | »  |
| HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Hundsdert Knollen. . . . .  | 2   | »  |
| PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable Pataten, Convolvulus Batatas, ein sehr empfehlungswürdiges Gemüs, les 12 pl. . . . .  | 5   | »  |
| violette, les 12 pl. . . . .  | 5   | »  |
| RAIFORT, ou moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants. . . . .  | 5   | »  |
| <b>FRAISIERS. — Erdbeerenpflanzen.</b>  |     |    |
| ANANAS- Ananas-Erdbeere, le 100. . . . .  | 2   | »  |

|   | fr. | c. |
|---|-----|----|
| BATH (de), le 100. . . . .  | 2   | »  |
| BLUSH-CHILI. Blush-Chili, le 100. . . . .                             | 2   | »  |
| BRACTEATA hybrida, 12 pl. . . . .                                     | 1   | 50 |
| de Brienne, le 100. . . . .   | 3   | »  |
| BRITISH Queen, la pièce. . . . .                                      | »   | 50 |
| CAPRON mâle, le 100. . . . .  | 2   | »  |
| musqué, le 100. . . . .   | 2   | »  |
| CAROLINE (de la), le 100. . . . .                                     | 2   | »  |
| CHILI (véritable du). Chilische ächte, les 12 pl. . . . .             | 3   | »  |
| DOWTON's Ananas. Dowton's Ananas, les 12 pl. . . . .                  | 1   | 50 |
| ECARLATE de Virginie. Virginische Scharlach-Erdbeere, le 100. . . . . | 2   | »  |
| ELTON, 12 pl. . . . .   | 1   | »  |
| GRIMSTON's écarlat, 12 pl. . . . .                                    | 1   | »  |
| KEEN's seedling, le 100. . . . .                                      | 4   | »  |
| bifere, la pièce. . . . .   | »   | 50 |
| KNOWORT's, 12 pl. . . . .   | 1   | »  |
| MIJATTE, 12 pl. . . . .   | 1   | »  |
| REINE des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100. . . . .             | 6   | »  |
| ROSTOCK, 12 pl. . . . .   | 1   | »  |



|   |            |
|---|------------|
| SCARLET Rosberry, 12 pl. . . . .  | fr. c. 1 » |
| Tous les mois (de), à fruits rouges. Monats-Erdbeeren, mit rother Frucht, le 100. . . . . | 2 »        |
| sans filets, à fruits rouges, le 100. . . . .   | 3 »        |
| à fruits blancs, 12 pl. . . . .   | 1 50       |
| TRIOMPHE d'Orléans, le 100 . . . . .  | 4 »        |

|   |            |
|---|------------|
| WASHINGTON's, le 100. . . . .   | fr. c. 4 » |
| WILMOT's late. Wilmot's Chilische späte, 12 pl. . . . .                       | 2 »        |
| superbe, le 100 . . . . .   | 2 50       |
| Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im Rummel, le 100. . . . . | 1 50       |

## DEUXIÈME DIVISION.

### ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une \* doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p. L.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

| La pièce. Das Stück.   | fr. c.   |
|--|----------|
| * ACACIA Julibrissin (Willd.) . . . . .                        | 1 à 3 »  |
| * ACER coriaceum (Lodd) . . . . .                              | 1 »      |
| † dasycarpum (Ehr.) A. rubrum (L.)                             | 1 »      |
| eriocarpum . . . . .   | 1 »      |
| † glaucum . . . . .  | 1 »      |
| laciniatum . . . . .   | 1 »      |
| † Lobelli (L.) . . . . .                                       | 1 »      |
| monspessulanum (L.) . . . . .                                  | 1 »      |
| † neapolitanum obtusatum . . . . .                             | 1 »      |
| † Negundo L. (E. à feuilles de frêne).                         | 1 »      |
| † nigrum (Mich.) . . . . .                                     | 1 »      |
| Opalus (Willd.), Er. opale . . . . .                           | 1 »      |
| opalifolium non A. opalus . . . . .                            | 1 »      |
| pennsylvanicum (L.) . . . . .                                  | 1 »      |
| platanoides . . . . .  | 1 »      |
| † Pseudo-platanus (L. E.) Sycomore                             | 1 »      |
| † Pseudo-platanus fol. varieg. (E.)                            | 1 »      |
| tricolor . . . . .   | 3 »      |
| † rubrum (Ehrh.) . . . . .                                     | 1 »      |
| † saccharinum (Linn.) . . . . .                                | 1 »      |
| † striatum (Du Roi). E. jaspé . . . . .                        | 1 »      |
| tartaricum (L.) . . . . .                                      | 1 »      |
| trilobum (Lam.) A. creticum (Lin.)                             | 1 »      |
| † Wagneri . . . . .  | 1 50     |
| ÆSCULUS coccinea . . . . .                                     | 1 »      |
| flava, L. A. lutea (Mich.) . . . . .                           | » 80     |
| † Hippocastanum (L.) Marronnier d'Inde . . . . .               | 1 à 1 50 |
| flore pleno . . . . .  | 1 »      |
| foliis variegatis . . . . .                                    | 1 50     |
| hybrida (DC.) . . . . .  | 1 »      |
| macrostachya (H. gen.) Pavia macrostachya A. spicata . . . . . | 1 »      |
| Michauxii . . . . .  | 1 »      |
| neglecta . . . . .   | 1 »      |
| Pavia (Mich.) Marr. d'Inde à fleurs rouges . . . . .           | » 50     |
| pumila . . . . .   | 1 »      |
| † rubicunda (Herb. gen.) Æscul. carnea . . . . .               | 1 à 1 50 |
| spectabilis . . . . .  | 1 »      |
| † AILANTHUS glandulosa (Ait.) Vernis du Japon . . . . .        | 1 »      |
| ALNUS cordata (Duf.) . . . . .                                 | 1 50     |
| incana . . . . .   | » 50     |
| laciniata (Willd.) . . . . .                                   | 2 »      |
| oxyacanthifolia (Lodd.) . . . . .                              | 2 »      |
| * AMORPHA canescens . . . . .                                  | » 50     |
| fruticosa (L.) Faux indigo . . . . .                           | » 50     |
| glabra (Desf.) . . . . .                                       | » 75     |
| * Levisii (Lodd.) . . . . .                                    | 1 »      |
| nana P. . . . .  | 1 »      |

| La pièce. Das Stück.  | fr. c.   |
|---|----------|
| AMYGDALUS communis fl. pleno. Amandier à fleurs doubles . . . . .   | 1 »      |
| communis foliis variegatis . . . . .  | 1 »      |
| incana. Prunus incana . . . . .   | 1 »      |
| nana (L.) Amandier nain . . . . .   | » 50     |
| orientalis (Hort. Kew) . . . . .  | 1 »      |
| persica flore pleno . . . . .   | 1 »      |
| pumila fl. pleno Prunus sinensis . . . . .  | 1 »      |
| Sibirica (Gmelin) A. de Sibérie . . . . .   | 1 »      |
| ANDROMEDA arborea (Lin.), p. L., petit, klein . . . . .   | 5 »      |
| axillaris, p. L. . . . .  | 1 »      |
| longifolia . . . . .  | 1 »      |
| calyculata (L. Anp.), caliculée, p. L. . . . .  | » 50     |
| angustifolia . . . . .  | » 75     |
| cassinefolia (Vent.) A. speciosa (Mich., p. L. . . . .  | 1 50     |
| Catesbæi (Walt.) . . . . .  | 1 50     |
| floribunda, Bot. mag. . . . .   | 5 à 20 » |
| lucida (Jacq) . . . . .   | 2 »      |
| mariana A. du Maryland, p. L. . . . .   | 2 »      |
| membranacea (Hort) . . . . .  | 2 50     |
| ovalifolia (Walli) . . . . .  | 2 50     |
| paniculata (L. And.), paniculée, p. L. . . . .  | 1 »      |
| polifolia (L. And.), à feuilles de polium, p. L. . . . .  | » 50     |
| latifolia . . . . .   | » 50     |
| oleæfolia (And.), à f. d'olivier . . . . .  | 1 »      |
| rosmarinifolia, A. angust . . . . .   | » 50     |
| stricta . . . . .   | 1 »      |
| racemosa (L.), à grappes . . . . .  | 1 »      |
| Redowski (Chmss.) . . . . .   | 3 à 4 »  |
| serratifolia (Cels) . . . . .   | 3 »      |
| speciosa, A. formosissima? . . . . .  | 2 »      |
| * tetragona (Linn), Cassiope tetragona (Don) . . . . .  | 3 »      |
| NB. Idem, une collection de 12 espèces assorties avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach unserer Wahl . . . . . | 10 »     |
| ARALIA spinosa (L.) . . . . .   | » 75     |
| japonica (Thunb.) . . . . .   | 1 à 3 »  |
| ARBUTUS alpina (L.) . . . . .   | 1 »      |
| * pilosa (Grah.) . . . . .  | 3 »      |
| uva ursi (L.) . . . . .   | 1 »      |
| * ARISTOLOCHIA sempervirens (Lin) . . . . .   | 2 »      |
| Sipho, l'Hér. aristoloche Syphon, p. L. . . . .   | 1 »      |
| AUCUBA japonica (Thunb.) . . . . .  | 1 à 2 »  |
| AZALEA aurantiaca grandiflora . . . . .   | 1 50     |
| maxima . . . . .  | 1 50     |
| calendulacea . . . . .  | 1 »      |

## Zweiter Abschnitt.

### Bierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände welche mit einem \* bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem † bezeichneten können dieses Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben die mit den Buchstaben p. L. bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert, und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

| La pièce. Das Stück.   | fr. c.       |
|--|--------------|
| AZALEA calendulacea insignis . . . . .   | 1 50         |
| bicolor . . . . .  | 1 50         |
| carnea lutescens . . . . .   | 1 25         |
| Celsi . . . . .  | 2 »          |
| chrysolecta . . . . .  | 2 »          |
| Cornisi . . . . .  | 2 »          |
| coronata . . . . .   | 1 »          |
| cramoisi flamboyant . . . . .  | 1 50         |
| cuprea aurantiaca . . . . .  | 2 »          |
| Degenfeldii . . . . .  | 1 50         |
| Dernii . . . . .   | 1 50         |
| glaucia (Lam.) . . . . .   | 1 »          |
| gloriosa . . . . .   | 2 »          |
| hispida (Pursh) . . . . .  | 1 »          |
| alba . . . . .   | » 75         |
| rubra . . . . .  | 1 »          |
| mirabilis . . . . .  | 1 50         |
| mutabilis . . . . .  | 1 »          |
| nudiflora (Linn.) . . . . .  | 1 »          |
| ochroleuca . . . . .   | 1 50         |
| pontica (Linn.) . . . . .  | 1 à 3 »      |
| alba . . . . .   | 1 »          |
| lutescens . . . . .  | 1 »          |
| bicolor . . . . .  | 1 »          |
| cuprea . . . . .   | 1 »          |
| Regeli . . . . .   | 3 »          |
| semi plena . . . . .   | 2 »          |
| Sinninghi . . . . .  | 3 »          |
| procumbens (Linn.) . . . . .   | 1 50         |
| pulchella . . . . .  | 1 50         |
| sulphurea . . . . .  | 1 50         |
| tricolor . . . . .   | 2 »          |
| glaucia et hispida, mélange. Rummel mit Knospen, avec boutons. . o/o   | 35 »         |
| pontica, mélange. Rummel. . . o/o  | 40 »         |
| Une collection de 12 variétés choisies parmi ce qu'il y a de plus beau, et assorties avec noms. Eine Sammlung von 12 der schönsten Abarten, mit Namen bezeichnet . . . . . | 12 »         |
| BERBERIS aquifolia (Pursh.) Mahonia, Nutt. . . . .   | 75 c. à 3 f. |
| aristata (Dec.) . . . . .  | 1 »          |
| * buxifolia vera . . . . .   | 1 50         |
| * dealbata (Lindl.) . . . . .  | 3 »          |
| diversifolia Mahonia . . . . .   | 3 »          |
| emarginata (Willd.) . . . . .  | » 75         |
| * empetrifolia (Lam) . . . . .   | 1 »          |
| fascicularis (Schult) Mahonia . . . . .  | » 50         |
| * glumacea (Spr.) Mahonia glumacea, D . . . . .  | 2 à 5 »      |
| hybrida . . . . .  | 3 »          |



| La pièce. Das Stück.                           |              | fr. c. | La pièce. Das Stück.                              |         | fr. c. | La pièce. Das Stück.                        |          | fr. c. |
|--|--------------|--------|---|---------|--------|---|----------|--------|
| * BERBERIS intermedia Mahonia. . . . .         | 3 »          |        | CLEMATIS virginiana (Lin.) . . . . .              | 1 50    |        | CYTISUS Laburnum bullatus . . . . .         | 1 »      |        |
| nepalensis? nova . . . . .                     | 1 50         |        | Viticella (L.) . . . . .                          | » 80    |        | coccineus (Adam) . . . . .                  | 1 »      |        |
| repens (G. Don. et Pen.) Mahonia. . . . .      | 1 »          |        | flore pleno (C.), à fl. doubles. . . . .          | 1 50    |        | foliis variegatis . . . . .                 | 1 »      |        |
| sibirica (Wall.) . . . . .                     | 1 »          |        | flore rubro . . . . .                             | 1 »     |        | incisus, C. quercifolius . . . . .          | 1 »      |        |
| sinensis (Desf.) . . . . .                     | 1 »          |        | violacea . . . . .                                | 1 »     |        | latifolius. . . . .                         | 1 »      |        |
| * tenuifolia (Lindl.) Mahonia tenuif. . . . .  | 3 à 10 »     |        | CLETHRA alnifolia (Pursh) . . . . .               | 1 50    |        | monstrosus. . . . .                         | 1 »      |        |
| * trifoliata Mahonia trifoliata . . . . .      | 4 à 6 »      |        | Michauxi nova, petit. . . . .                     | 3 »     |        | pendulus. . . . .                           | 1 »      |        |
| vulgaris foliis purpureis . . . . .            | 1 »          |        | tomentosa (Pursh) . . . . .                       | 1 50    |        | sessilifolius (L.) . . . . .                | 1 »      |        |
| canadensis, Ep. vin. du Canada. . . . .        | 1 »          |        | COLUTEA arborescens (L.) Baguenau-                |         |        | variabilis nova . . . . .                   | 1 »      |        |
| foliis variegatis . . . . .                    | 1 50         |        | dier commun . . . . .                             | » 50    |        | Weldenii (Vis.) . . . . .                   | 1 50     |        |
| fructo albo. . . . .                           | 2 »          |        | media (Willd.) . . . . .                          | » 50    |        | purpureus (Wld.) Cytise à fleurs            |          |        |
| violaceo . . . . .                             | 1 »          |        | orientalis (Lam.) . . . . .                       | » 50    |        | pourpres . . . . .                          | » 50     |        |
| † BETULA alba Bouleau . . . . .                | » 50         |        | Pocockii (Ait.) C. haleppica . . . . .            | 1 »     |        | sessilifolius (Lin.) . . . . .              | » 50     |        |
| crispa (Ait.) . . . . .                        | 1 50         |        | COMPTONIA asplenifolia (Gært.) . . . . .          | » 50    |        | * DAPHNE Cneorum (Lin.), p. Z. . . . .      | 1 »      |        |
| davurica Pall . . . . .                        | 1 »          |        | CHORCHORUS japonica, fl. pleno (H) . . . . .      | » 50    |        | Laureola (Willd.) . . . . .                 | » 50     |        |
| † laciniata . . . . .                          | 1 50         |        | flore simplici. Kerria jap. . . . .               | 1 »     |        | Mezereum (L.) Bois gentil . . . . .         | » 50     |        |
| lenta (Willd.) . . . . .                       | 1 »          |        | * CORIARIA myrtifolia (L.) Redoul à               |         |        | Idem, 12 replants 12 Echlinge . . . . .     | » 50     |        |
| papiracea. . . . .                             | 1 »          |        | feuilles de Myrrhe. . . . .                       | » 50    |        | flore purpurea. . . . .                     | 1 50     |        |
| † pontica (Desf.) . . . . .                    | 1 50         |        | CORONILLA Emerus (Willd.) . . . . .               | » 50    |        | striata (Tratt) . . . . .                   | 1 »      |        |
| populifolia (Willd.) . . . . .                 | 1 50         |        | CORNUS alba (L.) Cornouiller blanc. . . . .       | » 50    |        | * DAUBENTONIA TRIPETIANA. . . . .           | 3 à 8 »  |        |
| * BIGNONIA capreolata. . . . .                 | 2 »          |        | foliis variegatis . . . . .                       | 1 »     |        | * DECUMARIA barbara (Willd.) . . . . .      | 1 50     |        |
| † Catalpa, Catalpa Syringæfolia. . . . .       | 1 à 1 50     |        | alternifolia (L.) C. à feuilles alt. . . . .      | 1 »     |        | DEUTZIA gracilis. . . . .                   | 1 »      |        |
| * grandiflora (Jacq.) . . . . .                | 1 »          |        | florida (Lin.) . . . . .                          | 3 »     |        | scabra (Thunb.) . . . . .                   | 1 »      |        |
| radicans (L.) Jasmin de Virginie . . . . .     | » 50         |        | mascula (L.) C. mâle. . . . .                     | » 50    |        | species nova ex Nepal. . . . .              | 3 »      |        |
| BORYA acuminata (Willd.) . . . . .             | 1 50         |        | fructu luteo . . . . .                            | 1 »     |        | undulata. . . . .                           | 1 »      |        |
| BUPLEVRUM fruticosum (Lin.) . . . . .          | 1 »          |        | foliis variegatis . . . . .                       | 1 »     |        | DROSPYROS Lotus (L.) Plaqueminier . . . . . | 1 »      |        |
| * BUXUS balearica (Lam.) . . . . .             | 1 »          |        | panicula (L'Herit.) . . . . .                     | » 50    |        | lucida (Lodd.) . . . . .                    | 2 »      |        |
| * foliis albo marginatis . . . . .             | 1 50         |        | sericea (L'Herit.) C. rubiginosa (Ehr.) . . . . . | 1 »     |        | virginiana (Lin.) . . . . .                 | 1 »      |        |
| suffruticosa sempervirens, p. Z. . . . .       | » 50         |        | sibirica . . . . .                                | 1 »     |        | DIRCA palustris (Lin.) . . . . .            | 1 50     |        |
| angustifolia, p. Z. . . . .                    | 1 50         |        | stricta (L'Herit.) C. élancé . . . . .            | » 50    |        | ELÆAGNUS angustifolia (L.) Olivier de       |          |        |
| foliis argenteo variegat, p. Z. . . . .        | 1 »          |        | CORYLUS Americana (Mich.) C. ros-                 |         |        | Bohème . . . . .                            | 1 »      |        |
| CALYCANTHUS ferax (Herb. gen.) C               |              |        | trata (Ait.) . . . . .                            | 1 »     |        | * argentea nova (V. Siebold L.) . . . . .   | 1 50     |        |
| glaucus (Willd.) . . . . .                     | 1 »          |        | atropurpurea . . . . .                            | 1 »     |        | hortensis. . . . .                          | 1 »      |        |
| floridus (L.) Calycanthe de Virginie . . . . . | 1 »          |        | Columna (L.) E. de Bysance, . . . . .             | » 50    |        | * REFLEXUS nova. . . . .                    | 1 50     |        |
| lævigatus (Willd.), à feuilles gla-            |              |        | laciniata nova Nois. cornu . . . . .              | 1 »     |        | songarica? . . . . .                        | 1 50     |        |
| bres, p. Z. . . . .                            | 2 50         |        | tubulosa (Willd.) . . . . .                       | » 50    |        | EMPETRUM nigrum (E.), à fruit noir,         |          |        |
| nanus (Duch.) nain, p. Z. . . . .              | 1 »          |        | COTONEASTER acuminata (Lindl.) . . . . .          | 1 »     |        | p. Z. . . . .                               | 1 »      |        |
| oblongifolius (Loudon) . . . . .               | 1 50         |        | buxifolia (Wall.) . . . . .                       | 1 »     |        | * EPHÆDRA altissima (Desf.) . . . . .       | 2 50     |        |
| * præcox, Chimonanthus fragrans                |              |        | laxiflora (Lindl.) . . . . .                      | 1 »     |        | * ERIGA herbacea (Willd.) . . . . .         | » 50     |        |
| (DC), p. Z. . . . .                            | 1 50         |        | microphylla (Wall.) . . . . .                     | 2 »     |        | * Tetralix speciosa . . . . .               | 1 »      |        |
| ruberrimus. . . . .                            | 3 »          |        | racemiflora (Spreng.) . . . . .                   | 1 »     |        | * viridi purpurea (Lin.) . . . . .          | 1 50     |        |
| Idem, 25 Calycanthus en mélange. 25            |              |        | rotundifolia (Wall.) . . . . .                    | 1 »     |        | vulgaris flore pleno. . . . .               | 1 »      |        |
| Calycanthus im Rummel, ju . . . . .            | 10 »         |        | * CRATÆGUS acerifolia Poir C. cordata             |         |        | EVONYMUS Americanus (L.) . . . . .          | 1 »      |        |
| CARPINUS americanus (Michx.) . . . . .         | 1 50         |        | Azarolus (L.) Néf. azérolier, ou de               |         |        | angustifolius (Kursk.) . . . . .            | 1 »      |        |
| Ostrya (Lin.) . . . . .                        | 1 »          |        | Naples. . . . .                                   | 1 »     |        | atropurpureus (Jacq.) . . . . .             | 1 »      |        |
| CEANOTHUS americanus (L.) Cean. d'A-           |              |        | Azarolus Aronia. Azée. d'Or. . . . .              | 1 »     |        | Europæus fol. variegatis. . . . .           | » 50     |        |
| mérique, p. Z. . . . .                         | » 50         |        | coccinea (Willd.) Néflier écarlat. . . . .        | » 50    |        | fructu albo. . . . .                        | 1 »      |        |
| Baumannianus (Spach.) . . . . .                | 3 »          |        | corallina C. acerifolia, Mesp. Phæ-               |         |        | pendula . . . . .                           | 1 50     |        |
| microphyllus (Mich.) . . . . .                 | 1 »          |        | nopyrum (Ehrh.) . . . . .                         | » 50    |        | latifolius (Mill.) . . . . .                | 1 »      |        |
| ovatus flore cyaneo (Desfont.) . . . . .       | 1 »          |        | Crus-galli (Willd.) Mespillus lucida              |         |        | * Nepalensis foliis variegatis . . . . .    | 1 »      |        |
| * CELASTRUS buxifolia. . . . .                 | 1 50         |        | (Ehrh.) . . . . .                                 | » 50    |        | * jaspidea nova . . . . .                   | 1 à 3 »  |        |
| * edulis (Vahl.) . . . . .                     | 2 »          |        | Douglassii (Lindl.) C. punctata . . . . .         | 1 »     |        | verrucosus (Scop) . . . . .                 | 1 »      |        |
| scandens (Lin.) . . . . .                      | » 75         |        | glabra (Thunb.) . . . . .                         | 1 50    |        | FAGUS americana (Sweet.) . . . . .          | 1 50     |        |
| CELTIS americana (Mill.) . . . . .             | 1 50         |        | glandulosa (Moench.) C. rotundifol.? . . . .      | » 50    |        | asplenifolia. Hêtre à feuilles d'As-        |          |        |
| aspera (Desf.) . . . . .                       | 1 50         |        | lucida latifolia. . . . .                         | 1 »     |        | plenium, p. Z. . . . .                      | 2 »      |        |
| cordata. C. crassifolia (Lam.) . . . . .       | 1 »          |        | monogyna flore rubro (Willd.) . . . . .           | 1 »     |        | atropurpurea. Hêtre pourpre, p. Z. . . . .  | 1 à 3 »  |        |
| occidentalis (Linn.) C. tenuifolia             |              |        | flore rubro pleno . . . . .                       | 1 »     |        | ferruginea (Ait.) F. latifolia. . . . .     | 1 à 3 »  |        |
| (Lam.) . . . . .                               | 1 »          |        | odorata . . . . .                                 | 1 »     |        | laciniata . . . . .                         | 2 »      |        |
| CEPHALANTHUS occidentalis (Lin.) . . . . .     | 50 c. à 1 f. |        | orientalis (Spreng.) . . . . .                    | 1 50    |        | pendula . . . . .                           | 1 50 à 2 |        |
| CERCIS canadensis (Lin.) . . . . .             | 1 »          |        | Oxyacantha flore pleno albo . . . . .             | 1 »     |        | quercoides (Hort.) . . . . .                | 1 50     |        |
| * Siliquastrum (L.)-Arbre de Judée. . . . .    | 1 »          |        | foliis variegatis. Aube-épine à                   |         |        | sylvatica foliis albo variegatis. . . . .   | 1 à 2 »  |        |
| * flore albo. . . . .                          | 1 »          |        | feuilles panachées. . . . .                       | 1 »     |        | * FONTANESIA phillyreoides (Billard.)       |          |        |
| CHIONANTHUS pubescens (H. B.) . . . . .        | 2 »          |        | aureo-variegatis . . . . .                        | » »     |        | Font. à f. de Fil. . . . .                  | » 50     |        |
| virginica (L.) Arbre de neige. . . . .         | 1 »          |        | pectinata (Bosc.) . . . . .                       | 1 »     |        | FOTHERGILLA lanceolata . . . . .            | 1 50     |        |
| * CLEMATIS azurea (Sieb.) . . . . .            | 1 à 1 50     |        | tanacetifolia (Pers.) Néflier à feuil-            |         |        | † FRAXINUS acuminata. . . . .               | 1 à 1 50 |        |
| * bicolor (B. Mag.) . . . . .                  | 1 à 1 50     |        | les de Tanaisie . . . . .                         | 1 »     |        | calabriensis? nov. sp. . . . .              | 1 50     |        |
| erecta (Willd.) . . . . .                      | » 50         |        | CUPRESSUS disticha (L.) Cyprès chauve.            |         |        | † caroliniana (Willd.) . . . . .            | 1 à 1 50 |        |
| Flammula Clématite odorante. . . . .           | » 80         |        | Arbre unique pour être planté dans                |         |        | † cinerea? (Bosc) . . . . .                 | 1 à 1 50 |        |
| integrifolia (Lin.) . . . . .                  | » 50         |        | l'eau. Einzig zu Wasserpflanzungen,               |         |        | † epiptera (Mich.) . . . . .                | 1 »      |        |
| lathyrifolia nova. . . . .                     | 3 »          |        | p. Z. . . . .                                     | 1 à 2 » |        | † excelsior. Fr. lutea. . . . .             | 1 »      |        |
| maritima (Lin.) . . . . .                      | 1 »          |        | intermedia, p. Z. . . . .                         | 2 »     |        | asplenifolia. . . . .                       | 2 »      |        |
| montana (Buchan.) C. Nepalensis. . . . .       | 2 50         |        | * nucifera? p. Z. . . . .                         | 2 »     |        | crispa (L.) Fr. attravirens . . . . .       | » 50     |        |
| * napaulensis (DC.) . . . . .                  | 1 50         |        | * sempervirens (Lin.), p. Z. . . . .              | 1 à 5 » |        | jaspidea. Fr. jaspé. . . . .                | 1 »      |        |
| odorata (Wall.) . . . . .                      | 1 »          |        | thuyoides (L.) Faux thuya, p. Z. . . . .          | 1 50    |        | † pendula. Frêne à parasol. . . . .         | 1 à 1 50 |        |
| orientalis (Lin.) . . . . .                    | 1 »          |        | * CYDONIA sinensis (Herb. gen.) . . . . .         | 1 »     |        | salicifolia, F. ex erosa. F. feuil. de      |          |        |
| parviflora (De Cand.) C. revoluta              |              |        | CYTISUS argenteus . . . . .                       | 1 »     |        | saule . . . . .                             | 1 »      |        |
| H. Par. . . . .                                | 1 »          |        | biflorus (L'Herit.) . . . . .                     | » 50    |        | † variegata . . . . .                       | 1 »      |        |
| * pinnata. . . . .                             | 1 50         |        | capitatus (Jacq.) . . . . .                       | » 50    |        | † expansa . . . . .                         | 1 à 1 50 |        |
| polymorpha (Vio.) . . . . .                    | 1 50         |        | elongatus (Willd.) . . . . .                      | 1 »     |        | † juglandifolia (Lam.) . . . . .            | 1 »      |        |
| sibirica (Spr.) . . . . .                      | 1 »          |        | PURPUREO-ELONGATUS (Nob.) Une                     |         |        | lancea (Bosc.) . . . . .                    | 1 »      |        |
| * tubulosa mongolica. . . . .                  | 20 »         |        | nouvelle hybride superbe. Eine                    |         |        | lyrata . . . . .                            | 1 »      |        |
| Cette superbe espèce provenant                 |              |        | prachtvolle neue Spielart. . . . .                |         |        | microphylla rotundifolia. . . . .           | 2 »      |        |
| du Caucase, se couvre de magnifi-              |              |        | hirsutus (L.) Cytise hérissé . . . . .            | 2 50    |        | pendula . . . . .                           | 1 »      |        |
| ques fleurs bleu foncé.                        |              |        | Laburnum (L.) Cytise des Alpes. . . . .           | » 50    |        | † monophylla. Fr. heterophylla (V.)         | 1 à 1 50 |        |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr.          | c.     |
|---|--------------|--------|
| FRAXINUS monophylla microphylla . . .   | 1            | »      |
| nana (Willd.). <i>Frêne nain</i> . . .  | 1            | »      |
| nova anglorum . . .   | 1            | »      |
| † nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.) . . .   | 1            | »      |
| † ornus florifera . . .   | 1            | »      |
| ovata (Bosc) . . .  | 1            | »      |
| oxyphylla (Biel.) . . .   | 1            | »      |
| † pannosa (Bosc.) . . .   | 1            | »      |
| † polycarpa (Willd.) . . .  | 1 à 1        | 50     |
| quadrangularis (Mich.) . . .  | 2            | »      |
| † Richardi (Bosc.) . . .  | 1            | »      |
| † sambucifolia (Wld.). <i>Fra excels. div.</i> . . .  | 1            | »      |
| † sinensis . . .  | 1            | »      |
| GAULTHERIA procumbens (L.) . . .  | 1            | »      |
| Shallon (Pursh.) . . .  | 1            | 50     |
| * GENISTA anglica (Lin.) . . .  | »            | 50     |
| germanica (L.) . . .  | »            | 50     |
| ovata (Waldstein.) . . .  | 1            | »      |
| tinctoria sibirica? <i>G. de Sibérie.</i> . . .   | »            | 50     |
| GINKGO biloba (L.). <i>Salisburia adiantif.</i> (Smith.) . . .                                    | 1            | 50 à 5 |
| de graines . . .  | 6            | »      |
| GLEDITSCHIA caspica (Desf.) . . .   | 1            | 50     |
| chinensis (Spreng.) . . .   | 1            | »      |
| macracanthos. <i>Fév. à gr. ép.</i> . . .   | 1            | 50     |
| monosperma (Walt.) . . .  | 2            | »      |
| triacanthos (L.). <i>Fév. à trois pointes.</i> . . .  | 1            | »      |
| inermis, G. lævis. <i>Févier s. épin.</i> . . .   | 1            | 50     |
| GLYCINE frutescens (L.). <i>Glyc. arbriss.</i> . . .  | 1            | »      |
| sinensis, Bot. mag. . . .   | 1            | »      |
| † GUILLANDINA dioica (L.). <i>Gymnocladus Canad.</i> (Lam.) . . .                                 | 1            | 50     |
| HALESIA parviflora (Mich.) . . .  | 1            | 50     |
| tetroptera . . .  | 2            | 50     |
| HEDERA Hélix, fol. albo variegatis, p. $\mathcal{L}$ . . . .                                      | »            | 50     |
| aureo variegatis, p. $\mathcal{L}$ . . . .  | »            | 50     |
| fructu luteo, p. $\mathcal{L}$ . . . .  | »            | 50     |
| hibernica, p. $\mathcal{L}$ . . . .   | »            | 50     |
| palmata, p. $\mathcal{L}$ . . . .   | »            | 50     |
| quinquefolia (L.). <i>Cissus quinq. Vierge vierge</i> . . .                                       | »            | 50     |
| * HIBISBUS syriacus (L.). <i>Mauve en arbre</i> . . .   | 1            | »      |
| * anemoneflora fl. pleno . . .  | 2            | 50     |
| * ardens fl. pleno . . .  | 2            | 50     |
| * fl. albo pleno . . .  | 2            | »      |
| * fl. bicolor pleno . . .   | 2            | 50     |
| * ranunculiflorus plenus . . .  | 3            | »      |
| * fl. roseo pleno . . .   | 3            | »      |
| * rubro pleno . . .   | 2            | »      |
| * fl. striato pleno . . .   | 2            | 50     |
| * fl. violaceo . . .  | 1            | »      |
| * violaceus plenus . . .  | 2            | »      |
| * variegata plena . . .   | 2            | »      |
| HIPPOPHÆ argentea (Pursh.) . . .  | »            | 75     |
| rharnoides (L.). <i>Argousier rham.</i> . . .   | »            | 50     |
| HYDRANGEA arborescens (L.). <i>Hydrangea en arbre</i> . . .                                       | »            | 80     |
| heterophylla (Cels.) . . .  | 1            | 50     |
| * hortensis rubra . . .   | 50 c. à 3 f. |        |
| * coerulea . . .  | 75 c. à 4 f. |        |
| * JAPONICA . . .  | 1 à 5        | »      |
| nivea . . .   | 1            | »      |
| HYPERICUM androsæmum (L.) . . .   | »            | 50     |
| calycinum (L.) . . .  | »            | 50     |
| hircinum (L.). <i>mil. fétide</i> . . .   | »            | 50     |
| prolificum (Lin.) . . .   | »            | »      |
| * JASMINUM fruticans (L.). <i>Jasmin à feuilles de cytise, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . . | »            | 50     |
| * humile (L.). <i>J. d'Italie, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .                             | »            | 50     |
| * officinale (L.) . . .   | 1            | »      |
| * wallichianum (Lindl.) . . .   | 1            | 50     |
| * ILEX Aquifolium (L.). <i>Houx commun, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .                    | 1            | »      |
| * echinata, I. <i>Aquif. ferox, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .                            | 1 à 1        | 50     |
| * fol. argenteo-variegatis, p. $\mathcal{L}$ . . .  | 2            | »      |
| * foliis albo-maculatis, p. $\mathcal{L}$ . . .   | 1 50 à 2 f.  |        |
| * fol. aureo-maculatis, p. $\mathcal{L}$ . . .  | 1            | 50     |
| * fol. aureo-variegatis, p. $\mathcal{L}$ . . .   | 2            | »      |
| * laurifolia, p. $\mathcal{L}$ . . .  | 1            | 50     |
| * pectinata, p. $\mathcal{L}$ . . .   | 3            | »      |
| * picta, nov. var. . . .  | 3            | »      |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr.          | c. |
|---|--------------|----|
| * ILEX recurva, an nova species? . . .  | 2            | »  |
| * serrata, p. $\mathcal{L}$ . I. <i>ciliata.</i> . . .  | 2            | »  |
| * serrata major . . .   | 1            | 50 |
| * balearica (Desf.), p. $\mathcal{L}$ . . .   | 2            | »  |
| * foliis variegatis . . .   | 3            | »  |
| * calamistra . . .  | 3            | »  |
| * canadensis (Mich.). <i>Nemopanthes canadensis</i> DG. . . .   | 2            | »  |
| * castaneæfolia . . .   | 1 50 à 3 f.  |    |
| * Dahoon (Valt.) . . .  | 2            | »  |
| Une collection de 10 espèces de Houx, à notre choix. Eine Sammlung von 10 Ilex, nach unserer Wahl, zu . . .   | 10           | »  |
| NB. Les Ilex demandent une exposition abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.<br>Die Ilex verlangen eine geschützte Lage und müssen im Winter vor Sonnenlicht bewahrt werden. |              |    |
| JULANS alba (Lin.) . . .  | 1            | »  |
| amara (Mich.) . . .   | 1            | 50 |
| cathartica. J. cinerea (Mich.). N. cendr. . . .   | 1            | 50 |
| fraxinifolia (Lin.) . . .   | 1            | »  |
| † nigra (L.). <i>Noyer noir d'Amérique</i> . . .  | »            | 75 |
| olivæformia (Mich.) . . .   | 2            | »  |
| porcina (Mich.) . . .   | 1            | »  |
| † regia (Lin.) . . .  | »            | 75 |
| tomentosa (Mich.) . . .   | 1            | »  |
| * JUNIPERUS Bedfordiana . . .   | 2            | 50 |
| * Bermudiana (Lin.) . . .   | 2            | »  |
| * daurica (Bieb.) . . .   | 3            | »  |
| * Gossamthaneæ . . .  | 2            | 50 |
| * nepalensis . . .  | 1 à 2        | »  |
| * oxycedrus (Lin.), p. $\mathcal{L}$ . . .  | 3            | »  |
| echinoformis . . .  | 3            | 50 |
| * phœnicea. <i>Genève de Phénicie, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .   | 2            | »  |
| prostrata (Mich.), p. $\mathcal{L}$ . . .   | 2            | »  |
| recurva (Hamilt.), p. $\mathcal{L}$ . . .   | 1 à 2        | »  |
| sabina elegans? . . .   | 2            | »  |
| fol. variegatis, p. $\mathcal{L}$ . . .   | 2            | »  |
| * squamata (Don.) . . .   | 3            | 50 |
| suecica, mâle, masc. (Miller), p. $\mathcal{L}$ . . .   | 2            | »  |
| » femelle, fœm., p. $\mathcal{L}$ . . .   | 2            | »  |
| thurifera (L.). <i>Gen. à encens, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .  | 2            | »  |
| virginiana (L.). <i>Cèdre de Virginie, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .   | 75 c. à 1 f. |    |
| ITEA virginica (Lin.) . . .   | 1            | »  |
| * KALMIA angustifolia (L.). <i>Kalmia à feuilles étroites, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .   | 1            | »  |
| * angust. fol. margin. argenteis . . .  | 1            | 50 |
| * Miquelon . . .  | 2            | »  |
| * nitida . . .  | 2            | »  |
| * rubra . . .   | 2            | »  |
| * glauca (Wld.). <i>Kalmia glauque, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .  | 1 à 3        | »  |
| * latifolia (Herb. g.) <i>Kalmia à larges feuilles, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .  | 1 à 5        | »  |
| lucida . . .  | 1            | 25 |
| KERRIA japonica fl. pleno . . .   | »            | 50 |
| fl. simpl. . . .  | 1            | »  |
| † KOELREUTERIA paniculata (P.H.). <i>Sapind. Chin. (L.), p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .   | 1            | »  |
| * LAGERSTROEMIA indica (Linn.) . . .  | 2            | »  |
| * fl. albo . . .  | 2            | 50 |
| * fl. violaceo . . .  | 2            | 50 |
| LAURUS Benzoin (L.). <i>Faux Benjoin, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .  | 1            | »  |
| sassafras (Lin.), petit . . .   | 3            | »  |
| * LEDUM palustre . . .  | 1            | »  |
| latifolium (Herb.) . . .  | 1            | »  |
| * LEYCESTERIA formosa (Wall.) . . .   | 1            | 50 |
| LIGUSTRUM japonicum . . .   | 2            | 50 |
| vulgare foliis variegatis . . .   | 2            | »  |
| fructo albo . . .   | »            | 50 |
| fructo viridi . . .   | 1            | »  |
| LIQUIDAMBAR styraciflua (L.). <i>Copalme d'Amérique, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .   | 1            | »  |
| imberbe (Willd.) . . .  | 1            | 50 |
| † LIRIODENDRON Tulipifera (L.). <i>Tulipier de Virg., de 2<sup>m</sup>,55 à 2<sup>m</sup>,90 de hauteur. Son 2<sup>m</sup>,55 bis 2<sup>m</sup>,90</i> . . .                          | 1            | 50 |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr.     | c. |
|---|---------|----|
| <i>Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Der nämliche im Topf erzogen.</i> . . .  |         |    |
| 1 50  |         |    |
| LIRIODENDRON heterophyllum . . .  | 4       | »  |
| † Tulipifera integrifolia. T. à feuilles entières . . .   | 3       | »  |
| LONGICEBA caprifolium (L.). <i>Chèvre-feuille des Jardins.</i> . . .                            | »       | 50 |
| chinensis (De Cand.) . . .  | 1       | 50 |
| coccinea (Vers) . . .   | 1       | »  |
| cærulea (Lin.) . . .  | »       | 50 |
| Diervilla (L.). <i>Diervilla jaune</i> . . .  | »       | 50 |
| etrusca Savi . . .  | 1       | 50 |
| flava (De Cand.) . . .  | 2       | »  |
| flexuosa (Lodd.) . . .  | 1       | »  |
| Fraseri (Poir.) . . .   | 1       | 50 |
| grata (L.). <i>Periclymenum Belgicum?</i> (Willd.). <i>Schöne Lonicere</i> . . .                | 1       | »  |
| nigra (Linn) . . .  | 1       | »  |
| pallida nova . . .  | 2       | »  |
| Periclymenum quercifolium foliis variegatis . . .   | »       | 50 |
| pyrenaica fl. albo (L.). <i>Chèvre-feuille des Pyrénées, blanc</i> . . .                        | »       | 50 |
| sempervirens fl. rubro (Willd.). <i>Chèvre-feuille toujours vert à fleurs rouges</i> . . .      | »       | 50 |
| symphoricarpos (L.). <i>Symphor.</i> . . .  | »       | 50 |
| tatarica fl. rubro . . .  | »       | 50 |
| xilocarpa (C.). <i>Symph. leucocarpa</i> . . .  | »       | 50 |
| LYCIUM Europæum (L.). <i>Lycium d'Europe</i> . . .  | »       | 50 |
| * MACLURA aurantiaca. <i>Broussonetia tinctoria</i> (Kunth.) . . .                              | 2       | »  |
| MAGNOLIA acuminata (L.). <i>Magnolier à feuilles aiguës. p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . . | 1 à 6   | »  |
| Alexandrina . . .   | 5       | »  |
| auriculata (Mich.). <i>Magnolier auriculé, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .               | 1 à 6   | »  |
| pyramidata, p. $\mathcal{L}$ . . .  | 6       | »  |
| cordata (Mich.). <i>Cucumber Tree, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .                       | 3       | »  |
| discolor (Ventl.) . . .   | 1 à 15  | »  |
| glauca. <i>Arbre du Castor, p. <math>\mathcal{L}</math>.</i> . . .                              | 1 à 10  | »  |
| arborea . . .   | 5       | »  |
| macrophylla (Mich.), p. $\mathcal{L}$ . . .   | 10 à 15 | »  |
| gracilis (Salisb.). <i>Mag. Kobus, Banks</i> . . .  | 1 à 5   | »  |
| purpurea (Curt.) . . .  | 1 à 5   | »  |
| Soulangeana . . .   | 4       | »  |
| speciosa, nova . . .  | 6       | »  |
| striata grandiflora . . .   | 5       | »  |
| Tescherei odorata . . .   | 6       | »  |
| Thompsoniana, nova, p. $\mathcal{L}$ . . .  | 1 à 5   | »  |
| tripelata (L.). <i>Magn. umbrella</i> (Herb. gen.), p. $\mathcal{L}$ . . .                      | 2 à 5   | »  |
| triumphans . . .  | 5       | »  |
| Yulan (Des Fontaines) . . .   | 6       | »  |
| MENISPERMUM canadense (L.). <i>Ménisperm. du Canada</i> . . .                                   | »       | 50 |
| laurifolium . . .   | »       | 50 |
| * MENZIESIA polifol. (Jussien), p. $\mathcal{L}$ . . .  | »       | 50 |
| * alba, p. $\mathcal{L}$ . . .  | 1       | 50 |
| globularis? (Salisb.), p. $\mathcal{L}$ . . .   | 1       | »  |
| MESPILUS acuminata? . . .   | 1       | 50 |
| amelanchier (Lin.) . . .  | 1       | »  |
| Aronia? . . .   | 1       | »  |
| calpodendron (Ehrh.) . . .  | 1       | »  |
| canadensis (L.) . . .   | 1       | »  |
| chamæspilus (L.) . . .  | 1       | »  |
| fissa (Poir.) . . .   | 1       | »  |
| flabellata (Bosc.) . . .  | 1       | »  |
| gradiflora (Smith.) . . .   | 1       | »  |
| lucida latifolia . . .  | 1       | »  |
| melanocarpa (Spr.) . . .  | 1       | 50 |
| odorata (Bosc.) . . .   | 1       | »  |
| pentagyna (Spreng.) . . .   | 1       | »  |
| * pyracantha (Lin.) . . .   | 1 à 3   | »  |
| tanacetifolia (Poir.) . . .   | 1       | »  |

### MORUS.

#### MURIERS. — Mautbeerbaume.

Nous fournissons au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.



| <i>La pièce. Das Stück.</i>  | fr. c.   |
|--|----------|
| Die Sorten die gewöhnlich zur Seidenzucht angewendet sind, können zu hundert und auch zu tausend abgegeben werden. |          |
| † MORUS alba (L.). <i>Mûrier blanc, sur-choix</i> . Besondere Wahl . . . . .                                       | 1 »      |
| Semis de 2 ans. 2jährige Sämling. o/o . . . . .  | 1 50 à 3 |
| » » » oo/oo . . . . .  | 15 à 25  |
| alba hispanica . . . . .   | 1 à 1 50 |
| chinensis latifolia . . . . .  | 1 »      |
| Constantinopolitana . . . . .  | 2 »      |
| elata . . . . .  | 1 »      |
| Moretii . . . . .  | 1 »      |
| Semis de 2 ans. 2jährige Sämling. o/o . . . . .  | 2 à 4 »  |
| » » » oo/oo . . . . .  | 16 à 35  |
| Semis de 3 ans. 3jährige Sämling. o/o . . . . .  | 3 à 5 »  |
| » » » oo/oo . . . . .  | 25 à 40  |
| papyrifera (L.). <i>Broussonetia papyr.</i> . . . .  | 1 »      |
| foemina . . . . .  | 1 »      |
| rubra (Lin.) . . . . .   | 2 »      |
| tatarica. <i>Mûrier de la Tartarie</i> . . . . .   | 1 50     |
| MYRYCA Caroliniensis (Mill.), mâle. <i>Cirier de la Caroline, mâle, p. L.</i> . . . .                              | 1 »      |
| foemina, femelle . . . . .   | 1 »      |
| Id. 12 replants. 12 versezte Pflanz. . . . .   | 3 »      |
| Gale (Lin.) . . . . .  | 1 »      |
| ONONIS fruticosa (Willd.) . . . . .  | » 50     |
| PEONIA arborea pleno . . . . .   | 2 à 12 » |
| ARCHINTA pleno carmosino . . . . .   | 3 à 10 » |
| Carli . . . . .  | 10 »     |
| CHAUVERII plenissima major . . . . .   | 3 à 10 » |
| Grand-duc de Baden . . . . .   | 5 »      |
| Heldi . . . . .  | 10 »     |
| Kœchlini ruberrimo pleno . . . . .   | 6 »      |
| Muhlenbeckii . . . . .   | 5 à 10 » |
| Ottoii . . . . .   | 5 »      |
| papaveracea . . . . .  | 3 à 10 » |
| pleno . . . . .  | 10 »     |
| roseo pleno . . . . .  | 5 »      |
| roseo odorato . . . . .  | 10 »     |
| maxima millipetala pallida . . . . .   | 25 à 50  |
| Schulthesii plena lilacina . . . . .   | 10 »     |
| splendens semipleno . . . . .  | 10 à 15  |
| Victoria albo pleno . . . . .  | 16 »     |
| Vallneri rub. plenissimo . . . . .   | 10 »     |

### PAULOWNIA IMPERIALIS.

Arbre magnifique, qui est destiné à un rôle de premier ordre dans la décoration de nos jardins. Prachtvoller Baum, der bestimmt ist in unsern Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen . . . . .

|   |          |
|---|----------|
| PERIPLOCA græca (L.). <i>Périploca grec.</i> . . . .                              | » 50     |
| PHILADELPHUS coronarius (L.). <i>Syringa coronarius, fl. semi-pleno</i> . . . . . | 1 »      |
| floribundus (Schrad.) . . . . .   | 1 »      |
| gordonianus (Lindl.) . . . . .  | 1 50     |
| gracilis (De Cand.) . . . . .   | 1 50     |
| grandiflorus (Willd.) . . . . .   | 1 50     |
| inodorus (L.). <i>Syringa sans odeur</i> . . . . .                                | » 80     |
| foliis variegatis . . . . .   | 1 »      |
| nanus var. <i>Ph. coronarius. Syringa nain</i> . . . . .                          | 1 »      |
| pubescens . . . . .   | 1 »      |
| speciosus (Schrad.) . . . . .   | 1 »      |
| Zeyeri (Schrad.) . . . . .  | 1 »      |
| * PHILLYREA latifolia . . . . .   | 1 50     |
| ** PINUS Abies (L.). <i>Picea rubra</i> (Du Roi). <i>Epicea, p. L.</i> . . . . .  | » 80     |
| ** alba (Ait.). <i>Sapin argenté, p. L.</i> . . . . .                             | 1 50     |
| Abies Moringa, petit, klein, p. L. . . . .  | 4 »      |
| austriaca? . . . . .  | 1 »      |
| balsamea. <i>Baumier de Gilead, p. L.</i> . . . .                                 | 1 à 3 »  |
| Banksia (Wld.). <i>P. rupestris</i> (Mich.) p. L. . . . .                         | 4 »      |
| canadensis Hemlock. <i>Spruce, p. L.</i> . . . .                                  | 1 50 à 3 |
| Cedrus (L.). <i>Cèdre du Liban, Ceder-sichte</i> . . . . .                        | 2 à 4 »  |
| Cembra (Lin.), p. L. . . . .  | 1 à 3 »  |
| cephalonica, petit, klein, p. L. . . . .  | 3 »      |
| clambrasiliana, petit, klein, p. L. . . . .                                       | 3 »      |
| Coulteri (Don.), p. L. . . . .  | 10 »     |
| * Deodora (Rex.). <i>Cedrus deodora</i> . . . .                                   | 3 50     |
| * excelsa (Camb.), p. L. . . . .  | 4 à 8 »  |
| filifolia nova . . . . .  | 5 à 25 » |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>  | fr. c.   |
|--|----------|
| PINUS Fraseri, p. L. . . . .   | 2 à 3 »  |
| * halepensis (Willd.). <i>Pin de Jérusalem, p. L.</i> . . . . .  | 1 50     |
| Hudsoniana nova, p. L. . . . .   | 10 »     |
| lanceolata Belis jaculifol., de boutures . . . . .   | 1 50 à 3 |
| de graines, 4 décim. 50 centim. de hauteur . . . . .   | 2 à 8 »  |
| Idem, de 6 à 8 décim. de hauteur. . . . .  | 10 »     |
| ** Laricio, P. Laricio. <i>Pin de Corse, p. L.</i> . . . . .   | 1 »      |
| ** Larix (L.). <i>Mélèze, Lerchenfichte, p. L.</i> . . . . .   | » 50     |
| * longifolia (Lamb.) . . . . .   | 4 à 12 » |
| ** maritima (Willd.). <i>Pin de Bordeaux, p. L.</i> . . . . .  | 1 »      |
| * Menziesi (Hort.) . . . . .   | 3 »      |
| Morinda, petit, klein . . . . .  | 3 »      |
| microcarpa (Willd.) . . . . .  | 3 »      |
| Mughus (W.). <i>Pinus montata Berg-sichte, p. L.</i> . . . . .   | 1 »      |
| nigra (Aiton), p. L. . . . .   | 2 »      |
| orientalis, petit, klein . . . . .   | 8 »      |
| pendula (L.). <i>Larix pendula</i> (Wld.), p. L. . . . .   | 2 »      |
| * Picea . . . . .  | » 80     |
| cinerea, petit, klein, p. L. . . . .   | 4 »      |
| * patula (Cham.), p. L. . . . .  | 10 à 20  |
| pichta nova, p. L. . . . .   | 3 »      |
| Pinsapo, nov. sp., p. L. . . . .   | 3 »      |
| Pumilio (Wld.). <i>Krummholzfichte, p. L.</i> . . . .  | 1 »      |
| pungens (Mich.), p. L. . . . .   | 1 50 à 3 |
| rigda (Willd.), p. L. . . . .  | 1 50     |
| serotina (Mich.), p. L. . . . .  | 1 50     |
| * Smithi (Lond.), p. L. . . . .  | 2 à 8 »  |
| * spectabilis (Lam.), p. L. . . . .  | 8 à 15 » |
| ** strobis. <i>Pin du lord Weymouth, p. L.</i> . . . . .   | 1 à 2 »  |
| sylvestris. <i>Pin de Haguenau, Pin de Riga, p. L.</i> . . . . .   | » 60     |
| taurica, p. L. . . . .   | 3 »      |
| NB. Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des espèces marquées de **, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.  |          |
| NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten versezte Tannen- oder Nadelhölzer-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr. für 30 Centimeter Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.  |          |
| Plus, le 100 différents pins élevés en pots, mélangés. Mehr, 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten, untereinander . . . . .  | 50 »     |
| NB. Le repiquage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature, formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidents imprévus qui, seuls, peuvent causer leurs pertes, tandis que les sujets non repiqués ne réussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.            |          |
| NB. Das Verpflanzen der jungen Nadelhölzer ist für's Wiederauwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versezten Pflanzen scheinen dadurch in eine andere Natur, zum Wiederauwachsen geneigt, verwandelt zu werden, ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufälle hindern dasselbe, während beinahe alle nicht versezten Nadelhölzer, und bei einer ganz besonders günstigen Witterung, selten wiederum wachsen. |          |
| PLANERA ulmifolia (Michx.) . . . . .   | 1 50     |
| PLATANUS à feuilles entières. Mit ganzen Blättern . . . . .  | 1 50     |
| à feuilles laciniées. Mit geschnittenen Blättern . . . . .   | 1 50     |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr. c.     |
|---|------------|
| PLATANUS cuneata (Willd.) . . . . .   | 1 50       |
| macrophylla . . . . .   | 2 »        |
| † occidentalis (L.). <i>Platane d'Occident</i> . . . . .                                      | 1 à 1 50   |
| † POPULUS alba (L.). <i>L'Ypréau</i> . . . . .  | 1 »        |
| foliis variegatis . . . . .   | 1 »        |
| argentea, P. heterophylla (Mich.) . . . . .   | 1 »        |
| balsamifera (Lin.) . . . . .  | » 50       |
| † canadensis (Mich.) <i>P. du Canada</i> . . . .  | 1 »        |
| candicans (Ait.), var. <i>Populus balsamifera</i> . . . . .                                   | » 50       |
| caroliniensis, <i>Populus angulata</i> (W.) græca (Willd.). <i>Peuplier d'Athènes</i> . . . . | 1 »        |
| † italica (Willd.), P. dilata. <i>Peuplier d'Italie. Italienische Pappel zu Al-</i>           | 25 à 60 c. |
| len . . . . .   | 1 50       |
| laurifolia (Ledeb.) . . . . .   | 1 »        |
| Ontariensis . . . . .   | 1 »        |
| tremuloides (Mich.) . . . . .   | 1 »        |
| vistulæ . . . . .   | 1 »        |
| POTENTILLA fruticosa (L.). <i>Potentille arbrisseau</i> . . . . .                             | » 50       |
| PRINOS verticillata (Lin.) . . . . .  | 1 50       |
| PRUNUS acuminata (Mich.) . . . . .  | 1 »        |
| avium flore pleno. <i>Merisier à fleurs doubles</i> . . . . .                                 | 1 »        |
| Brigantica (Vill.) . . . . .  | 1 »        |
| CERASUS fl. pleno . . . . .   | » 88       |
| Chamaecerasus (Willd.). <i>Cerisier de Sibérie</i> . . . . .                                  | 1 »        |
| Chicasa (Mich.) . . . . .   | 1 »        |
| pendula (Desf.) . . . . .   | 1 »        |
| græca (Desf.) . . . . .   | 1 »        |
| hyemalis (Mich.) . . . . .  | 1 50       |
| * Lauro-Cerasus (L.). <i>Laurier-aman-</i>  | 1 »        |
| <i>dier, p. L.</i> . . . . .  | 1 50       |
| * Lauro-Cerasus angustifolius . . . . .   | 1 50       |
| * foliis var. . . . .   | 2 »        |
| * Echidne . . . . .   | 2 »        |
| * Lusitanica (Spr.) . . . . .   | » 50       |
| Mahaleb (L.). <i>Arbre de Ste Lucie</i> . . . . .   | 1 »        |
| Myrobolana alba . . . . .   | 1 »        |
| nigra fl. pleno. <i>Prunelle à fl. doub.</i> . . . .  | 2 »        |
| Padus acunbœfolia . . . . .   | » 50       |
| bracteata (DC) . . . . .  | 1 »        |
| prostrata (Labil.) . . . . .  | » 75       |
| rubra (Willd.). <i>Merisier à grappes rouges</i> . . . . .                                    | 1 à 3 »    |
| heterophylla foliis variegatis . . . . .  | 1 »        |
| pumila (Mich.) . . . . .  | 1 »        |
| raguminosa? . . . . .   | 1 50       |
| reclinata (Bosc.) . . . . .   | 1 »        |
| serotina (Erh.) . . . . .   | 1 50       |
| serrulata (Lindl.), fl. pleno . . . . .   | 1 50       |
| Susquehaneae (De Cand.) . . . . .   | 1 »        |
| virginiana (Lin.) . . . . .   | » 50       |
| PTELEA trifoliata . . . . .   | 1 »        |
| PTEROCARYA caucasica (Spreng.). <i>Juglans fraxinifolia?</i> . . . . .                        | 1 »        |
| PYRUS angustifolia (Wld.). <i>Malus sem-</i>  | 1 »        |
| pervirens (D.), atrovirens? . . . . .   | » 50       |
| arbutifolia nigra, M arb. nig. . . . .  | 1 »        |
| rubra . . . . .   | 1 »        |
| Aria rotundifolia . . . . .   | 1 »        |
| suecica . . . . .   | 1 »        |
| baccata (L.). <i>Pommier baccifère</i> . . . . .  | 1 »        |
| fructu luteo, à fruit jaune . . . . .   | » 50       |
| communis fl. pleno. <i>Poirier à fleurs doubles</i> . . . . .                                 | 1 »        |
| communis foliis variegatis . . . . .  | 1 »        |
| coronaria. <i>Pommier odorant</i> . . . . .   | 1 »        |
| edulis (Wld.). <i>Cratægus edulis</i> (L.).   | 1 »        |
| elæagnifolia (Pallas) . . . . .   | 1 »        |
| heterophylla (Steud) . . . . .  | 1 »        |
| hybrida . . . . .   | 1 »        |
| intermedia (Willd.). <i>Py. hybrida</i> (Wendl.) . . . . .                                    | 1 à 2 »    |
| * japonica flore rubro . . . . .  | 1 à 2 »    |
| * flore albo . . . . .  | 1 »        |
| linearis . . . . .  | 1 »        |
| malus monstrosa . . . . .   | 1 »        |
| Michauxi, nov. spec. . . . .  | 1 »        |
| microcarpa . . . . .  | 1 »        |
| nivalis (Willd.) . . . . .  | 1 »        |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>             | fr. c.  | <i>La pièce. Das Stück.</i>             | fr. c.   | <i>La pièce. Das Stück.</i>            | fr. c.     |
|---|---------|---|----------|--|------------|
| PYRUS odorata . . . . .                 | 1 »     | * RHODODENDRON nerifolium, nov. . .     | 5 »      | ROBINIA grandiflora . . . . .          | » 50       |
| orientalis (Hort.) . . . . .            | 1 »     | TRIOMPHE DE MULHOUSE. . . . .           | 6 à 15 » | Gundini, R. stricta R. monstrosa?      | 1 »        |
| Pollveria (Lin.). P. Bollwilleriana     |         | Vaucher. . . . .                        | 2 à 5 »  | Halodendron R. satiné. . . . .         | 1 »        |
| (De G.) . . . . .                       | 1 »     | PONTICUM . . . . .                      | 1 à 3 »  | † hispida (Lin.). Acacia rose. . .     | 1 »        |
| prunifolia (Willd.) . . . . .           |         | Idem, la douzaine de replants de        |          | † arborea. . . . .                     | 1 »        |
| salicifolia (Willd.) Poirier à feuilles |         | 3 ans. Das Duzend 3jähr. Pflanzen.      | 4 »      | † inermis, R. umbraculifera (DC.).     |            |
| de saule. . . . .                       | 1 »     | album, R. niveum. . . . .               | 3 à 6 »  | Acacia sans épines, acacia-boule.      |            |
| salviaefolia . . . . .                  | 1 »     | angustifolium . . . . .                 | 2 »      | Rugel=Acacien . . . . .                | 1 à 2 »    |
| spectabilis flore pleno. . . . .        | 1 »     | atrovirens . . . . .                    | 3 »      | macrophylla, nov. spec. . . . .        | 1 »        |
| QUERCUS Aegilops (Lin.) . . . . .       | 2 »     | azureum . . . . .                       | 4 »      | microphylla . . . . .                  | 1 »        |
| alba (Lin.) . . . . .                   | 1 50    | Bekeri. . . . .                         | 10 »     | myrtifolia . . . . .                   | 1 »        |
| appennina (Lam.) . . . . .              | 1 50    | bullatum. . . . .                       | 3 »      | * procera. . . . .                     | 1 »        |
| austriaca (Willd.) . . . . .            | 2 »     | cœruleum? . . . . .                     | 3 »      | pyramidata. . . . .                    | 1 »        |
| bullata. . . . .                        | 5 »     | Cunninghami album. . . . .              | 3 à 5 »  | † Pseudo-acacia (L.) Robinier aca-     |            |
| Cerris (Lin.) . . . . .                 | 1 50    | cupreum. . . . .                        | 2 à 5 »  | cia, faux acacia . . . . .             | 50 à 80 c. |
| coccinea (Wangh.) . . . . .             | 2 »     | elegantissimum . . . . .                | 3 à 6 »  | crispa, nov. var. Krausblättrige Aca-  |            |
| discolor (Willd.). Q. falcata . . .     | 2 »     | GRAND DUC DE BADEN . . . . .            | 4 à 6 »  | cia . . . . .                          | 1 »        |
| faginea. . . . .                        | 2 »     | foliis aureo variegatis. . . . .        | 5 »      | JASPIDEA nova . . . . .                | 2 »        |
| ferruginea . . . . .                    | 2 »     | hyacinthiflorum, fl. pleno. . .         | 3 à 8 »  | inermis, R. spectabilis . . . . .      | 1 »        |
| imbricata. . . . .                      | 1 50    | coronatum . . . . .                     | 5 »      | † pendula . . . . .                    | 1 50       |
| laciniata . . . . .                     | 4 »     | flore purpureo . . . . .                | 3 »      | † sophoræfolia, nov. spec. . . .       | 1 »        |
| macrocarpa (Mich.) . . . . .            | 4 »     | * latifolium, p. L. . . . .             | 2 »      | spinosa . . . . .                      | 1 50       |
| obtusiloba, jeunes plants. Junge.       | 1 »     | Marazoi . . . . .                       | 3 à 8 »  | stricta. . . . .                       | 1 »        |
| palustris (Mich.). Quer. paludosa?      |         | miniaturum, p. L. . . . .               | 2 »      | tortuosa. R. tortueux. . . . .         | 1 »        |
| Pine Oak. . . . .                       | 1 50    | multimaculatum . . . . .                | 5 »      | major . . . . .                        | 1 »        |
| Phellos (Mich.). Willow. Oak. . .       | 2 »     | oculatum. . . . .                       | 4 »      | pendula . . . . .                      | 1 50       |
| Prinus discolor (M.). Swamp white       |         | pictum, p. L. . . . .                   | 6 »      | † viscosa (Willd.). Acacia glutant     | 1 »        |
| Oak. . . . .                            | 1 »     | primus lauro cerasifolia. . . .         | 15 »     | † alba . . . . .                       | 1 50       |
| monticola? . . . . .                    | 2 »     | pulverulentum? . . . . .                | 3 »      | horrida . . . . .                      | 1 50       |
| tomentosa (Mich.). Q. bicolor           |         | * PUNCTATUM, Rhod., ponctué p. L.       | 3 »      | RUBUS fruticosus laciniatus. Ronce la- |            |
| (Willd.) . . . . .                      | 2 »     | pyramidalis. . . . .                    | 2 »      | cinée . . . . .                        | » 50       |
| pyramidalis. . . . .                    | 1 à 5 » | salicifolium variegatum. . . . .        | 4 »      | flore albo pleno. . . . .              | 1 »        |
| Robur macrocarpa? . . . . .             | 2 »     | * solandraefolium, nov. p. L. . .       | 4 »      | flore roseo pleno. . . . .             | 1 »        |
| foliis variegatis . . . . .             | 2 »     | Van Houtti plena . . . . .              | 4 à 12 » | foliis variegatis . . . . .            | 1 »        |
| rubra montana (Mich.). Ch. rouge        |         | violaceum grandiflorum . . . . .        | 9 »      | nootkanus . . . . .                    | 1 à 2 »    |
| des mont. . . . .                       | 1 à 2 » |   |          | odoratus (L.). Framboisier du Ca-      |            |
| tinctoria (Mich.) QUERCITRON. Fär-      |         | N. B. Les Rhododendrons en boutons      |          | nada . . . . .                         | » 50       |
| ber=Eiche . . . . .                     | 2 à 3 » | coûtent un quart de plus Die Rhododen-  |          | fl. albo . . . . .                     | 1 »        |
| * Zang (d'Algérie) . . . . .            | 3 »     | dron mit Knospen kosten ein Quart mehr. |          | spectabilis (Pursh.). . . . .          | 1 50       |
| Idem, une collection de 15 espèces de   |         | Idem, une collection de 20 espèces de   |          | RUSCUS aculeatus (Linn.) . . . . .     | 1 »        |
| Chênes avec noms, à notre choix.        |         | Rhododendrons avec noms, à notre        |          | hypoglossum? . . . . .                 | 1 »        |
| Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen,     |         | choix. Eine Sammlung von 20 Sorten      |          | SALIX alba . . . . .                   | » 50       |
| nach unserer Wahl . . . . .             | 15 »    | Rhododendron mit Namen, nach unserer    |          | Aglæi. . . . .                         | » 50       |
| RHAMNUS Alaternus. . . . .              | 1 »     | Wahl. . . . .                           | 30 »     | americana nigra. . . . .               | 1 »        |
| foliis variegatis . . . . .             | 1 50    | RHODORA canadensis (Linn.) . . .        | 2 »      | † babylonica (S.). Saule pleureur      |            |
| canadensis . . . . .                    | 1 »     | RHUS aromatica (Willd.) . . . . .       | 1 »      | Trauer=Weide . . . . .                 | » 80       |
| hybridus (Hort.) . . . . .              | 1 »     | copallina (L.). Sumac ailé. . . .       | 1 »      | † babylonica annularis. Saule de       |            |
| * latifolius (l'Hérit.) . . . . .       | 2 »     | Cotinus (L.). Sumac fueter. . . .       | 1 »      | Ste-Hélène. . . . .                    | 1 »        |
| montanus? . . . . .                     | 2 »     | elegans (Willd.) . . . . .              | 1 »      | bicolor (Ehrh.). Saule à deux cou-     |            |
| volubilis (Linn.) . . . . .             | 2 »     | glaba (Spr.) . . . . .                  | » »      | leurs . . . . .                        | » 30       |
| RHODODENDRON Adansonii . . . . .        | 2 à 5 » | Toxicodendron (L.). Sum vénéneux        | 1 »      | daphnoides (Will.) . . . . .           | » 50       |
| azaloides (Desf.) . . . . .             | 2 à 3 » | typhina (L.). Sumac de Virginie .       | 1 »      | herbacea. . . . .                      | 1 »        |
| Cartoni, petit. . . . .                 | 3 »     | vernix (L.) . . . . .                   | » 50     | holosericea (Wild.) . . . . .          | » 50       |
| CATESBÆI (Lod.) . . . . .               | 3 »     | RIBES atro-sanguineum, novum. . .       | » 50     | jaspidea . . . . .                     | » 50       |
| Catawbiense (Mich.) . . . . .           | 2 à 3 » | aureum, fructu-globuloso (Herb. g.)     |          | mollissima (Ehrh.) . . . . .           | » 50       |
| Carlil, nov. var. . . . .               | 2 à 5 » | Chrysobotrya intermedia (Spech.)        | » 50     | Napoleonis, S. sibirica pendula . .    | 1 »        |
| CAUCASICUM, flore albo . . . . .        | 3 »     | biflorum. . . . .                       | » 50     | Le même greffé sur Salix caprea        |            |
| fl. rubro . . . . .                     | 3 »     | coccineum, novum, R. purpureum          |          | haute tige, comme saule pleu-          |            |
| superbum . . . . .                      | 2 à 5 » | Diac? . . . . .                         | 1 »      | reur pour les pays froids. . . .       | 3 »        |
| * caucasoides, nov. sp., p. L. . . .    | 3 »     | coccineum plena. . . . .                | 4 »      | nigra. (Wall.) . . . . .               | » 50       |
| DAURICUM (Willd.), p. L. . . . .        | 1 à 2 » | diacanthum (W.) . . . . .               | » 50     | purpurea (L.) . . . . .                | » 50       |
| FERRUGINEUM roseum. . . . .             | 1 50    | echinatum Douglas. . . . .              | 1 à 2 »  | reticula (L.) . . . . .                | » 50       |
| HIRSUTUM (De Cand.), p. L. . . . .      | 1 »     | floridum (Willd.). Gross. de Pensyl-    |          | riparia (Willd.) . . . . .             | » 50       |
| rotundifolium, nov. . . . .             | 5 »     | vanie . . . . .                         | » 50     | rosmarinifolia (Gouan) . . . . .       | » 50       |
| Goveyanum. . . . .                      | 3 »     | malvaceum, R. purpureum? . . .          | 1 »      | viridis. . . . .                       | » 50       |
| hybridum . . . . .                      | 2 »     | nigrum variegatum. Gross. noir pa-      |          | SAMBUCUS alba? . . . . .               | » 75       |
| Couranti, nov. ver., lilas . . . . .    | 3 à 6 » | naché. . . . .                          | » 50     | canadensis (De Cand.) . . . . .        | » 75       |
| Empereur de Maroc; pourpre foncé        | 4 »     | palmatum, fruct. obl. (Desfont.),       |          | nigra flore pleno. . . . .             | » 75       |
| KAMTSCHATICUM . . . . .                 | 4 »     | Chrysobotrya revoluta (Spach) .         | » 50     | foliis albo variegatis. . . . .        | » 75       |
| magnoliæfolium, p. L. . . . .           | 3 »     | petraeum (Jacq.) . . . . .              | » 50     | foliis luteo variegatis . . . . .      | 1 »        |
| MAXIMUM (L.) . . . . .                  | 2 »     | populneum? . . . . .                    | 1 »      | heterophylla . . . . .                 | 1 »        |
| Idem, 25 plantes de 3 ans. 25           |         | speciosum (Purck.) . . . . .            | 2 »      | nigra laciniata. . . . .               | » 50       |
| 3jährige Pflanzen . . . . .             | 7 »     | triflorum (Pursh.) . . . . .            | 2 »      | monstrosa . . . . .                    | » 50       |
| flore roseo carmosino, p. L. . . .      | 3 »     | viscosum. . . . .                       | 1 »      | pulverulenta . . . . .                 | 1 »        |
| coccineum . . . . .                     | 3 »     | ROBINIA Altavana . . . . .              | 1 »      | racemosa. . . . .                      | » 50       |
| flore albo . . . . .                    | 3 »     | † amorphæfolia. . . . .                 | 1 »      | symphoria mexicana . . . . .           | 1 »        |
| Lady Warender. . . . .                  | 3 à 5 » | Caragana (L.) Rob. de Sibérie. . .      | » 50     | † SOPHORA japonica (L.). Sophora du    |            |
| * rose tigrée . . . . .                 | 3 à 5 » | Chamlagu (Willd.). Robinier de la       |          | Japon. . . . .                         | 1 50       |
| microphyllum. . . . .                   | 3 »     | Chine . . . . .                         | 1 »      | foliis variegatis . . . . .            | 1 50       |
| Miellii. . . . .                        | 4 »     | cylindrica? . . . . .                   | 1 »      | † pendula . . . . .                    | 2 »        |
| pictum novum. . . . .                   | 2 à 8 » | † dubia . . . . .                       | 1 »      | † Sorbus americana. Sorbier d'Amér.    | 1 »        |
| rubrum . . . . .                        | 4 »     | echinata (Mich.) . . . . .              | 1 »      | † aucuparia (L.) Sorb. des oiseleurs.  | 1 »        |
| Queen Victoria . . . . .                | 4 à 8 » | formosissima . . . . .                  | 1 »      | † domestica Eßtriche. . . . .          | 2 à 3 »    |
| Schœnianum . . . . .                    | 2 6 »   | frutescens (L.) . . . . .               | 1 »      | serotina . . . . .                     | 1 à 3 »    |



| La pièce. Das Stück.                      |          | La pièce. Das Stück.                   |             | La pièce. Das Stück.                      |      |
|---|----------|--|-------------|---|------|
| fr.                                       | c.       | fr.                                    | c.          | fr.                                       | c.   |
| * SPARTIUM junceum (L.). Genêt d'Es-      |          | SYRINGA persica. Lilas de Perse. . .   | 1 »         | † ULMUS latifolia. . . . .                | 1 50 |
| pagne . . . . .                           | » 50     | flore albo. . . . .                    | 1 »         | † rugosa . . . . .                        | 1 50 |
| flore pleno . . . . .                     | 1 50     | laciniata. Lilas à f. découpées. . .   | » 50        | suberosa (Ehr.) . . . . .                 | 1 »  |
| SPIRÆA acutifolia (Willd.) . . . . .      | » 50     | Sanger. . . . .                        | 1 »         | VACCINIUM amœnum (Ait.) . . . . .         | 3 »  |
| alpina (Pallas.) . . . . .                | » 50     | grandiflora. Lilas Charles X. . .      | 1 »         | elatum ? . . . . .                        | 2 »  |
| aquilegifolia (Wall.) . . . . .           | » 50     | flore. albo. Lilas commun à fleurs     |             | macrocarpum (Willd.) . . . . .            | 1 »  |
| ariæfolia (Smith.) . . . . .              | 1 50     | blanches . . . . .                     | » 90        | Oxycoccus Schollera Oxycoc (Pers.)        |      |
| bella (Bot. mag.) . . . . .               | 1 à 1 50 | flore rubro (L. de Marly). . . .       | » 80        | p. 2 . . . . .                            | 1 »  |
| betulæfolia (Wall.) . . . . .             | » 50     | virginalis. . . . .                    | » 80        | salicifolium (Stew.) . . . . .            | 1 50 |
| cana (De Cand.) . . . . .                 | » 50     | valentiana . . . . .                   | 1 »         | VIBURNUM dentatum (Linn.) . . . . .       | 1 »  |
| canadensis (L.) . . . . .                 | 1 »      | TAMARIX gallica (L.). Tamarisc de      | » 80        | edule (Pursh.) . . . . .                  | » 50 |
| corymbosa . . . . .                       | » 50     | France. . . . .                        | » 80        | Lentago (L.). V. luisante. . . . .        | 1 »  |
| crenata (L.). Spirée à feuilles cren.     | » 50     | germanica (L.). Tam. d'Allemagne.      | » 50        | fol. variegatis . . . . .                 | 2 »  |
| taurica. . . . .                          | » 50     | indica . . . . .                       | 1 »         | Opulus roseum V. stérile, pelote de       |      |
| Douglasii (Hook.) . . . . .               | 3 »      | libanotis. . . . .                     | 1 »         | neige . . . . .                           | » 50 |
| hypericifolia (Lin.) . . . . .            | » 50     | TAXUS baccata (L.) If commun, p. 2.    | 1 50        | prunifolium (L.). Vib. à feuilles de      |      |
| lævigata (Lin.) . . . . .                 | » 50     | foliis aureo variegatis, p. 2. . .     | 1 à 2 »     | prunier . . . . .                         | 1 »  |
| lancifolia, nov. spec. . . . .            | 1 »      | hybernica (Hook.). T. pyramidalis.     | 1 à 2 »     | * pubescens (Pursh.) . . . . .            | 1 50 |
| Lindleyana (Wall.) . . . . .              | 2 »      | THUJA filiformis (Hort.) . . . . .     | 4 »         | sibiricum (Hort) . . . . .                | 1 50 |
| nicordensis? . . . . .                    | 1 »      | occidentalis (L.). Arbre de vie d'Oc-  |             | * Tinus (L.) . . . . .                    | 1 50 |
| opulifolia (L.). Spirée à f. d'Obie       | » 50     | cident, p. 2. . . . .                  | 50 c. à 1 f | * foliis variegatis . . . . .             | 1 50 |
| fol. luteis. . . . .                      | » 50     | orientalis (L.) Arbre de vie d'Orient. | 50 c. à 1 f | VIRGILIA lutea (Willd.) . . . . .         | 2 »  |
| reflexa? . . . . .                        | 1 »      | pyramidata. . . . .                    | 1 25        | VITEX agnus castus (L.) . . . . .         | » 50 |
| salicifolia flore albo. Spirée à feuil-   |          | tatarica, p. 2. . . . .                | 2 »         | heterophylla fol. var. . . . .            | 1 50 |
| les de Saule. . . . .                     | » 50     | TILIA alba (Hort. Kew) . . . . .       | 1 »         | VITIS cordata. . . . .                    | 2 »  |
| flore roseo . . . . .                     | » 50     | rosea . . . . .                        | 1 »         | Labrusca (L.). Vigne cotonneuse. .        | 1 »  |
| sorbifolia (Lin.) . . . . .               | » 50     | † americana (L.). Tilleul d'Améri-     |             | vulpina. V. de Renard. . . . .            | » 50 |
| thalictroides (Pall.) . . . . .           | » 50     | que. . . . .                           | 1 »         | ZANTHOXYLUM Clava-Herculis (L.)           |      |
| tomentosa. Spirée coton, p. 2. . .        | » 50     | † argentea nova . . . . .              | 1 »         | Zanth. à grandes aiguilles . . .          | 1 »  |
| triloba. Spirée à trois lobes. . . .      | » 50     | asplenifolia nova, à feuilles d'Asplen | 1 »         | Plus, à notre choix, une collection d'ar- |      |
| ulmifolia (Scopoli.) . . . . .            | » 50     | aurea . . . . .                        | 1 »         | bustes et arbres d'ornement de pleine     |      |
| Une collection de 100 sujets en 10        |          | † europæa (L.). Tilleul d'Europe. .    | 1 à 1 50    | terre en 100 différentes espèces, as-     |      |
| espèces. Eine Sammlung von 100            |          | macrophylla . . . . .                  | 1 »         | sorties avec noms. Mehr, nach unserer     |      |
| Stück in 10 Sorten . . . . .              | 10 »     | † mississippiensis (Desf.) . . . .     | 1 »         | Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten,       |      |
| STAPHYLEA pinnata, L. (L) Staphilier      |          | † pendula. . . . .                     | 1 »         | Ziersträucher mit Namen . . . . .         |      |
| à feuilles pennées . . . . .              | » 50     | triflora (Horn.) . . . . .             | 1 50        | Plus, à notre choix, 1000 beaux sujets    |      |
| trifoliata (L.). Staph. à trois feuilles. | » 50     | † Ulex europæus. . . . .               | 1 50        | d'un bel assortiment d'arbustes d'or-     |      |
| * STEWARTIA malacodendron (Lin.).         | 3 »      | hybernica . . . . .                    | 1 »         | nement, en 30 espèces différentes,        |      |
| SYRINGA chinensis (Wld.). Lilas varin     | » 80     | * nanus, fl. pleno . . . . .           | 1 »         | avec noms. Mehr, nach unserer Wahl,       |      |
| Josikea, nov. spec. . . . .               | 1 »      | * nepalensis? . . . . .                | 1 »         | 1000 sehr schöne Verzierungs-Sträucher,   |      |
| pallida. . . . .                          | 4 »      | ULMUS asplenifolia? . . . . .          | 2 »         | in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen.    |      |

## SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein-, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Anzahl werden die Preise verhältnißmäßig erhöht.

|   | p. 100 | p. 12. |   | p. 100. | p. 12. |
|---|--------|--------|---|---------|--------|
| ACER platanoides (Lin.), d'un an. 1jâhrige . . . . .      |        | 2 »    | CERCIS siliquastrum (L.). Gainier, d'un an. Judasbaum,      |         |        |
| Pseudo-platanus (Linn.). Sycomore d'un an, se-            |        |        | jâhrige Sâmlinge . . . . .                                  | 5 »     |        |
| mis. Weisser Horn, jâhrige Sâmlinge . . . . .             | 3 »    |        | » » de 2 ans. 2jâhrige . . . . .                            | 10 »    |        |
| ÆSCULUS Hippocastanum (L.). Marronnier d'Inde, se-        |        |        | CLEMATIS integrifolia (Lin.) . . . . .                      |         | 3 »    |
| mis de 2 ans. 2jâhrige Sâmlinge . . . . .                 | 10 »   |        | viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues. Blanc          |         |        |
| AILANTHUS glandulosa (Desf.). Aylante glanduleux,         |        |        | Clematis . . . . .  |         | 3 »    |
| jeunes plants. Götterbaum, junge Pflanzen . . . .         | 10 »   |        | COLUTEA arborescens (L.). Baguenaudier. Blasenblume .       | 5 »     |        |
| AMORPHA fruticosa (Willd.). Faux indigo nain. Kleiner     |        |        | media (L.) . . . . .  | 6 »     |        |
| Unform . . . . .  |        | 2 50   | CORCHORUS japonica, fl pleno. Kerria jap. . . . .           | 10 »    |        |
| ANDROMEDA axillaris (Ait) . . . . .                       |        | 2 50   | CORNUS alba (L.). Cornouiller blanc. Weisser Hart-          |         |        |
| » longifolia . . . . .                                    |        | 4 »    | riegel. . . . .   |         | 1 50   |
| calyculata (Lin.) . . . . .                               |        | 3 »    | alternifolia (W.). Cornouiller à feuilles alternes.         |         |        |
| » angustifolia . . . . .                                  |        | 3 »    | Hartriegel mit wechselstehenden Blättern . . . . .          |         | 1 50   |
| rosmarinifolia . . . . .                                  |        | 3 »    | MASCULA (L.). Cornouiller mâle. Gemeiner Hart-              |         |        |
| stricta . . . . .   |        | 4 »    | riegel . . . . .  | 8 »     |        |
| » . . . . .   | 20 »   |        | sericea ? . . . . .   |         | 1 50   |
| ANONA triloba, semis d'un an . . . . .                    | 15 »   |        | CORYLUS. Noisetier à gros fruits mélangés. Großfrüchtige    |         |        |
| ARALIA japonica (Sieb.) . . . . .                         |        | 5 »    | Haselnüsse . . . . .  | 15 »    |        |
| spinosa (Lin.) . . . . .                                  |        | 4 »    | GRATÆGUS oxyacantha (L.). Epine blanche de 3 à 4 ans.       |         |        |
| AZALEA pontica, de 3 ans. 3jâhrige . . . . .              | 15 »   |        | 3 und 4jâhrige Weißdorn . . . . .                           | 2 »     |        |
| viscosa, de 3 ans. 3jâhrige . . . . .                     | 12 »   |        | CUPRESSUS disticha, de 3 ans . . . . .                      |         | 6 »    |
| BERBERIS vulgaris (L.). Épine-vinette. Berberitzenstrauch | 2 »    |        | Id. de 2 ans. 2jâhrige . . . . .                            | 10 »    |        |
| BETULA alba (Lin.). Bouleau. Birke . . . . .              | 2 »    |        | sempervirens. . . . .                                       |         | 3 »    |
| alnus (L.). Aulne. Erle, Schwarzerle . . . . .            | 1 50   |        | CYTISUS biflorus (L.). Cytise biflore. Zweiblumiger Bohnen- |         |        |
| » incana (L.). Aulne blanchâtre. Weißerle . . . .         | 2 »    |        | baum . . . . .  | 6 »     |        |
| lenta (Willd.) . . . . .                                  |        | 2 »    | hirsutus (L.). Cytise velue. Behaarter Bohnen-              |         |        |
| BIGNONIA randicans (L.). Jasmin de Virginie. Virginischer |        |        | baum . . . . .  | 6 »     |        |
| Jasmin . . . . .  | 15 »   |        | Laburnum (L.). Faux ébenier, d'un an. Gemei-                |         |        |
| CALYCANTHUS. Calycanthe mélangé, Pompadour. Keld-         |        |        | ner Bohnenbaum, jâhrige . . . . .                           | 5 »     |        |
| blume, Gewürzbaum, gemischt . . . . .                     | 15 »   |        | Id. replanté. 2jâhrige verfeßte . . . . .                   | 10 »    |        |
| CARPINUS betulus (L.). Charmille. Hainbuche . . . .       | 2 »    |        | sessilifolius, forts. Stark . . . . .                       | 10 »    |        |
| CEANOTHUS Americanus (Linn.). Céanothe d'Amérique.        |        |        | DAPHNE Mezereum (Willd.). Bois gentil de 2 ans, re-         |         |        |
| Sâctelblume . . . . .                                     | 4 »    |        | planté. 2jâhrige verfeßte . . . . .                         | 10 »    |        |
| CELTIS australis (L.). Micocoulier de Provence. . . .     |        | 4 »    | EVONYMUS Europæus (L.). Fasain. Spindelbaum . . . .         | 2 »     |        |



|  | p. 100.  | p. 12.  |
|--|----------|---------|
| FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Ächte Kastanie, jährige Pflanzen | 4 »      |         |
| le mille. Das Tausend.   | 35 »     |         |
| replants de 2 ans. 2jährige Pflanzen   | 4 50     |         |
| sylvatica (L.). Hêtre commun, Foyard. Weißbuche  | 2 »      |         |
| FRAXINUS excelsior (L.). Frêne. Esche  | 2 »      |         |
| ornus florifera (Willd.), d'un an. Jährige   | 15 »     |         |
| GENISTA germanica (L.). Genêt d'Allemagne. Deutscher Ginster   | 4 »      |         |
| tinctoria (L.)   |          | 2 »     |
| GLEDITSIA triacanthos (Willd.). Févier tryacanthé, d'un an. Jährige                                  | 4 »      |         |
| GLYCINE chinensis  |          | 6 »     |
| frutescens (L.)  |          | 6 »     |
| GUILANDINA dioica (L.). Chigon. Canadischer Götterbaum.  |          | 4 »     |
| HEDERA hybernica   | 20 »     | 3 »     |
| quinquefolia (Linn.). Vigne vierge. Virginischer Efeu  | 10 »     |         |
| HIBISCUS syriacus (L.). Ketmie des jardins, mélange. Syrischer Flieder, Rummel                       | 20 »     |         |
| HIPPOPHAE argentea. Argousier argenté. Weißer Sanddorn   |          | 3 »     |
| rhamnoides (L.). Argousier. Gemeiner Sanddorn  | 3 »      |         |
| HYDRANGEA arborescens (Linn.). Hortensia en arbre. Baumartige Hortensia                              |          | 3 »     |
| hortensis (Willd.). Hortensia des jardins. Schönblühende Hortensia                                   |          | 6 »     |
| ILEX aquifolium, mélange. Rummel   |          | 9 »     |
| JASMINUM fruticans (L.). Jasmin cytise. Strauchartiger Jasmin  | 15 »     |         |
| humile (L.). Jasmin nain. Niedere Jasmin   |          | 3 »     |
| officinalis  |          | 3 »     |
| JUGLANS alba   |          | 3 »     |
| fraxinifolia (Willd.). Noyer à feuilles de frêne. Eschenblättriger Nussbaum                          |          | 3 »     |
| Regia, d'un an. Jährige  | 10 »     |         |
| tomentosa, d'un an. Jährige  |          | 3 »     |
| JUNIPERUS virginiana (Lin.). Genévrier de Virginie. Virginischer Wachholder De 2 ans. 2jährige       | 20 »     |         |
| Plus forts, élevés en pots. Stärkere in Töpfen erzogen.  | 50 »     |         |
| KALMIA angustifolia  | 20 »     |         |
| des sujets plus forts. Stärkere Exemplare  |          | 9 »     |
| glauca, de 2 ans. 2jährige   | 25 »     |         |
| latifolia  | 75 »     |         |
| en boutons   | 150 »    |         |
| KOELREUTERIA paniculata  |          | 6 »     |
| LIGUSTRUM vulgare (L.). Fraisillon, Paine blanche  | 2 »      |         |
| LIRIODENDRON Tulipifera. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge   | 30 »     |         |
| LONICERA coccinea  |          | 5 »     |
| leucocarpa (Hort.), Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche   | 12 »     |         |
| symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge  |          | 4 »     |
| pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées  | 12 »     |         |
| MAGNOLIA glauca, de 4 ans. 4jährige  |          | 9 »     |
| purpurea et discolor   |          | 10 »    |
| MAHONIA. Berberis. Mahonia mélangé. Rummel   | 10 »     |         |
| aquifolium   | 6 »      |         |
| repens   | 6 »      |         |
| MENZIESIA polyfolia  |          | 2 »     |
| MESPILUS pyracantha (Willd.). Buisson ardent. Feuerbusch. D'un an, jährige                           | 6 »      |         |
| De 2 ans, repiqués. 2jährige versehte  | 15 »     |         |
| <b>MORUS ALBA (Lin.).</b>  |          |         |
| Mûrier blanc pour la culture des vers à soie. Weiße Maulbeere für Seidenzucht                        |          |         |
| Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge  | 1 50 à 3 |         |
| Le mille. Das Tausend.   | 15 à 25  |         |
| Moretti. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge   | 2 à 4    |         |
| Le mille. Das Tausend.   | 16 à 35  |         |
| elata. Semis de 3 ans. 2jährige Sämlinge   | 4 50     |         |
| papyrifera (Willd.). Mûrier à papier. Chinesischer Papierbaum  |          | 3 »     |
| ONONIS fruticosa (Willd.), d'un an. Jährige Sämlinge   |          | 3 »     |
| PAULOWNIA imperialis, petits   |          | 4 »     |
| » plus forts.  |          | 12 à 30 |
| PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués. Gemeine Rothanne, 2jährige versehte                    | 2 »      |         |
| Le mille. Das Tausend.   | 18 »     |         |
| De 3 ans, repiqués. 3jährige versehte  | 3 »      |         |
| Le mille. Das Tausend.   | 25 »     |         |
| balsamea, replants de 3 ans  | 30 »     |         |
| laricio (Willd.), d'un an, replants  | 5 »      |         |

|   | p. 100. | p. 12. |
|---|---------|--------|
| PINUS Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqué.   | 3 »     |        |
| Serphentanne, 2jährige versehte. Le mille Tausend   | 25 »    |        |
| strobis (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqué.   |         |        |
| Weymouth's Kiefer, 3jährige versehte  | 10 »    |        |
| sylvestris (L.). Pin Sylvestre, Pin d'Ecosse, replants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2jährige versehte | 2 »     |        |
| Le mille. Das Tausend.  | 18 »    |        |
| PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa. Pfeifenstrauch.  | 6 »     |        |
| » semi-plena. Syringa à fleurs semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch                         | 15 »    |        |
| grandiflorus (W.). Syringa à grandes fleurs. Großblumiger Pfeifenstrauch                          | 10 »    |        |
| inodorus (W.). Syringa sans odeur. Geruchloser Pfeifenstrauch                                     | 10 »    |        |
| speciosus   |         | 3 »    |
| PRUNUS Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-amandier. Milch-Lorbeer                                    |         | 3 »    |
| Mahaleb. Ste-Lucie  | 3 »     |        |
| PTELEA trifoliata (L.). Orme de Samarie. Dreiblättrige Lederblume.                                |         |        |
| Replants d'un an. Jährige Sehlänge  | 5 »     |        |
| » de 2 ans. 2jährige  | 8 »     |        |
| QUERCUS feruginea, plants d'un an. Jährige  |         | 3 »    |
| imbricaria  |         | 3 »    |
| MACROCARPA  |         | 5 »    |
| obtusiloba  |         | 4 »    |
| palustris   |         | 3 »    |
| Prinos discolor   |         | 4 »    |
| rubra   |         | 2 »    |
| Robur (Willd.). Chêne-rouvre, 3 ans. Eichen, 3jährige   | 2 »     |        |
| tinctoria. Quercitron, d'un an. Jährige   |         | 3 »    |
| RIBES aureum (Willd.)   |         | 2 »    |
| palmatum (Willd.)   |         | 2 »    |
| purpureum   |         | 3 »    |
| RHUS typhina (L.). Sumac de Virginie. Virgin. Sumac   |         | 3 »    |
| <b>RHODODENDRON</b>   |         |        |
| Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jährige Sämlinge, zum veredeln            | 25 »    |        |
| Maximum. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge  | 15 »    |        |
| Semis de 4 ans. 4jährige Sämlinge   | 25 »    |        |
| Avec boutons. Mit Knospen   | 100 »   |        |
| Ponticum. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge   | 15 »    |        |
| Semis de 4 ans. 4jährige Sämlinge   | 25 »    |        |
| Avec boutons. Mit Knospen   | 100 »   |        |
| ROBINIA PSEUDO ACACIA (W.). Faux acacia. Aca-cienbaum.  |         |        |
| Replants de 2 ans. 2jährige Sehlänge  |         |        |
| » de 3 ans. 3jährige Sehlänge   | 2 à 3   |        |
| ROSIERS MÉLANGÉS. Rosen im Rummel   | 25 »    |        |
| Thée, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis. Assortirt und Wurzelacht        | 40 »    |        |
| RUBUS odoratus (L.). Ronce odorante. Wohlriechender Himbeerstrauch                                | 15 »    |        |
| SALIX canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden, die besten Sorten Sehlänge               | 1 50    |        |
| caprea (L.). Saule marceau, replants. Pflanzen  | 2 »     |        |
| SAMBUCUS racemosus (L.). Sureau à grappes. Berghollunder  | 8 »     |        |
| SPARTIUM junceum (Willd.). Genêt d'Espagne, d'un an   |         |        |
| Spanischer Ginster, jähriger  | 5 »     |        |
| SPIRÆA acutifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige  |         | 2 »    |
| alpina  |         | 2 »    |
| aquilegifolia   |         | 2 »    |
| cana  |         | 2 »    |
| canadensis, de 2 ans. 2jährige  |         | 2 »    |
| crenata (Lin.), de 3 ans. 3jährige  |         | 2 »    |
| opulifolia (Linn.)  |         | 2 »    |
| salicifolia (Linn.)   |         | 2 »    |
| taurica   |         | 2 »    |
| ulmifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige  |         | 2 »    |
| mélange. Rummel   |         | 2 »    |
| STAPHYLEA trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ternées. Virginische Pimpernuß               | 10 »    |        |
| SYRINGA chinensis (Willd.). Lilas varin. Chinesischer Flieder                                     | 10 »    |        |
| persica (Willd.). Lilas de Perse. Persischer Flieder  | 15 »    |        |
| vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weißer Flieder                            | 10 »    |        |
| vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rother Flieder                             | 10 »    |        |
| TAMARIX gallica   | 20 »    |        |
| germanica (Willd.). Tamarisc d'Allemagne. Deutscher Tamariscenstrauch                             | 3 »     |        |







| <i>La pièce. Das Stück.</i>                    | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>       | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>         | <i>fr. c.</i> |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| ROSA DAMASCENA Grand Pape, r violet            | 1 50          | ROSA HYBRIDE Billard . . . . .    | 1 50          | † ROSA HYBRIDE Reine des Belges . . | 1 50 à 3 f.   |
| Hardy . . . . .                                | 1 50          | Bizarre de la Chine . . . . .     | 2 »           | † Riego . . . . .                   | 2 à 3 »       |
| Henriette Boulogne . . . . .                   | 1 50          | bonne Geneviève . . . . .         | 1 50          | Roi des hybrides, rose carnée . .   | 2 »           |
| Importante . . . . .                           | » 50          | bonne Louise . . . . .            | 1 50          | Roi Guillaume . . . . .             | 1 50          |
| Jeane d'Albret, rose foncé . . .               | 1 50          | boule de Nanteuil . . . . .       | 1 50          | Rose de l'âge . . . . .             | 1 50          |
| Joséphine-Antoinette . . . . .                 | 1 50          | boule de neige . . . . .          | 1 50          | † Santeur . . . . .                 | 1 à 2 »       |
| Julie Dupont . . . . .                         | 1 50          | Camailleux . . . . .              | 1 50          | Sophie Marcelli, carnée . . . .     | 1 »           |
| † Lady Seymour . . . . .                       | 1 à 3 »       | Camuset, grande fleur rose . .    | 1 50          | Ténébreuse . . . . .                | 1 50          |
| La mienne, carminé foncé . . .                 | 1 »           | Caroline Aurore . . . . .         | 1 50          | Tigridia . . . . .                  | 1 50          |
| Latone, rose . . . . .                         | 1 »           | Caulincourt . . . . .             | 1 50          | Toilette des roses . . . . .        | 1 »           |
| lilacino variegata . . . . .                   | 1 50          | Champion . . . . .                | 1 50          | Triomphe de Laffay, rose . . .      | 1 50          |
| Louis Cholipsa . . . . .                       | 1 50          | Charles-Louis Cabrerias . . . .   | 1 50          | de Zeller . . . . .                 | 1 50          |
| Madame Feburier . . . . .                      | 2 »           | Charles Raybaut, hyb noisette .   | 1 50          | Valmy . . . . .                     | 1 50          |
| Madame de Tressan, rose tendre                 | 1 »           | Charlotte de Charmes . . . . .    | 1 50          | Victor Hugo, blanche . . . . .      | 1 50          |
| Marchal du Palais, remont . . .                | 2 »           | Chastellux . . . . .              | 2 »           | Victor Tracy . . . . .              | 1 50          |
| Mardenius, remont . . . . .                    | 2 »           | Cheron . . . . .                  | 2 »           | Virginie Zeller . . . . .           | 1 50          |
| Marguerite de Valois, pourprée.                | 1 »           | Clande de Cressac, rose . . . .   | 1 50          | Zeller . . . . .                    | 1 50          |
| monstrueux, rose . . . . .                     | 2 »           | Comte Colbert . . . . .           | 2 »           | * INDICA tomentosa . . . . .        | 1 »           |
| Moyses, cramoisie violet . . . .               | 1 50          | Taverne, rose . . . . .           | 1 50          | * LAWRENCEANA. Gloire des La-       |               |
| nouvelle Justine . . . . .                     | 1 »           | Comtesse Almaviva . . . . .       | 1 50          | wrence . . . . .                    | 1 »           |
| † Palmyre, rose tendre . . . . .               | 1 50 à 3 f.   | de Roques . . . . .               | 1 50          | * alba . . . . .                    | 1 »           |
| Paul-Joseph, perpétuelle . . . .               | 1 50          | † Lacépède, rose lilas . . . . .  | 1 50 à 2 f.   | * bicolor . . . . .                 | 1 »           |
| † perpétuelle, Philippe I <sup>er</sup> , car- |               | Colbert . . . . .                 | 2 »           | * mouche . . . . .                  | 1 »           |
| miné violet . . . . .                          | 1 50          | Courtine . . . . .                | 2 »           | * multiflora . . . . .              | 1 »           |
| perpétuelle de Trianon . . . . .               | 1 50          | Corvisart . . . . .               | 2 »           | * MYCROPHYLLA alba plena . . .      | 1 50          |
| Pyrolle . . . . .                              | 2 »           | Coutard . . . . .                 | 1 50          | * Hardy . . . . .                   | 2 »           |
| Reine des perpétuelles . . . . .               | 1 50          | Couronne du président . . . . .   | 1 50          | * rosea plena . . . . .             | 1 50          |
| † Rose du roi, carminée . . . . .              | 1 à 3 »       | † Daubenton . . . . .             | 1 à 2 »       | * Victoire modeste . . . . .        | 1 50          |
| panachée . . . . .                             | 2 »           | Deuil du maréchal Mortier . . .   | 1 50          | * MULTIFLORA Achille . . . . .      | 2 »           |
| Soyeuse . . . . .                              | 1 50          | Duc de Choiseul . . . . .         | 2 »           | * gracilis . . . . .                | 1 25          |
| † Theclat . . . . .                            | 1 50 à 2 f.   | Duroc, hyb . . . . .              | 2 »           | * Laure Davoust, nouvelle multi-    |               |
| Tendresse admirable, carnée . .                | 1 50          | Elisabeth Guizot . . . . .        | 1 50          | flora . . . . .                     | 1 50          |
| Warwick . . . . .                              | 2 »           | fleurs blanches (à) . . . . .     | 1 à 2 »       | * rouge vif . . . . .               | 1 50          |
| York et Lancastre, rose . . . . .              | 1 50          | † Fœdora . . . . .                | 1 50 à 3 f.   | † MUSCOSA fl. albo plena, R. mous-  |               |
| EGLANTIERA bicolor . . . . .                   | 1 25          | Fontenelle, ponctuée . . . . .    | 1 50          | seuse blanche . . . . .             | 1 à 2 »       |
| luteo pleno . . . . .                          | 1 »           | † Forlard . . . . .               | 2 à 4 »       | Angélique Questier, carnée . . 4    | 1 50          |
| semplena bicolor . . . . .                     | 2 »           | Garnier-Pagès . . . . .           | 2 »           | fl. albo varieg. R. m. b., nou-     |               |
| GALLICA atropurpurea, Bizarre                  |               | Général Drouot . . . . .          | 1 50          | velle variété . . . . .             | 2 à 3 »       |
| triomphant . . . . .                           | 1 50          | † George III . . . . .            | 2 à 4 »       | Bedoyère, hyb. mousseux . . . .     | 2 »           |
| Carmin Amonreux . . . . .                      | 2 »           | Globe blanc . . . . .             | 1 50          | † Blushmoss. R. mouss. Nankin .     | 1 à 2 »       |
| Casimir Perrier, cramoisi violet.              | 1 50          | Gloire de France, rose violet vif | 1 50          | Cardinal Fesch . . . . .            | 2 »           |
| Etulbé . . . . .                               | 2 »           | Gondocini . . . . .               | 1 50          | coccinea . . . . .                  | 1 »           |
| faux Wellington, carminé pour-                 |               | hybride, Gloire des hybrides . .  | 1 50          | crispipetala . . . . .              | 2 »           |
| pré . . . . .                                  | 1 50          | Grande duchesse . . . . .         | 1 »           | ferrugineuse, rose foncé . . . .    | 1 50          |
| flora magna pleno . . . . .                    | 1 50          | Grandeur (la) . . . . .           | 1 50          | feuilles de sauge (à), carnée . .   | 1 50          |
| grande renoncule, pourpre foncé                | 1 50          | Hennequin, rose . . . . .         | 1 50          | flagipetala . . . . .               | 2 »           |
| joyeuse . . . . .                              | 1 50          | Horaces, pourprée . . . . .       | 1 50          | Flèche (de la). R. m. anémone       |               |
| Montgolfier, rose pourpre . . . .              | 1 »           | † illustre beauté . . . . .       | 1 50 à 2 f.   | flora . . . . .                     | 1 50          |
| nigrorum, foncée . . . . .                     | 1 50 à 2 f.   | Islande fontaine, pourpre foncé.  | 1 50          | Laseel . . . . .                    | 1 50          |
| petit roi de Rome . . . . .                    | 1 50          | Jongleur . . . . .                | 1 50          | miniature . . . . .                 | 1 50          |
| pourpre strié . . . . .                        | 1 50          | † Juillet (le 29) . . . . .       | 1 50 à 2 f.   | minor. R. mousseuse pompon,         |               |
| Reine de Masulipatam . . . . .                 | 1 50          | Laffay . . . . .                  | 1 50          | rose foncé . . . . .                | 1 50          |
| Requien . . . . .                              | 2 »           | Lafontaine . . . . .              | 1 50          | nivea . . . . .                     | 1 50          |
| tendre chiffonnée . . . . .                    | 1 50          | Lascases . . . . .                | 1 50          | proliféré, rose carminé . . . . .   | 1 »           |
| tricolor. Mexicaine pourpre . . .              | 1 50          | † Lasthenie, rose lilas . . . . . | 1 50 à 3 f.   | pyracantha . . . . .                | 2 »           |
| velours épiscopal . . . . .                    | 1 50          | Lavallière . . . . .              | 1 50          | remontante, muscosa menstrualis     |               |
| versicolor, très-pleine, pourpre               |               | Léda . . . . .                    | 1 50          | m. perpétuelle. Monatmosose.        | 1 »           |
| rayé de rouge et blanc . . . . .               | 1 50          | Lisbeth . . . . .                 | 1 50 à 2 f.   | Rosinella . . . . .                 | 2 »           |
| Waratah . . . . .                              | 2 »           | Ma Clochette . . . . .            | 1 50          | rubro pleno . . . . .               | 1 50          |
| HUDSONICA plena . . . . .                      | 2 »           | Mably, velouté pourpre . . . . .  | 1 50          | simplex, mousseuse simple, rose     | 1 »           |
| HYBRIDE Ada . . . . .                          | 1 50          | Magnanime . . . . .               | 1 50 à 3 f.   | splendens . . . . .                 | 2 »           |
| Adhire, carnée . . . . .                       | 1 50          | Majestueuse . . . . .             | 1 »           | unique . . . . .                    | 1 50          |
| Aimable Aline . . . . .                        | 2 »           | Malesherbes . . . . .             | 1 50          | variegata plena, mousseuse pana-    |               |
| † Adolphe Cachet . . . . .                     | 1 50 à 2 f.   | † Malton, pourpre . . . . .       | 2 »           | chée . . . . .                      | 1 50          |
| Amélie Guérin . . . . .                        | 1 50          | Manteau de l'évêque . . . . .     | 1 50          | velours pourpre . . . . .           | 3 »           |
| Ancelin, cerise tendre . . . . .               | 2 »           | Marchèse . . . . .                | 2 »           | Villard . . . . .                   | 1 50          |
| † Archevêque de Besançon . . . .               | 1 50          | Marie-Thérèse . . . . .           | 1 50          | Zoé-partout, rose carminée . . .    | 1 50          |
| Assemblage de beauté . . . . .                 | 1 à 2 »       | Meradi . . . . .                  | 1 50          | * NOISETIANA (Bon Jard). Belle      |               |
| Astrolabe . . . . .                            | 1 50          | Mohileda . . . . .                | 1 50          | Noisette . . . . .                  | 2 »           |
| Aurélia Lamarque . . . . .                     | 1 50          | Moscowa . . . . .                 | 1 50          | * Aimé Vibert, blanche . . . . .    | 1 50          |
| Baumann . . . . .                              | 1 50          | Nadisca . . . . .                 | 1 50          | * Asterode . . . . .                | 1 50          |
| beauté incomparable . . . . .                  | 1 50          | Nora . . . . .                    | 1 50          | * Blandina . . . . .                | 1 50          |
| Belle Adelaïde . . . . .                       | 1 50          | nuages des tempêtes, foncée . .   | 1 50          | * Bobelina, pourpre foncé . . . .   | 1 50          |
| Christine, rose pâle . . . . .                 | 2 »           | odeur d'Anisette . . . . .        | 1 50          | * Borlotte, pourpre foncé . . . .   | 1 50          |
| Faber . . . . .                                | 1 »           | OEillet des charmes . . . . .     | 2 »           | * Bousson, jaune nouvelle . . . .   | 1 50          |
| Géorgienne . . . . .                           | 1 50          | Pacha d'Egypte . . . . .          | 1 »           | * Chantas . . . . .                 | 1 50          |
| Hermine double . . . . .                       | 1 50          | † Paul Feras . . . . .            | 2 à 3 »       | * Chevrances, blanche . . . . .     | 1 50          |
| Judith, carnée panachée . . . . .              | 1 50          | pétales frangés (à) . . . . .     | 1 50          | * CHROMOTELLA . . . . .             | 2 »           |
| Pauline . . . . .                              | 1 50          | Petit Pierre . . . . .            | 1 à 2 »       | * Clara Van Dael . . . . .          | 1 »           |
| de Sègue . . . . .                             | 1 50          | Pinks, pourprée . . . . .         | 1 50          | * Coronis . . . . .                 | 1 »           |
| de Stoars . . . . .                            | 1 50          | Pompon des dames . . . . .        | 2 »           | * Coulogne . . . . .                | 1 50          |
| Thurette, rose vif . . . . .                   | 1 50          | † Prince Albert, pourpre . . . .  | 2 à 3 »       | * Desprès, rose tendre jaunâtre .   | 1 50          |
| Bérénice . . . . .                             | 2 »           | Princesse Marie . . . . .         | 2 »           | * Donna Maria . . . . .             | 1 50          |
| Bertholdi, rose vif . . . . .                  | 1 50          | † Proserpine, pourpre violet . .  | 2 à 3 »       | * Duc de Broglie . . . . .          | 1 50          |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>           | fr. c.      | <i>La pièce. Das Stück.</i>                                 | fr. c. | <i>La pièce. Das Stück.</i>                     | fr. c. |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|---|--------|
| * ROSA NOISETIANA Dufrenoy, blanc     |             | ROSA PIMPINELLIFOLIA Victoire . .                           | 1 50   | les plus grands froids, fleurs                  |        |
| carné . . . . .                       | 1 50        | PORTLANDICA Thiers . . . . .                                | 1 50   | superbes . . . . .                              | 2 »    |
| * Euphrasine . . . . .                | 1 50        | PROVINCIALIS Amphitruon . . .                               | 1 50   | * ROSA SEMPERVIRENS, Adelaïde                   |        |
| * † Foulard, rose panachée . .        | 1 50 à 3 f  | Belle Vergnier, cramoisi violet .                           | 1 50   | d'Orléans . . . . .                             | 1 50   |
| * Gloire de Gand . . . . .            | 1 »         | Beniowski . . . . .   | 1 50   | * Eugénie d'Orléans . . . . .                   | 1 50   |
| * grande fleur pourpre . . . .        | 1 »         | Calypso, rose carnée . . . . .                              | 3 »    | * Léopoldine d'Orléans . . . .                  | 1 50   |
| * Hermite . . . . .                   | 1 50        | De Launay . . . . .   | 1 50   | * Princesse Louise, blanche . .                 | 1 50   |
| * Koenig, carminé vif . . . . .       | 1 50        | éclatante . . . . .   | 2 »    | * Princesse Marie, pourpre velouté              | 1 50   |
| Isaure Clémence, jaunâtre . .         | 1 50        | Emma, carminée . . . . .                                    | 1 50   | spectabilis . . . . .                           | 1 50   |
| * Lamarque . . . . .                  | 1 50        | Fanny Bias, rose carnée . . . .                             | 1 50   | SULPHURA flore pleno, rose à fleurs             |        |
| * Longuevine, rose . . . . .          | 1 50        | Général Foy . . . . .                                       | 1 50   | jaunes doubles . . . . .                        |        |
| * † Lee, rose tendre . . . . .        | 1 50 à 3 f. | Général Thiers; pourpre velouté                             |        | TRIFOLIATA semiplena . . . . .                  | 1 50   |
| * Madame Jouvain . . . . .            | 1 »         | foncé . . . . .   | 2 50   | VILLOSA, Psychée, carnée . . . .                | 1 50   |
| * Nymphé (la), pâle . . . . .         | 1 50        | Lodoiska marin, pourpre velouté                             |        | Léda . . . . .                                  | 2 »    |
| * Parmi, violet clair . . . . .       | 1 50        | Lady Morgant, rose pourpre . .                              | 1 50   | <i>Une collection de 100 espèces de rosiers</i> |        |
| * Printemps, blanche . . . . .        | 1 50        | Lord Byron . . . . .  | 1 »    | <i>basses tiges, assorties avec noms, à</i>     |        |
| * Smithi, jaune . . . . .             | 1 50        | Marius . . . . .  | 1 50   | <i>notre choix. Eine Sammlung von 100</i>       |        |
| * SOLFATORE . . . . .                 | 2 »         | Mlle de Drenx-Brézé . . . . .                               | 1 50   | <i>Sorten niederstämmiger Rosen mit Na-</i>     |        |
| * speciosa . . . . .                  | 1 50        | minor . . . . .   | 1 »    | <i>men, nach unserer Wahl. . . . .</i>          | 75 »   |
| * Thargilie, pourpre violet . .       | 2 »         | miroir des Dames, blanc rosé . .                            | 1 50   | <i>Les 25 espèces au choix des amateurs.</i>    |        |
| * Triomphe des noisettes, rose        | 1 50        | Ninon de l'Enclos, rose pourpre .                           | 1 50   | <i>25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber.</i>   | 25 »   |
| carnée violette . . . . .             | 1 50        | Ornement de carafe, rose . . .                              | 1 50   | <i>Idem, 100 espèces au choix des ama-</i>      |        |
| * violette . . . . .                  | 1 50        | Ponceau Capiomont . . . . .                                 | 1 50   | <i>teurs 100 Sorten nach der Wahl der</i>       |        |
| PIMPINELLIFOLIA, belle inconnue .     | 1 50        | Prouville, carminée . . . . .                               | 1 50   | <i>Liebhaber . . . . .</i>                      | 130 »  |
| inconnue, carnée . . . . .            | 2 »         | rien ne me surpasse, pourpre . .                            | 1 »    | <i>Idem, la collection de 30 rosiers hautes</i> |        |
| † Percott . . . . .                   |             | Salomon, rose . . . . .                                     | 2 »    | <i>tiges, bien élevés, en 30 espèces as-</i>    |        |
| Reine des Pimpernelles, rose carnée . | 1 50        | RUBIGINOSA, l'enfant Jésus, rose                            |        | <i>sorties, avec noms. Die Sammlung von</i>     |        |
| Schott, perpétuelle carnée . . .      | 1 »         | carnée . . . . .  | 1 50   | <i>30 Hochstämmigen schön gezogenen Rosen</i>   |        |
| Stanvel, blanche double . . . .       | 1 50        | Hessoise, pourpre double . . . .                            | 1 »    | <i>in 30 Sorten, mit Namen. . . . .</i>         | 55 »   |
| Sulphureo pleno, nova . . . . .       | 2 »         | Voltaire . . . . .  | 1 »    | <i>Idem, 100 rosiers nains mélangés. 100</i>    |        |
|                                       |             | RUBRIFOLIA. BEAUTY OF THE PRAIRIES. Pour palliser, supporte |        | <i>niedere Rosen, im Nummet . . . . .</i>       | 25 »   |

### PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Perennirende freie Landpflanzen.

| <i>La pièce. Das Stück.</i>          | fr. c. | <i>La pièce. Das Stück.</i>                   | fr. c. | <i>La pièce. Das Stück.</i>               | fr. c. |
|--------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|
| * ACHILLEA millefolium fl. roseo . . | » 50   | ANTIRRHINUM majus luteum . . . .              | 1 »    | ASTER spectabilis (Lin.) . . . . .        | 1 »    |
| mongolica (Fisch.) . . . . .         | 1 »    | magnet . . . . .                              | 1 »    | ASTRAGALUS canadensis . . . . .           | 1 »    |
| speciosa pleno . . . . .             | » 50   | pictum . . . . .                              | 1 »    | ASTRANTIA Carniolica (Jacq.) . . . .      |        |
| ACONITUM japonicum (Thunb.) . . .    | » 50   | splendens . . . . .                           | 1 50   | major (L.) . . . . .                      | 1 »    |
| Napellus (L.) . . . . .              | » 75   | * <i>superbum</i> . . . . .                   | 1 50   | * minor (L.) . . . . .                    | 1 »    |
| Neubergense (Rehb.) . . . . .        | » 50   | Tourli . . . . .                              | 1 50   | AUBRIETIA deltoidea (DC.) . . . . .       | » 50   |
| Sieboldii . . . . .                  | 1 »    | venustum . . . . .                            | 1 »    | BAPTISIA australis (R. B.). Podalyria     |        |
| volubile (Pall.) . . . . .           | » 75   | <i>Les trois variétés d'Antirrhinum majus</i> |        | (Vent.) . . . . .                         | » 50   |
| * ACORUS gramineus (Ait.) fol. var . | 1 »    | <i>marquées d'un * sont des nouveaux</i>      |        | violacea . . . . .                        | 1 »    |
| AGTÆA brachypetala (DC.) . . . .     | 1 50   | <i>gains, de premier rang.</i>                |        | albida . . . . .                          | » 50   |
| cimicifuga (Lin.) . . . . .          | 1 »    | APIOS tuberosa (Pursh.). <i>Glycine Apios</i> |        | BELLIS perennis (L.) fistucosa albo pleno | » 50   |
| ADONIS vernalis (L.) . . . . .       | » 50   | (L.) . . . . .                                | » 50   | alba plena . . . . .                      | » 50   |
| AGROSTEMMA coronaria flore pleno .   | 1 »    | AQUILEGIA canadensis . . . . .                | 1 »    | roseo pleno . . . . .                     | » 50   |
| * ALCHEMILLA Alpina (L.) . . . . .   | » 50   | hybrida . . . . .                             | 1 50   | fl. rub. pleno . . . . .                  | » 50   |
| ALYSSUM saxatile (L.) . . . . .      | » 50   | Skinneri . . . . .                            | 3 »    | * BOCCONIA cordata (Willd.) . . . . .     | 1 »    |
| foliis alb. varieg. . . . .          | 1 »    | vulgaris flore pleno . . . . .                | » 50   | * frutescens (Lin.) . . . . .             | 1 50   |
| AMSONIA latifolia (Mich.) . . . . .  | » 75   | luteo pleno . . . . .                         | 1 50   | BULBOCODIUM verum (L.) . . . . .          | » 50   |
| salicifolia (R. B.) . . . . .        | » 50   | ARENARIA grandiflora (All.) . . . .           | » 50   | CACALIA albifrons (Linn. fils) . . . .    | » 50   |
| * ANDROSACE carnea (L.) . . . . .    | » 50   | ARISTOLOCHIA clematitis (L.) . . . .          | » 50   | suaveolens (L.) fol. var. . . . .         | 1 50   |
| * glacialis (Steud.) . . . . .       | 1 »    | ARMERIA dianthoides (Hornem.) . .             | 1 »    | CALLA palustris (Willd.) . . . . .        | 1 50   |
| * lactea (All.) . . . . .            | » 75   | maritima (Wld.). <i>Statice armeria</i>       |        | CALLIOPSIS Atkinsonia (Hook.) Core-       |        |
| * ANEMONE Alpina (L.) . . . . .      | » 50   | (L.) . . . . .                                | » 50   | opsis (Dougl.) . . . . .                  | 1 »    |
| var. lutescens . . . . .             | 2 »    | * ARNICA glacialis (Wulf.) . . . . .          | » 50   | CALTHA palustris fl pleno . . . . .       | 1 »    |
| coronaria (L.) . . . . .             | 1 »    | * montana (Lin.) . . . . .                    | » 50   | monstro-us. . . . .                       | 1 50   |
| hortensis (L.) . . . . .             | » 50   | ARUM Dracunculus (L.) . . . . .               | 1 »    | CAMPANULA barbata pleno . . . . .         | 1 »    |
| Hudsoniana (Richards) . . . . .      | 1 »    | Italicum (Link) . . . . .                     | 1 50   | Bocconi . . . . .                         | » 50   |
| * multifida (Poir.) . . . . .        | 1 50   | maculatum (L.) . . . . .                      | 1 »    | cenisia (Lin.) . . . . .                  | » 50   |
| * narcissiflora (L.) . . . . .       | » 50   | * ARUNDO Donax (L.) . . . . .                 | 2 »    | glomerata (Lin.) . . . . .                | » 50   |
| nemorosa (L.) fl. pleno . . . . .    | » 50   | * foliis albo variegatis . . . . .            | 2 50   | grandis (Fisch.) . . . . .                | 1 50   |
| flore rubescens . . . . .            | 1 »    | phragmitis foliis striatis . . . . .          | » 50   | lilifolia . . . . .                       | 1 »    |
| * Ohotensis (Fisch.) . . . . .       | 2 »    | * ASARUM canadense (L.) . . . . .             | 1 »    | persicifolia (L.) . . . . .               | » 50   |
| * pensylvanica (Lin.) . . . . .      | 1 50   | Europæum (L.) . . . . .                       | 1 »    | flore albo pleno . . . . .                | 1 »    |
| Pulsatilla (L.) . . . . .            | 1 »    | * japonicum . . . . .                         | 5 »    | cœruleo pleno . . . . .                   | 1 50   |
| rubescens nova . . . . .             | 4 »    | * virginicum (Lin.) . . . . .                 | 1 »    | rhomboidalis (L.) . . . . .               | 1 »    |
| sylvestris (L.) . . . . .            | » 50   | ASCLEPIAS incarnata (L.) . . . . .            | » 50   | * thyrsoidea (L.) . . . . .               | 1 »    |
| vernalis (L.) . . . . .              | 1 »    | purpurascens ? . . . . .                      | » 75   | Trachelium fl pleno . . . . .             | 1 »    |
| * virginiana (Lin.) . . . . .        | 1 »    | syriaca (Linn.) . . . . .                     | » 75   | urticaefolia . . . . .                    | 1 »    |
| vitifolia (Bachun) . . . . .         | » 50   | tuberosa . . . . .                            | 1 »    | CASSIA marylandica . . . . .              | » 50   |
| ANTHEMIS nobilis (L.) . . . . .      | » 50   | ASPHODEUS luteus (L.) . . . . .               | 1 »    | CENTAUREA montana (L.) . . . . .          | » 50   |
| ANTIRRHINUM majus (L.) . . . . .     | » 75   | ASTER alpinus (L.) . . . . .                  | 1 »    | CENTRANTHUS angustifolius (DC.). Va-      | » 50   |
| atrostriatum . . . . .               | 1 »    | bicolor (Dietr.) . . . . .                    | » 50   | leriana (L.) . . . . .                    | 1 »    |
| bicolor . . . . .                    | 1 »    | cordifolius (Linn.) . . . . .                 | 1 »    | ruber (DC.) . . . . .                     | » 50   |
| * elegans . . . . .                  | 1 50   | grandiflorus (Lin.) . . . . .                 | 1 »    | CERASTIUM tomentosum (Dec.) . . . .       | » 50   |
| var. caryophyll. . . . .             | » 75   | nova Angliæ (Lin.) . . . . .                  | » 50   | CHELONE barbata (Cavau.) . . . . .        | 1 50   |
| * Hortence . . . . .                 | 1 50   | flore rose . . . . .                          | » 50   | fl. albo . . . . .                        | 1 50   |
| lilacinum . . . . .                  | » 75   | pyrenæus (Desf.) . . . . .                    | 1 »    | * CHRYSANTHEMUM alpinum (Lin.) . .        | 1 »    |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>  | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>  | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>   | <i>fr. c.</i> |
|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
| CHRYSAETHENUM INDICUM dans<br>les plus nouvelles variétés. 12 va-<br>riétés assorties à notre choix . . .            | 9 »           | ERANTHIS hyemalis (Salisb.). Hellebo-<br>rus (L.) . . . . .                | » 50          | HYDROPHYLLUM canadense (Lin.) . .   | » 75          |
| CHRYSOSTEMMA tripteris (Less.). Core-<br>opsis (L.) . . . . .  | » 50          | ERIGERON speciosus (DC.). Stenactis<br>(Lindl.) . . . . .                  | » 50          | IBERIS sempervirens (L.) . . . . .  | 1 »           |
| CLEMATIS integrifolia (L.) . . . . .   | » 50          | purpureum (Ait.) . . . . .   | » 75          | IPOMEA Daurica, nouvelle et belle<br>plante grimpante pour garnir promp-<br>tement les treillis de toutes espèces . | 2 »           |
| recta (L.) . . . . .   | » 50          | ERYNGIUM amethystinum (Lin.) . . .   | 1 »           | IRIS biflora (L.) . . . . .   | » 50          |
| COLCHICUM alpinum (DC.) . . . . .  | 1 »           | yuccifolium . . . . .  | 3 »           | chinensis . . . . .   | 1 »           |
| autumnale (L.) . . . . .   | » 50          | ERINUS Alpinus (L.) . . . . .  | » 75          | Colvillii . . . . .   | 1 »           |
| fl. pleno . . . . .  | 1 »           | ERYSIMUM ochroleucum (Dec.) . . .  | 1 50          | cristata . . . . .  | 1 »           |
| CONVALLARIA fl. pleno. . . . .   | 1 »           | * ERYTHRONIUM Dens Canis (T.) . .  | 1 »           | florentina (L.) . . . . .   | 1 »           |
| foliis variegatis . . . . .  | 1 »           | * ESCHSCHOLZIA californica (Cham.) .                                       | » 50          | Germanica (K.) . . . . .  | » 50          |
| multiflora (L.) . . . . .  | » 50          | fl. pleno. . . . .   | 5 »           | graminea (L.) . . . . .   | » 50          |
| Polygonatum (L.) . . . . .   | » 50          | * crocea (Benth.) . . . . .  | » 50          | Hungarica . . . . .   | 1 »           |
| racemosa (Linn.) . . . . .   | 1 »           | FESTUCA glauca (Lam.) . . . . .  | » 50          | Monnieri . . . . .  | 1 »           |
| verticillata (L.) . . . . .  | » 50          | FRANCOA appendiculata (Juss.) . . .  | 1 »           | notha . . . . .   | » 75          |
| COREOPSIS verticillata (Lin.) . . . .  | 1 »           | FRITILLARIA. — Pour ce genre, voyez<br>le Catalogue des oignons de fleurs. |               | ochroleuca . . . . .  | 1 »           |
| CORONILLA vaginalis (L.) . . . . .   | » 50          | FUNKIA subcordata (Spr.). Hemerocal-<br>lis japonica (Th.) . . . . .       | 1 »           | plicata (Lam.) . . . . .  | » 50          |
| * CORYDALIS bulbosa (DC.) . . . . .  | » 50          | cucullata (Siebold.) . . . . .   | 1 »           | pseudo-acorus (L.) . . . . .  | » 50          |
| formosa (Pursh.). <i>Dilytera formosa</i><br>(DC.) . . . . .   | » 50          | lancifolia (Spr.) . . . . .  | 1 »           | pumila Adansi (L.) . . . . .  | 1 »           |
| fungosa (Vent.) <i>Adlumia cirrhosa</i><br>(Rafin.) . . . . .  | » 50          | foliis variegatis . . . . .  | 1 »           | cinerea . . . . .   | » 50          |
| Gebleri (Ledeb.) . . . . .   | » 75          | ovata (Spr.), H. cœrulea (Andr.) . .                                       | 1 »           | Ruthenica . . . . .   | 1 »           |
| * nobilis (Pers.) . . . . .  | 1 50          | undulata (Otto) . . . . .  | 1 »           | Sibirica fl. alba (Willd.) . . . . .  | » 50          |
| tuberosa . . . . .   | » 50          | fol. med. pict. . . . .  | 3 »           | squalens . . . . .  | » 50          |
| * CRUCIANELLA stylosa (Trin.) . . . .  | » 50          | GAILLARDIA aristata (Pursh.) . . . .                                       | 1 »           | Susiana . . . . .   | 2 »           |
| * CYCLAMEN Europæum (L.) . . . . .   | » 50          | lanceolata (Mich.) . . . . .   | 1 50          | stenogyna . . . . .   | » 50          |
| * flore albo. . . . .  | 1 50          | GALANTHUS nivalis (L.) . . . . .   | » 50          | triflora (Balb.) . . . . .  | 1 »           |
| * hederæfolium . . . . .   | 1 50          | flore pleno . . . . .  | 1 »           | Vangerthii . . . . .  | 1 »           |
| CYPRIPEDIUM Calceolus (Linn.) . . . .  | » 50          | GALEGA officinalis (L.) . . . . .  | » 50          | versicolor . . . . .  | 1 50          |
| * CZACKIA Liliastrium (Andrz.). Anthe-<br>ricum (L.) . . . . .   | 1 »           | orientalis (Lmk.) . . . . .  | » 50          | LATHYRUS latifolius . . . . .   | » 50          |
| DATISCA cannabina, mas. . . . .  | 1 »           | GENISTA sagittata (Lin.) . . . . .   | » 50          | tuberosus (L.) . . . . .  | » 50          |
| foem. . . . .  | 1 »           | * GENTIANA acaulis (L.) . . . . .  | » 50          | * LEPIDIUM alpinum (Lin.) . . . . .   | 1 »           |
| DELPHINIUM Barlowii (Sw.) . . . . .  | 2 »           | asclepiades (L.) . . . . .   | 1 »           | * rotundifolium all. . . . .  | 1 »           |
| chinense azureum . . . . .   | 1 »           | * bavarica (L.) . . . . .  | » 50          | LEUCOJUM vernum (L.) . . . . .  | 1 »           |
| elatum (All.) . . . . .  | 1 »           | cruciata (Linn.) . . . . .   | 1 »           | LIATRIS cylindrica . . . . .  | 2 »           |
| fl. plena . . . . .  | 2 »           | * lutea (L.) . . . . .   | 1 50          | gracilis . . . . .  | 2 »           |
| grandiflorum (DC.) . . . . .   | 3 »           | macrophylla (Pall.) . . . . .  | 3 »           | odoratissima? . . . . .   | 1 50          |
| pallidum . . . . .   | 1 »           | Pneumonanthe (Lin.) . . . . .  | 1 »           | pulchella . . . . .   | 3 »           |
| punicum . . . . .  | 2 »           | * punctata (L.) . . . . .  | 1 »           | pycnostachya (Mich.) . . . . .  | 2 »           |
| speciosum . . . . .  | 1 »           | * purpurea (L.) . . . . .  | 1 »           | scariosa (Willd.) . . . . .   | 2 »           |
| DENTARIA digitata (Lmk.) . . . . .   | » 50          | GERANIUM phœum (L.) . . . . .  | 1 »           | spicata (Willd.) . . . . .  | 1 »           |
| pinnata (Lmk.) . . . . .   | » 50          | pratense fl. pleno . . . . .   | 1 »           | LILIUM bulbiferum (L.) . . . . .  | » 50          |
| polyphylla (W.) . . . . .  | 1 50          | sanguineum (L.) . . . . .  | 1 »           | Canadense (L.) . . . . .  | 2 »           |
| DIANTHUS atropurpureus? . . . . .  | » 50          | * GEUM chiloense (Balb.) . . . . .   | 1 »           | candidum (L.) . . . . .   | » 50          |
| barbatus fl. roseo pleno. . . . .  | 1 »           | GILLENIA, trifoliata (DC.) . . . . .                                       | 1 »           | flore plena . . . . .   | 1 50          |
| caryophyllus var <i>OEillets flamands</i><br>à feuilles entières. Ganzblättrige<br>Flamänder Nelken 12 pièces. . . . | 10 »          | GLADIOLUS. — Pour ce genre, voyez<br>le Catalogue des oignons de fleurs.   |               | foliis variegatis . . . . .   | 1 50          |
| Gæthalsii . . . . .  | 2 »           | * GLOBULARIA cordifolia (L.) . . . .                                       | 1 »           | croceum (Chaix.) . . . . .  | » 75          |
| moschatus fl. pleno. <i>OEillet mignar-</i><br><i>dise double, 12 pl.</i> . . . . .                                  | 3 »           | * nudicaulis (L.) . . . . .  | » 75          | lancifolium punctatum . . . . .   | 5 à 20 »      |
| Beauty of Cheltenham. . . . .  | 1 50          | * GNAPHALIUM dioicum (L.) . . . . .  | » 50          | longiflorum (Thunb.) . . . . .  | 2 »           |
| Colonel Bahler . . . . .   | 1 »           | * margaritaceum (L.) . . . . .   | » 50          | Martagon (L.) . . . . .   | » 50          |
| double Sweet. . . . .  | 1 »           | GYPHOPHIA paniculata (Lin.) . . . .  | » 50          | monadelphum (Bieb.) . . . . .   | 1 50          |
| Lady Bruce . . . . .   | 1 50          | HACQUETIA Epipactis (DC.). Astrantia<br>(L. F.). Donda (Spr.) . . . . .    | 1 »           | philadelphicum (Linn.) . . . . .  | 3 »           |
| Maiden whist. . . . .  | 1 »           | HELIANTHUS multiflorus flore pleno .                                       | » 50          | pomponium (L.) . . . . .  | 1 »           |
| splendensissimus, fl. pl. . . . .  | 1 50          | orgyalis (Dec.) . . . . .  | 1 50          | superbum . . . . .  | 1 »           |
| DIPTAMNUS Fraxinella (Pers.) . . . .   | » 50          | HELLEBORUS niger (L.) . . . . .  | » 50          | tigrinum (Ker.) . . . . .   | 1 »           |
| DIGITALIS eriostachya (Fish.) . . . .  | 1 »           | purpurascens (Will.) . . . . .   | 1 »           | umbellatum . . . . .  | 3 »           |
| grandiflora (Link.) . . . . .  | » 50          | viridis (L.) . . . . .   | » 50          | venustum . . . . .  | 3 »           |
| purpurea (L.) . . . . .  | » 50          | HELIANTHEMUM aurantiacum pleno. .  | 1 »           | * LINARIA alpina (Desf.) . . . . .  | 1 »           |
| DISPORUM fulvum (Sal.) Uvularia chi-<br>nensis (B. M.) . . . . .   | » 50          | albo pleno . . . . .   | 1 »           | LINUM perenne (L.) . . . . .  | » 50          |
| * DODECATHEON Media (L.) . . . . .   | 1 »           | bicolor . . . . .  | 1 »           | * LOBELIA cardinalis . . . . .  | 1 »           |
| elegans . . . . .  | 2 »           | pleno . . . . .  | 1 »           | eximia . . . . .  | 1 »           |
| * giganteum (Hort.) . . . . .  | 2 »           | grandiflorum . . . . .   | 1 »           | formosa . . . . .   | » 50          |
| DORONICUM Caucasicum (Brst.) . . . .   | 1 »           | pulverulentum . . . . .  | 1 »           | fulgens (Willd.) . . . . .  | 1 »           |
| * DRABA azoides (C.) . . . . .   | 1 »           | mutabile (Pers.) . . . . .   | 1 »           | grandis . . . . .   | 1 »           |
| DRACOCEPHALUM lusitanicum? . . . .   | » 50          | fl. roseo pleno . . . . .  | 1 »           | longiflora . . . . .  | 1 50          |
| virginianum (L.) . . . . .   | » 50          | fl. cupreo pleno . . . . .   | 1 »           | multiflora . . . . .  | » 75          |
| speciosum (Sweet) . . . . .  | 1 »           | HELONIAS bullata (Lin.) . . . . .  | 3 »           | purpurea . . . . .  | 1 50          |
| * DRYAS Drummondii (Richards) . . .  | 2 50          | HEMEROCALIS flava (L.) . . . . .   | » 50          | pyramidalis . . . . .   | 1 »           |
| octopetala (L.) . . . . .  | 1 »           | fulva (L.) . . . . .   | » 50          | Queen Victoria . . . . .  | 1 »           |
| ELYMUS arenarius (Linn.) . . . . .   | » 50          | fl. pleno . . . . .  | 1 »           | Richardsoni . . . . .   | 1 »           |
| EPILOPIUM rosmarinifolium (Hœnk.) .  | 1 »           | foliis variegatis . . . . .  | 1 50          | Salteri . . . . .   | 1 »           |
| EPIPACTIS ensetifolia (Sw.) . . . . .  | » 50          | HEPATICA tribola (Chaix.). Anemone<br>hepatica (L.) . . . . .              | » 50          | Tuba coccinea . . . . .   | 1 »           |
| EPIMEDIUM Alpinum (L.) . . . . .   | 1 »           | fl. cœruleo pleno . . . . .  | 1 »           | Vulcain . . . . .   | » 50          |
| bifolium (Siebold) . . . . .   | 1 »           | rubro pleno . . . . .  | 1 »           | LUPINUS grandiflorus (Hortul.) . . .  | » 50          |
| grandiflorum (Siebold) . . . . .   | » 50          | HESPERIS matronalis purp. pleno . .  | » 50          | Milleri (B. M.) . . . . .   | 1 »           |
| Musschianum . . . . .  | 1 »           | HIBISCUS militaris (L.) . . . . .  | 1 »           | perennis (DC.) . . . . .  | 1 50          |
| violaceum (M. et Dne.) . . . . .   | 1 »           | palustris (L.) . . . . .   | 1 »           | polyphyllus (B. R.) . . . . .   | » 50          |
|  |               | HIERACIUM aurantiacum (L.) . . . . .                                       | » 50          | flore albo . . . . .  | 1 50          |
|  |               | * HOMOGYNE Alpina (C.). Tussilago (L.)                                     | 1 »           | rivularis (B. R.) . . . . .   | » 50          |
|  |               | HOTTONIA palustris (L.) . . . . .  | 1 »           | LUNARIA rediviva (Linn.) . . . . .  | » 75          |
|  |               |  |               | * LYCHNIS Bungeana (Fisch.) . . . .   | 1 »           |
|  |               |  |               | chalconia (K.) fl. pleno . . . . .  | 1 »           |
|  |               |  |               | pumila plena . . . . .  | 1 »           |
|  |               |  |               | flos cuculli flore roseo plena . . .  | 1 »           |
|  |               |  |               | fulgens (Fisch.) . . . . .  | 1 »           |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>                              | fr. | c. | <i>La pièce. Das Stück.</i>                             | fr. | c. | <i>La pièce. Das Stück.</i>                                | fr. | c. |
|--|-----|----|---|-----|----|--|-----|----|
| * <i>LYCHNIS grandiflora</i> (Jacq.) . . . . .           | 1   | »  | * <i>PANCRATIUM maritimum</i> (L.) . . . . .            | 2   | »  | <i>PHLOX Van Houtti.</i> . . . . .                         | 1   | 50 |
| <i>Viscaria</i> (L.) fl. pleno. . . . .                  | »   | 50 | <i>PAPAVER bracteatum</i> (Lindl.) . . . . .            | 1   | »  | <i>variegata.</i> . . . . .                                | 1   | »  |
| <i>LYCOPODIUM helveticum.</i> . . . . .                  | »   | 50 | <i>HYBRIDIUM, nouvelle. Neu</i>                         | 5   | »  | <i>Vellerii.</i> . . . . .                                 | 1   | »  |
| <i>LYSIMACHIA ciliata</i> (L.) . . . . .                 | »   | 50 | <i>Burseri</i> (Cranz) . . . . .                        | 1   | 50 | <i>verna is.</i> . . . . .                                 | »   | 50 |
| <i>verticillata</i> (W.) . . . . .                       | »   | 50 | <i>Orientale</i> (L.) . . . . .                         | 1   | »  | <i>versicolor.</i> . . . . .                               | 2   | »  |
| <i>MAJANTHEMUM bifolium</i> (DC.) Con-                   |     |    | <i>PARNASSIA palustris</i> (L.) . . . . .               | »   | 50 | <i>PLANTAGO Kentokensis.</i> . . . . .                     | 2   | »  |
| <i>vallaria</i> (L.) . . . . .                           | »   | 50 | * <i>PENTASTIEMUM Antverbiensis.</i> . . . . .          | 1   | 50 | <i>POLEMONIUM cœruleum</i> (L.) . . . . .                  | »   | 50 |
| <i>MELITIS Melissophyllum</i> (L.) . . . . .             | »   | 50 | * <i>campanulatus</i> (Willd.) . . . . .                | »   | 50 | <i>flore albo.</i> . . . . .                               | 1   | »  |
| * <i>MIMULUS Cardinalis Baumannii.</i> . . . . .         | »   | 75 | * <i>confertus</i> (Dougl.) . . . . .                   | »   | 50 | <i>dissectum</i> (L.) . . . . .                            | 1   | »  |
| * <i>Dreyferii.</i> . . . . .                            | »   | 75 | * <i>gentianoides</i> (Poir.) . . . . .                 | 1   | »  | <i>flore albo.</i> . . . . .                               | 1   | »  |
| * <i>Frœbeli.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>coccineus.</i> . . . . .                             | 1   | »  | <i>reptans</i> (L.) . . . . .                              | »   | 50 |
| * <i>fulgens.</i> . . . . .                              | »   | 75 | <i>gracilis</i> (Nutt.) . . . . .                       | 1   | »  | <i>PHLOMIS Samia</i> (Linn.) . . . . .                     | 1   | »  |
| * <i>Harrisi.</i> . . . . .                              | »   | 75 | <i>hirsutus.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>PHYTEUMA orbiculare</i> (L.) . . . . .                  | 1   | 50 |
| * <i>Hofmeisterii.</i> . . . . .                         | 1   | »  | <i>latifolius.</i> . . . . .                            | 1   | »  | <i>POTENTILLA alba.</i> . . . . .                          | 1   | »  |
| * <i>Houttei.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>ovatus.</i> . . . . .                                | 1   | »  | * <i>atrosanguinea</i> (Don.) . . . . .                    | 1   | »  |
| * <i>Lehmanni.</i> . . . . .                             | 4   | »  | * <i>pubescens</i> (Ait.) . . . . .                     | »   | 75 | <i>crocea</i> (Hail.), <i>P. sabauda</i> (Vill.) . . . . . | 1   | »  |
| * <i>Nuschlerii.</i> . . . . .                           | 1   | »  | * <i>Richardsoni</i> (Dougl.) . . . . .                 | 1   | »  | * <i>nepalensis</i> (Hook.) . . . . .                      | 1   | »  |
| * <i>Oberon.</i> . . . . .                               | 1   | »  | * <i>venustus</i> (Dougl.) . . . . .                    | 1   | »  | <i>rupestris</i> (L.) . . . . .                            | 1   | »  |
| * <i>Ohlii.</i> . . . . .                                | 1   | »  | <i>PETALOSTEMUM candidum</i> (Mich.) . . . . .          | 3   | »  | * <i>PRIMULA acaulis</i> (Jacq.) . . . . .                 | »   | 50 |
| * <i>pulchella.</i> . . . . .                            | 1   | »  | <i>violaceum</i> (Mich.) . . . . .                      | 2   | »  | * <i>alba plena.</i> . . . . .                             | 1   | 50 |
| * <i>Schinzii.</i> . . . . .                             | 1   | »  | <i>PHLOX alba carmosina.</i> . . . . .                  | 1   | 50 | * <i>carnea.</i> . . . . .                                 | 1   | »  |
| * <i>splendens.</i> . . . . .                            | 1   | »  | <i>alba lutea.</i> . . . . .                            | 1   | »  | * <i>lilacina plena.</i> . . . . .                         | 1   | »  |
| * <i>Stokeri.</i> . . . . .                              | »   | 75 | <i>purpurea variegata.</i> . . . . .                    | 1   | »  | * <i>lutea plena.</i> . . . . .                            | 1   | »  |
| * <i>superbus.</i> . . . . .                             | »   | 75 | <i>superba.</i> . . . . .                               | 1   | 50 | * <i>plenissima.</i> . . . . .                             | 2   | »  |
| <i>guttatus.</i> . . . . .                               | »   | 50 | <i>Alise.</i> . . . . .                                 | 2   | »  | * <i>violacea.</i> . . . . .                               | 1   | »  |
| <i>formosus.</i> . . . . .                               | 1   | »  | <i>amabilis.</i> . . . . .                              | 1   | 50 | <i>auricula</i> (L.) . . . . .                             | »   | 50 |
| <i>moschatus</i> (Dougl.) . . . . .                      | »   | 50 | <i>americana.</i> . . . . .                             | 2   | »  | <i>Auricules assorties dans les 12 plus</i>                |     |    |
| <i>ringens</i> (L.) . . . . .                            | »   | 50 | <i>Amphitriton.</i> . . . . .                           | 2   | »  | <i>belles variétés. In 12 der schönsten</i>                |     |    |
| <i>MOERINGIA muscosa</i> (Lin.) . . . . .                | »   | 50 | <i>blanc de Neuilly.</i> . . . . .                      | 1   | »  | <i>Sorten assortirt 12 pièces.</i> . . . . .               | 6   | »  |
| <i>MOLINIA cœrulea fol. varieg.</i> . . . . .            | »   | 50 | <i>borbonensis.</i> . . . . .                           | 1   | »  | <i>En mélange dans les bonnes variétés.</i>                |     |    |
| <i>MONARDA didyma</i> (L.) . . . . .                     | »   | 50 | <i>candidissima nova.</i> . . . . .                     | 2   | »  | <i>In guten Sorten melirt. Le 100.</i> . . . . .           | 20  | »  |
| <i>Kalmiana.</i> . . . . .                               | »   | 50 | <i>carnea punctata.</i> . . . . .                       | 1   | »  | <i>auricula rubro plena.</i> . . . . .                     | 3   | »  |
| <i>violacea</i> (Desf.) . . . . .                        | »   | 75 | <i>Caselli.</i> . . . . .                               | 1   | »  | * <i>calycina</i> (Gaud.) . . . . .                        | 1   | »  |
| <i>MORINA spectabilis</i> (Fisch.) . . . . .             | 1   | »  | <i>Chauvieri.</i> . . . . .                             | 1   | »  | * <i>Candolleana</i> (Rech.) . . . . .                     | 1   | »  |
| * <i>MULGEDIUM alpinum.</i> (Less.) Son-                 |     |    | <i>Coburni.</i> . . . . .                               | 1   | »  | * <i>cortusoides</i> (Lin.) . . . . .                      | 1   | »  |
| <i>chus</i> (L.) . . . . .                               | 1   | »  | <i>Coquetti.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>denticulata</i> (Smith) . . . . .                       | 4   | »  |
| <i>NELUMBIUM LUTEUM</i> (Willd.) . . . . .               | 6   | »  | <i>cordata grandiflora</i> (L.) . . . . .               | 1   | »  | <i>elatioi</i> (Jacq.) . . . . .                           | »   | 50 |
| <i>Cette belle plante aquatique résiste</i>              |     |    | <i>decussata</i> (Lyon.) . . . . .                      | »   | 50 | * <i>farinosa</i> (L.) . . . . .                           | »   | 50 |
| <i>parfait ment dans nos pièces d'eau, et</i>            |     |    | <i>major.</i> . . . . .                                 | 1   | »  | * <i>longiflora</i> (All.) . . . . .                       | 1   | »  |
| <i>en fait un grand ornement pendant l'été.</i>          |     |    | <i>Donkelarii.</i> . . . . .                            | 1   | »  | * <i>verticillata.</i> . . . . .                           | 2   | »  |
| <i>NUPHAR luteum</i> (Sm.) . . . . .                     | 1   | »  | <i>éclipse.</i> . . . . .                               | 2   | »  | * <i>viscosa.</i> . . . . .                                | »   | 75 |
| <i>pumilum</i> (Sm.) . . . . .                           | 2   | »  | <i>Egyptian.</i> . . . . .                              | 2   | »  | <i>PRUNELLE grandiflora.</i> . . . . .                     | »   | 50 |
| <i>NYMPHÆA alba</i> (L.) . . . . .                       | 1   | 50 | <i>ENGELI, nouveau semis.</i> . . . . .                 | 3   | »  | <i>PULMONARIA saccharata</i> (Willd.) . . . . .            | »   | 75 |
| <i>OBELISCARIA pinnata</i> (Cass.) Rudbeckia             |     |    | <i>eximia striata.</i> . . . . .                        | »   | 75 | <i>virginica</i> (L.) . . . . .                            | 1   | 50 |
| <i>(Vent.)</i> . . . . .                                 | »   | 50 | <i>formosa.</i> . . . . .                               | 1   | »  | <i>PYROLA minor</i> (L.) . . . . .                         | »   | 50 |
| <i>OENOTHERA Fraseri</i> (Pursh.) . . . . .              | »   | 50 | <i>formosissima.</i> . . . . .                          | »   | 50 | <i>rotundifolia</i> (L.) . . . . .                         | »   | 50 |
| * <i>macrocarpa</i> (Pursh.) . . . . .                   | 1   | »  | <i>franciseei.</i> . . . . .                            | 1   | »  | <i>RANUNCULUS aconitifolius</i> (L.) . . . . .             | »   | 50 |
| <i>OMPHALODES verna</i> (Moench.) . . . . .              | »   | 50 | <i>glaberrima</i> (Willd.) . . . . .                    | »   | 50 | <i>flore pleno.</i> . . . . .                              | 1   | »  |
| <i>ORNITHOGALUM luteum.</i> . . . . .                    | 1   | »  | <i>grandis nova.</i> . . . . .                          | 1   | »  | <i>acris</i> (L.) <i>flore pleno.</i> . . . . .            | »   | 50 |
| <i>OROBUS niger</i> (L.) . . . . .                       | »   | 50 | <i>hortensiae flora.</i> . . . . .                      | 1   | »  | <i>alpestris.</i> . . . . .                                | »   | 50 |
| <i>pyrenaicus</i> (Lin.) . . . . .                       | 2   | »  | <i>Houletti.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>glacialis.</i> . . . . .                                | 1   | »  |
| <i>variegatus</i> (Ten.) . . . . .                       | 1   | »  | <i>hybrida variegata.</i> . . . . .                     | 1   | »  | <i>pyrenaicus</i> (L.) . . . . .                           | 1   | »  |
| <i>vernus</i> (L.) . . . . .                             | 1   | 50 | <i>insignis.</i> . . . . .                              | 2   | »  | <i>repens</i> (L.) <i>flore pleno.</i> . . . . .           | »   | 50 |
| <i>PÆONIA corallina</i> (Retz.) . . . . .                | »   | 50 | <i>Juliette Martin.</i> . . . . .                       | 1   | »  | <i>RHEUM Emodi</i> (Wall.) . . . . .                       | »   | 50 |
| <i>fl. plena.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>Limburgensis.</i> . . . . .                          | 1   | »  | <i>undulatum</i> (L.) . . . . .                            | 1   | »  |
| <i>edulis</i> (P. L.) . . . . .                          | »   | 50 | <i>Listoniana</i> (DS.) . . . . .                       | »   | 50 | <i>RHODIOLA rosea</i> (Lin.) . . . . .                     | »   | 50 |
| <i>albiflora</i> (L. T.) <i>fl. plena.</i> . . . . .     | 4   | »  | <i>macrophylla.</i> . . . . .                           | 1   | »  | <i>RUBUS arcticus</i> (L.) . . . . .                       | »   | 50 |
| <i>carmosina.</i> . . . . .                              | 3   | »  | <i>Madame Rendattler.</i> . . . . .                     | 1   | 50 | <i>RUDBECKIA Drummondii.</i> . . . . .                     | 1   | »  |
| <i>fragrans</i> (L. T.) . . . . .                        | 3   | »  | <i>Mathilde.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>fulgida</i> (Ait.) . . . . .                            | 1   | »  |
| <i>Humei.</i> . . . . .                                  | 3   | »  | <i>memorabilis.</i> . . . . .                           | 2   | »  | <i>laciniata</i> (L.) . . . . .                            | 1   | »  |
| <i>Pottsii</i> (Sab.) . . . . .                          | 3   | »  | <i>omniflora.</i> . . . . .                             | 1   | »  | <i>purpurea</i> (Linn.) . . . . .                          | 2   | »  |
| <i>Reewesi.</i> . . . . .                                | 4   | »  | <i>pallida.</i> . . . . .                               | 1   | »  | <i>speciosa</i> (Wend.) . . . . .                          | »   | 50 |
| <i>rubescens.</i> . . . . .                              | 3   | »  | <i>striata.</i> . . . . .                               | 1   | »  | <i>serotina</i> (Iweet.) . . . . .                         | 2   | »  |
| <i>spectabilis.</i> . . . . .                            | 3   | »  | <i>pâle Lavander.</i> . . . . .                         | »   | 50 | <i>RUSCUS aculeatus.</i> . . . . .                         | 1   | »  |
| <i>triomphe du Nord.</i> . . . . .                       | 35  | »  | <i>paniculata.</i> . . . . .                            | »   | 50 | <i>Hypoglossum.</i> . . . . .                              | 1   | »  |
| <i>glaucescens.</i> . . . . .                            | 1   | »  | <i>Pepo.</i> . . . . .                                  | »   | 75 | <i>racemosus.</i> . . . . .                                | 1   | »  |
| <i>officinalis</i> (L.) <i>atrorub. pleno.</i> . . . . . | »   | 50 | <i>philadelphica.</i> . . . . .                         | 1   | »  | * <i>SANGUINARIA canadensis</i> (L.) . . . . .             | »   | 50 |
| <i>albo pleno.</i> . . . . .                             | 3   | »  | <i>procumbens</i> (Sweet.) . . . . .                    | »   | 50 | * <i>SAXIFRAGA aizoon</i> (Jacq.) . . . . .                | 1   | »  |
| <i>fimbriata.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>Princesse Marie.</i> . . . . .                       | 1   | »  | * <i>aspera</i> (L.) . . . . .                             | 1   | »  |
| <i>foliis variegatis.</i> . . . . .                      | 2   | »  | <i>pulchella anglica.</i> . . . . .                     | 1   | »  | * <i>autumnalis</i> (L.) . . . . .                         | 1   | »  |
| <i>fulgens.</i> . . . . .                                | 1   | 50 | <i>pulcherrima.</i> . . . . .                           | 1   | »  | * <i>crassifolia</i> (L.) . . . . .                        | 1   | 50 |
| <i>hyalina</i> (Nob.) . . . . .                          | 2   | »  | <i>pyramide éclatante.</i> . . . . .                    | 1   | 50 | * <i>cuneifolia</i> (L.) . . . . .                         | 1   | »  |
| <i>imbricata.</i> . . . . .                              | 1   | »  | <i>Rachel.</i> . . . . .                                | 1   | 50 | * <i>decipiens.</i> . . . . .                              | »   | 50 |
| <i>lobata.</i> . . . . .                                 | 2   | »  | <i>reflexa.</i> . . . . .                               | »   | 50 | * <i>elatioi</i> (M. K.) . . . . .                         | 1   | 50 |
| <i>mutabilis.</i> . . . . .                              | 1   | 50 | <i>Régeli.</i> . . . . .                                | 1   | »  | * <i>hypnoides</i> (L.) . . . . .                          | 1   | »  |
| <i>purpurea.</i> . . . . .                               | 1   | »  | <i>Richild.</i> . . . . .                               | 1   | »  | * <i>ligulata.</i> . . . . .                               | 2   | »  |
| <i>peregrina</i> (L. T.) . . . . .                       | 2   | »  | <i>setacea</i> (L.) . . . . .                           | »   | 50 | * <i>longifolia</i> (Lap.) . . . . .                       | 1   | 50 |
| <i>Grevillii</i> (L. T.) . . . . .                       | 4   | »  | <i>speciosa.</i> . . . . .                              | »   | 50 | * <i>moschata</i> (Wulf.) . . . . .                        | 1   | »  |
| <i>rosea alba.</i> . . . . .                             | 1   | 50 | <i>suaveolens</i> (Ait.), <i>fol. varieg.</i> . . . . . | 1   | »  | * <i>mutata.</i> . . . . .                                 | 1   | 50 |
| <i>Sinensis alba plena.</i> . . . . .                    | 2   | »  | <i>subulata.</i> . . . . .                              | 1   | »  | * <i>oppositifolia</i> (L.) . . . . .                      | 1   | »  |
| <i>tenuifolia</i> (L.) . . . . .                         | 1   | »  | <i>Thomsoniana.</i> . . . . .                           | 1   | »  | * <i>pyramidalis</i> (Lap.) . . . . .                      | 1   | »  |
| <i>villosa</i> (Sweet.) <i>fl. plena.</i> . . . . .      | 2   | »  | <i>triflora</i> (Sweet.) <i>picta.</i> . . . . .        | 1   | »  | * <i>rotundifolia</i> (L.) . . . . .                       | 1   | »  |
| <i>venusta.</i> . . . . .                                | 3   | »  | <i>Triomphe Borbonensis.</i> . . . . .                  | 1   | »  | * <i>stellaris.</i> . . . . .                              | »   | 50 |
| <i>PALAEFOXIA Hookeriana.</i> . . . . .                  | 4   | »  | <i>Van Halli.</i> . . . . .                             | 1   | »  | * <i>Sternbergii.</i> . . . . .                            | »   | 50 |



| La pièce. Das Stück.                     |     | fr. c. | La pièce. Das Stück.                         |     | fr. c. | La pièce. Das Stück.  |     | fr. c. |
|--|-----|--------|--|-----|--------|---|-----|--------|
| * SAXIFRAGA umbrosa (Linn.) . . . . .    | 1 » |        | SPIRÆA Ulmaria fol. varieg. . . . .          | 1 » |        | VERONICA gentianoides (Vahl.) . . . .   | »   | 50     |
| SCILLA autumnalis (L.) . . . . .         | »   | 50     | STATICE Armeria (L.) . . . . .               | »   | 50     | incana (Lin.) . . . . .   | »   | 50     |
| bifolia (L.) . . . . .                   | »   | 50     | * Gmelini (Willd.) . . . . .                 | 1   | 50     | incisa (Ait.) . . . . .   | »   | 50     |
| campanulata . . . . .                    | 1 » |        | latifolia (Smith.) . . . . .                 | 1 » |        | * Lindeniana . . . . .  | 3 » |        |
| SEDUM acre (L.) . . . . .                | »   | 50     | macrophylla . . . . .                        | 1 » |        | scaberima? . . . . .  | 1 » |        |
| Cepæa (L.) . . . . .                     | »   | 50     | speciosa (L.) . . . . .                      | 1 » |        | spicatata foliis variegatis . . . . .   | 1 » |        |
| dasyphyllum (L.) . . . . .               | 1 » |        | * tatarica (L.) . . . . .                    | 1 » |        | Teucrium (Linn.) . . . . .  | »   | 75     |
| involutum (Brst.) . . . . .              | »   | 50     | STACHYS speciosa (Hook.) . . . . .           | 1 » |        | VINCA major . . . . .   | 1 » |        |
| maximum (Sut.) . . . . .                 | 1 » |        | STOKESIA cyanea (Hérit.) . . . . .           | 1   | 50     | folius variegatis . . . . .   | »   | 50     |
| populifolium (L.) . . . . .              | 1 » |        | STRATIODES aloides, <i>aquatique</i> . . . . | 2 » |        | minor (L.) flore albo . . . . .   | »   | 50     |
| repens (Schl.) . . . . .                 | 1 » |        | SWERTIA perennis (L.) . . . . .              | 1   | 50     | fl. purp. pl. . . . .   | »   | 50     |
| saxatile . . . . .                       | »   | 50     | THALICTRUM aquilegifolium (L.) . . .         | »   | 50     | violaceo pleno . . . . .  | 1 » |        |
| Sieboldti . . . . .                      | »   | 50     | flore violaceo . . . . .                     | »   | 50     | VIOLA altaica (Pall.) . . . . .   | »   | 50     |
| Telephium (L.) . . . . .                 | 1 » |        | exaltatum (Gaud.) . . . . .                  | 1 » |        | Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung englischer Spielarten, mit Namen assortirt. . . . .  |     |        |
| ternatum (Mx.) . . . . .                 | »   | 50     | glaucon (Desf.) . . . . .                    | »   | 50     |   |     |        |
| SEMPERVIVUM arachnoideum (L.) . . .      | 1 » |        | minus (Linn.) . . . . .                      | 1 » |        | Une collection de 50 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 50 Sorten, mit Namen assortirt. . . .   |     |        |
| Braunii (Funk.) . . . . .                | 1   | 50     | TELLIMA grandiflora (Lindl.) . . . .         | »   | 50     |   |     |        |
| Funki (Braun.) . . . . .                 | 1   | 50     | TEUCRIUM montanum (L.) . . . . .             | »   | 50     | VIOLA obliqua variegatis . . . . .  | 1 » |        |
| montanum (L.) . . . . .                  | 1 » |        | TIARELLA cordifolia (L.) . . . . .           | »   | 50     | odorata (L.) . . . . .  | »   | 50     |
| Schimperi . . . . .                      | 2 » |        | TOFELDIA borealis (Wahlb.) . . . . .         | »   | 75     | arborea violaceo pleno . . . . .  | »   | 50     |
| tectorum (L.) . . . . .                  | »   | 50     | calyculata (Wahlb.) . . . . .                | 1 » |        | Bruneauinii flore pleno . . . . .   | »   | 50     |
| Wulfenii (Hop.) . . . . .                | 1 » |        | glacialis (Gaud.) . . . . .                  | »   | 50     | flore albo . . . . .  | »   | 50     |
| SENECIO Kämpferi (DC.) Tussilago         |     |        | TRADE-CANTIA virginica (L.) fl. viol.        | »   | 50     | pleno . . . . .   | »   | 50     |
| japonica . . . . .                       | 5 » |        | TRIFOLIUM variegatum <i>Trèfle des tom-</i>  | »   | 50     | rubro pleno . . . . .   | »   | 50     |
| SILENE acaulis (L.) . . . . .            | 1 » |        | <i>beaux</i> . . . . .                       | »   | 50     | foliis variegatis . . . . .   | »   | 50     |
| SISYRINCHIUM anceps (L.) . . . . .       | »   | 50     | TRILLIUM cernuum (L.) . . . . .              | 3 » |        | * Parmacensis, violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer. Zum treiben besonders geeignet  | »   | 50     |
| grandiflorum (Cav.) . . . . .            | 1 » |        | grandiflorum (Salisb.) . . . . .             | 3 » |        | palmata (L.) . . . . .  | »   | 50     |
| strictum? . . . . .                      | 1   | 50     | viride . . . . .                             | 1   | 50     | flore variegatis . . . . .  | 1 » |        |
| * SMILACINA racemosa (Desf.) Conval-     |     |        | TRIOSTEUM perfoliatum (Lin.) . . . .         | 1   | 50     | pedata (L.) . . . . .   | 3 » |        |
| laria (L.) . . . . .                     | 1 » |        | TROILIUS Europæus (L.) . . . . .             | »   | 50     | * pinnata (L.) . . . . .  | 1 » |        |
| * SOLDANELIA Alpina (L.) . . . . .       | »   | 50     | napellifolius (Rœp.) . . . . .               | 1 » |        | WÄHLENBERGIA grandiflora (Schr.) . .  | 1   | 50     |
| * asarifolia . . . . .                   | 1   | 50     | TYPHA latifolia (L.) . . . . .               | 1 » |        | WULFENIA Carinthiaca (Jacb.) . . .  | 1   | 50     |
| * minima (Hoppe) . . . . .               | 1 » |        | minima . . . . .                             | 1 » |        | Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr., et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 50 Sorten nach unserer Wahl, 20 Fr., und eine Sammlung von 100. |     |        |
| * montana (Willd.) . . . . .             | 1   | 50     | UNIOLA latifolia (Mich.) . . . . .           | 1 » |        |   |     |        |
| * pusilla (Baumg.) . . . . .             | »   | 50     | UVULARIA grandiflora (H. K.) . . . .         | 2 » |        |   |     |        |
| SPIRÆA Aruncus (L.) . . . . .            | 1 » |        | VALERIANA angustifolia . . . . .             | »   | 50     |   |     |        |
| variet. americ. <i>S. Humboldti?</i> . . | 2 » |        | montana (L.) . . . . .                       | »   | 50     |   |     |        |
| filipendula (L.) . . . . .               | »   | 50     | Phu (L.) . . . . .                           | 1 » |        |   |     |        |
| flore pleno . . . . .                    | 1 » |        | VALLISNERIA spiralis (L.), fœm . . .         | 2 » |        |   |     |        |
| * japonica (Hort.) . . . . .             | 1   | 50     | VERATRUM lobelianum (Bernh.) . . .           | 5 » |        |   |     |        |
| lobata (Jacq.) . . . . .                 | 1 » |        | nigrum (Lin.) . . . . .                      | 1   | 50     |   |     |        |
| trifoliata . . . . .                     | 1 » |        | VERNONIA noveboracensis . . . . .            | 1 » |        |   |     |        |
| Ulmaria (L.) . . . . .                   | »   | 50     | VERONICA Bachofenii (Heuss.) . . .           | 1   | 50     |   |     |        |
| flore pleno . . . . .                    | 1 » |        | fruticulosa (Linn.) . . . . .                | »   | 50     |   |     |        |

## PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES MASSIFS ET DES ENROCHEMENS. — Bordur-Pflanzen zur Anlegung von Gruppen und Garnirung von Felsenparthieen.

|  | fr. Pour 10. | fr. Pour 100. |   | fr. Pour 10. | fr. Pour 100. |  | fr. Pour 10. | fr. Pour 100. |
|--|--------------|---------------|---|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| ACONITUM Napellus (L.) . . . . .       | 2 »          |               | CYNOGLOSUM Omphalodes . . . . .         | »            | 5             | PRIMULA veris, mélangés . . . . .                    | »            | 5             |
| Neubergense . . . . .                  | 2 »          |               | DAHLIA doubles, mélange . . . . .       | »            | 20            | auricula, mélangés. . . . .                          | »            | 15            |
| volubile . . . . .                     | 2 »          |               | DIANTHUS moschatus . . . . .            | »            | 8             | choix mélangés . . . . .                             | »            | 25            |
| ALYSSUM saxatile (L.) . . . . .        | 1 »          |               | DRACOCEPHALUM speciosum. . . . .        | 3 »          |               | SAXIFRAGA decipiens . . . . .                        | 2 »          |               |
| AMSONIA salicifolia . . . . .          | 3 »          |               | FOUGÈRES diverses. Verschiedene Farren- |              |               | longifolia . . . . .                                 | 2 »          |               |
| ASCLEPIAS incarnata . . . . .          | 4 »          |               | <i>Gräuter</i> . . . . .                | 5 »          |               | ombrosa. . . . .                                     | 2 »          |               |
| APIOS tuberosa (Mœnch.) . . . . .      | 2 »          |               | GENTIANA acaulis (W.) . . . . .         | 2 »          |               | diverses espèces. . . . .                            | »            | 25            |
| ANEMONE narcissiflora (Willd.) . . .   | 4 »          |               | HELEBORUS viridis . . . . .             | 4 »          |               | SEDUM, diverses espèces. . . . .                     | »            |               |
| nemerosa flore pleno . . . . .         | 2 »          |               | HEPATICA triloba flore rubro pleno. .   | 3 »          |               | SEMPERVIVUM, diverses espèces. . .                   | 3 »          |               |
| ANTHEMIS nobilis (Linn.) . . . . .     | 5 »          |               | IRIS mélange . . . . .                  | »            | 10            | SPIRÆA lobata. . . . .                               | 3 »          |               |
| ARMERIA vulgaris (Willd.) . . . . .    | »            | 3             | LUPINUS polyphyllus (Dougl.) . . .      | 2 »          |               | SYSYRINCHIUM anceps. . . . .                         | »            | 4             |
| BELLIS perennis flore albo pleno . .   | »            | 3             | LYCHNIS chalcedonica, mélange. . .      | »            | 5             | VIOLA odorata (L.) . . . . .                         | 4 »          |               |
| » flore rubro pleno . . . . .          | »            | 3             | viscosa fl. pleno . . . . .             | 2 »          |               | flore albo pleno . . . . .                           | »            | 2             |
| CAMPANULA persicifolia fl. albo pleno. | 3 »          |               | MIMULUS moschatus . . . . .             | 3 »          |               | foliis variegatis . . . . .                          | »            | 2             |
| » cœrulea . . . . .                    | 3 »          |               | MOLLINIA cœrulea fol. var. . . . .      | 2 »          |               | flore rubro pleno . . . . .                          | »            | 3             |
| Bocconi . . . . .                      | 3 »          |               | NYPHÆA alba. . . . .                    | 4 »          |               | palmata . . . . .                                    | 2            | 2             |
| grandis . . . . .                      | 2 »          |               | OENOTHERA Fraseri (Pursh.) . . . .      | 1 »          |               | Parmacensis. Violette de Parme, pour forcer. . . . . | »            | 5             |
| CERASTIUM tomentosum. . . . .          | 1            | 50            | PHLOX carnea punctata . . . . .         | 3 »          |               | VINCA major . . . . .                                | »            | 10            |
| CHELONE et Pentastemon, mélangé. .     | 2 »          |               | reptans . . . . .                       | »            | 5             | minor, mélangés . . . . .                            | 1            | 5             |
| CONVALLARIA majalis (L.) . . . . .     | »            | 8             | verna . . . . .                         | »            | 5             |  |              |               |
| flore pleno . . . . .                  | 2 »          |               | mélangés. . . . .                       | »            | 10            |  |              |               |
| CORYDALIS formosa (Pursh.) . . . .     | 2 »          |               | PODALYRIA australis (R. Br.) . . . .    | »            | 10            |  |              |               |



# PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmhaus = Pflanzen.

## OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue; nous prions nos commettans de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de nos envois, qui voyageront aux risques et périls de nos commettans.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

## Bemerkungen.

Die günstigsten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus-Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und October; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Pflanze für den Augenblick fehlet, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu erscheidenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Beforgung unserer Versendungen verwenden, welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mistbeet zu bringen, die Töpfe in die Lohe einzusetzen und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der äußern Luft und die Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahrt wird, muß man sie nach und nach, zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustande zurückführen, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört werden war.

| La pièce. Das Stück.  | fr. c.      |
|---|-------------|
| ABUTILON Bedfordianum . . . . .   | 2 »         |
| striatum . . . . .  | 1 »         |
| venosum (Lem.) . . . . .  | 1 à 4 »     |
| ACHIMENES alba. <i>Nipha oblongata</i>  | » 75        |
| coccinea (Pers.) <i>Trevirana coccinea</i>  | » 75        |
| rosea . . . . .   | » 75        |
| grandiflora (DC. A. Ghiesbreghtii).   | 1 à 2 »     |
| le 100 bubilles Die 100 Knollen .   | 8 »         |
| hirsuta . . . . .   | 1 »         |
| ignea . . . . .   | 2 »         |
| ilicifolia . . . . .  | 2 »         |
| Liebmanni . . . . .   | 2 50        |
| longiflora (DC.) . . . . .  | 1 à 2 »     |
| pedunculata . . . . .   | 1 »         |
| picta . . . . .   | 1 50        |
| tubiflora . . . . .   | 2 50        |
| le 100 bubilles. Die 100 Knollen.   | 10 »        |
| ACHIMENA discolor . . . . .   | 50 »        |
| fulgens . . . . .   | 20 à 50     |
| AGAVE foetida . . . . .   | 8 »         |
| ALETIS fragrans . . . . .   | 4 »         |
| ALOE arborescens (Mill.) . . . . .  | 3 »         |
| atrovirens (DC.) . . . . .  | 3 »         |
| brevifolia (Haw.) . . . . .   | 1 50        |
| ciliaris (Naw.) . . . . .   | 2 50        |
| disticha verrucosa . . . . .  | 1 50        |
| linguiformis . . . . .  | 2 »         |
| margaritifera (Ait.) . . . . .  | 2 »         |
| mitraeformis (Willd.) . . . . .   | 3 à 8 »     |
| plicatilis (Mill.) . . . . .  | 2 »         |
| variegata (L.) . . . . .  | 1 50        |
| verrucosa (Ait.) . . . . .  | 1 50        |
| virens (Haw.) . . . . .   | 1 50        |
| AEPINIA malabarica . . . . .  | 2 »         |
| nutans (Bot. Mag.) <i>Renealmia nutans</i> (And.) . . . . .                                       | 3 »         |
| ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.) . .  | 2 »         |
| AMARYLLIS alulca (Ker.) . . . . .   | 2 à 4 »     |
| aurea (Bot. Reg.) . . . . .   | 3 »         |
| advena (Ker.) . . . . .   | 3 à 5 »     |
| Atamasco minor (L.) . . . . .   | 1 »         |
| blanda (Bot. Mag.) . . . . .  | 2 »         |
| longifolia (Ait.) . . . . .   | 4 »         |
| Forte à fleurir. Blühbare Pflanzen.   | 15 »        |
| coccinea . . . . .  | 3 à 5 »     |
| crisp (Jacq.) <i>Strumaria crispa</i> (Bot Mag.) . . . . .  | 1 »         |
| Fothergillia (Andr.) . . . . .  | 3 »         |
| Gravini . . . . .   | 5 »         |
| Reginae (L.) . . . . .  | 2 50 à 5 f. |
| Johnsoni (Lodd.) . . . . .  | 3 »         |
| JOSEPHINE (Red.) <i>Brunswigia Josephinae</i> . . . . .   | 5 à 25 »    |
| Un exemplaire qui a déjà fleuri plusieurs fois. Eine Pflanze die schon mehrre Male geblüht hat. . | 38 »        |
| maranensis. <i>Hippeastrum stylosum</i> .   | 10 »        |
| purpurea (Ait.) . . . . .   | 3 »         |
| splendens (H. A.) . . . . .   | 6 »         |
| undulata . . . . .  | 2 »         |

| La pièce. Das Stück.   | fr. c.   |
|--|----------|
| AMARYLLIS Verreauxii? . . . . .                              | 4 »      |
| vittata? . . . . .   | 3 »      |
| ARALIA arborea (Lin.) . . . . .                              | 4 à 8 »  |
| umbellifera (Lam.) . . . . .                                 | 3 »      |
| ARDISIA colorata (Link.) . . . . .                           | 3 à 5 »  |
| complanata Flor. ind. . . . .                                | 3 »      |
| crenata Flor. ind. . . . .                                   | 1 à 4 »  |
| hymenandra (Wall.) . . . . .                                 | 5 à 10 » |
| humilis (Vahl.) . . . . .                                    | 3 »      |
| ARISTEA cyanea (Ait.) . . . . .                              | 3 »      |
| ARTHROPODIUM cirrhatum (BM.) . .                             | 1 »      |
| ARTHROSTEMMA parietarium. <i>Centradenia rosea</i> . . . . . | 1 50     |
| ARUM bicolor . . . . .                                       | 1 50     |
| Colocasia (L.) <i>Colocasia antiquorum</i> . . . . .         | 2 à 20 » |
| sagittifolium . . . . .                                      | 2 »      |
| ASPIDISTRA elatior fol. var. . . . .                         | 2 à 5 »  |
| ASTRAPAEA pendula . . . . .                                  | 1 »      |
| Wallichii (Ker.) . . . . .                                   | 2 à 20 » |
| BAMBUSA arundinacea (Retz.) . . . .                          | 3 »      |
| BAUMANNIA geminiflora (DC.) . . . .                          | 2 »      |
| BEAUMONTIA grandiflora (Bot. Reg.) .                         | 3 »      |
| BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.), maculata (Red.) . . . . .  | 1 50     |
| castanifolia . . . . .                                       | 1 »      |
| coccinea . . . . .   | 4 »      |
| dipetala (Grah.) . . . . .                                   | 1 »      |
| discolor (Smith.) . . . . .                                  | 1 »      |
| Dregei (H. Berol.) . . . . .                                 | 1 »      |
| grandis (Dryand.) . . . . .                                  | 3 »      |
| heracleifolia (Chmss.) . . . . .                             | 2 »      |
| hybrida . . . . .  | 2 »      |
| hydrocotylifolia nova . . . . .                              | 1 à 3 »  |
| longipes (Hook.) . . . . .                                   | 2 »      |
| macrophylla (Dryand.) . . . . .                              | 2 »      |
| manicata . . . . .   | 1 à 3 »  |
| muricata . . . . .   | 2 »      |
| nitida discolor . . . . .                                    | 1 50     |
| Noacki . . . . .   | 1 50     |
| papillosa (Grah.) . . . . .                                  | 1 50     |
| peltata . . . . .  | 1 à 3 »  |
| peponifolia . . . . .  | 2 »      |
| punctata (H.) <i>B. maculata</i> . . . . .                   | 2 »      |
| semperflorens (Lk. et Otto) . . . . .                        | 1 »      |
| sinuata (Wall.) . . . . .                                    | 3 »      |
| Species du Brésil, B. coccinea . . . .                       | 2 »      |
| ulmifolia . . . . .  | 1 »      |
| vitifolia . . . . .  | 1 50     |
| Warsowizki hybride du B. manicata                            | 2 50     |
| BESLERIA coccinea (Aubl.) . . . . .                          | 1 50     |
| BILBERGIA clavata (Lindl.) . . . . .                         | 2 à 3 »  |
| intermedia . . . . .   | 5 »      |
| iridifolia (Lindl.) . . . . .                                | 3 »      |
| pyramidalis (Lindl.) . . . . .                               | 1 50     |
| zebrina (Lindl.) . . . . .                                   | 4 »      |
| BOMBAX Ceiba (L.) <i>B. malabaricum</i> .                    | 2 à 8 »  |
| BONAPARTEA elegans (Hort.) <i>Roulinia Brong</i> . . . . .   | 10 à 30  |
| junceae (R. P.) . . . . .                                    | 5 à 60 » |

| La pièce. Das Stück.   | fr. c.   |
|--|----------|
| BONAPARTEA filamentos . . . . .                              | 4 à 40 » |
| BOOPHONA ciliaris (Herb.) . . . . .                          | 6 »      |
| BREXIA madagascariensis (H. Kew.) .                          | 6 »      |
| serrata (Presl.) . . . . .                                   | 8 »      |
| BROMELIA Ananas (Linn.) . . . . .                            | 2 à 6 »  |
| Antiqua black. . . . .                                       | 10 »     |
| bracteata . . . . .  | 2 à 15 » |
| Enville . . . . .  | 10 »     |
| Karatas . . . . .  | 5 »      |
| macrocarpa . . . . .   | 10 »     |
| nervosa . . . . .  | 10 »     |
| Plantes d'une année, les 12 . . . . .                        | 45 »     |
| » de 2 années, » . . . . .                                   | 56 »     |
| » de 3 années, » . . . . .                                   | 70 »     |
| BROSIMUM microcarpum . . . . .                               | 3 »      |
| BRUGMANSIA arborea non. B. candida.                          | 4 »      |
| floribunda . . . . .   | 3 »      |
| Knightii . . . . .   | 1 »      |
| BRUNFELSIA americana (Lin.) . . . .                          | 3 »      |
| violacea . . . . .   | 2 »      |
| BUDLEIA madagascariensis (Vahl.) . .                         | 2 »      |
| BULBINE aloides (Willd.) . . . . .                           | 2 »      |
| pugioniformis (Link.) . . . . .                              | 3 »      |
| CALADIUM odoratum (Roxb.) . . . . .                          | 4 à 6 »  |
| CALOSTEMMA Cunninghami (Ait.) . . .                          | 6 »      |
| CANNA Lambertii? . . . . .                                   | 3 »      |
| leptochila (Bouché) . . . . .                                | 3 »      |
| longifolia glauca du Brésil . . . . .                        | 5 »      |
| patens (Rosc.) . . . . .                                     | 2 »      |
| pruinosa (Hoffmg.) . . . . .                                 | 3 »      |
| Roscoean (Hort. Berol.) . . . . .                            | 3 »      |
| speciosa (Rosc.) . . . . .                                   | 6 »      |
| spectabilis? . . . . .                                       | 5 »      |
| variabilis (Willd.) . . . . .                                | 3 »      |
| CAROLINEA alba . . . . .                                     | 10 »     |
| insignis (Hort.) . . . . .                                   | 8 »      |
| CASSIA Sophera (L.) . . . . .                                | 2 »      |
| CASTANOSPERMUM australe (Cunningh.)                          | 2 »      |
| CATESBAE spinosa (L.) . . . . .                              | 2 »      |
| CECROPIA peltata (Lin.) . . . . .                            | 4 »      |
| CERBERA Thevetia (Linn.) . . . . .                           | 5 »      |
| CEROPEGIA stapeliaeformis (Haw.) . .                         | 3 »      |
| CESTRUM roseum . . . . .                                     | 1 à 3 »  |
| CHAMBERLAYNIA spectabilis . . . . .                          | 20 »     |
| CHEIROSTEMUM platanoides (H. et B.)                          | 5 »      |
| CHLOROPHYTUM orchidiatrum (BR.) . .                          | 3 »      |
| CITRUS trifoliata (Lin.) . . . . .                           | 3 »      |
| CLAVIA ornata (Don.) . . . . .                               | 20 »     |
| CLIVEA nobilis (Lind.) . . . . .                             | 1 à 25 » |
| CLEOME gigantea (Willd.) . . . . .                           | 4 »      |
| CLERODENDRON speciosum . . . . .                             | 5 »      |
| fragrans (Willd.) <i>Valkameria japonica</i> (Th.) . . . . . | 1 à 3 »  |
| flore pleno . . . . .  | 1 à 3 »  |
| hastatum (Wall.) . . . . .                                   | 2 »      |
| calamitosum (Linn.) . . . . .                                | 4 »      |
| splendens (Knight.) . . . . .                                | 4 à 8 »  |
| flore albo . . . . .   | 8 »      |
| squamatum verum . . . . .                                    | 6 »      |
| COBURGIA flava? . . . . .                                    | 3 »      |



| La pièce. Das Stück.                  |  | fr. c.      | La pièce. Das Stück.                |  | fr. c.      | La pièce. Das Stück.                  |  | fr. c.     |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|--|------------|
| COBURGIA fulva (Herbert.)             |  | 2 »         | GALACTODENDRON utile (H. B.)        |  | 40 »        | JASMINUM Sambac (Ait.) fl. pleno      |  | 150 à 3 f. |
| COCCOLOBA laurifolia                  |  | 8 »         | GARDENIA coccinea.                  |  | 10 »        | multiflorum                           |  | 5 »        |
| COFFEA arabica (L.)                   |  | 3 à 25 »    | florida (L.)                        |  | 1 à 3 »     | JUSTICIA carnea superba. J. velutina. |  | 3 »        |
| species de la Havanne.                |  | 5 »         | flore pleno.                        |  | 1 à 3 »     | chinensis                             |  | 5 »        |
| COLUMNÆA chloronema.                  |  | 1 »         | latifolia (Ait.)                    |  | 3 à 6 »     | cristata (Jacq.)                      |  | 2 »        |
| crassifolia                           |  | 4 à 5 »     | lucida (Roxb.)                      |  | 2 à 4 »     | oblongata (Link.)                     |  | 2 »        |
| longifolia (L.)                       |  | 4 »         | radicans (Thunb.)                   |  | 1 à 3 »     | speciosa                              |  | 3 à 4 »    |
| CORDIA speciosa (Willd.)              |  | 10 »        | Greffée en tige sur G. Florida. Auf |  |             | IXORA arborea?                        |  | 4 »        |
| CRINUM americanum                     |  | 4 à 8 »     | Stämme von G. Florida gewiegt       |  | 5 »         | coccinea (Lin.), grandiflora (DC.)    |  | 3 »        |
| aquaticum (Burch.)                    |  | 4 »         | Scherbourniana                      |  | 20 »        | rosea (Wall.)                         |  | 5 »        |
| Caribæum (Bot. Mag.)                  |  | 5 à 10 »    | tetrasperma (Roxb.)                 |  | 2 »         | KÆMPFERA élégans. Monolophus elegans  |  | 2 à 5 »    |
| erubescens                            |  | 5 à 20 »    | GASTO-IA palmata (Roxb.)            |  | 30 à 50 »   | longa (Jacq.)                         |  | 1 à 4 »    |
| latifolium (Roxb.)                    |  | 4 à 20 »    | GEISSOMERIA longiflora (R. Br.)     |  | 3 »         | ovata                                 |  | 2 »        |
| strictum (Horum.)                     |  | 10 »        | GESNERIA aggregata (Ker.)           |  | 2 »         | LANTANA Selloi (Link.)                |  | 1 »        |
| CURCULIGO recurvata (Dryand.)         |  | 2 à 5 »     | bulbosa (Ker.)                      |  | 1 50        | species?                              |  | 5 »        |
| DASYLIRION filiforme                  |  | 15 »        | Cooperi                             |  | 3 »         | LAURUS Cassia (L.)                    |  | 3 à 8 »    |
| angustifolium                         |  | 15 »        | elongata (H. B.)                    |  | 3 »         | Cinnamomum                            |  | 8 »        |
| species du Mexique                    |  | 35 »        | faucialis (Lindl.)                  |  | 3 »         | involucrata                           |  | 4 »        |
| nova latifolia                        |  | 60 »        | Geraldiana                          |  | 10 »        | Persea (Willd.) Persea gratissima     |  |            |
| DESMODIUM australe (DC.)              |  | 2 »         | grandis (Sw.)                       |  | 3 »         | (Gært.)                               |  | 30 »       |
| gyrans                                |  | 3 à 8 »     | hirsuta (H. B.)                     |  | 1 50        | LIMONIA spectabilis                   |  | 15 à 30 »  |
| species du Madagascar                 |  | 5 »         | Huttei nova                         |  | 2 »         | trifoliata (L.)                       |  | 2 »        |
| DIANELLA cœrulea (Smith.)             |  | 2 »         | pendulina G. aggregata              |  | 2 »         | LUCULIA gratissima (Sweet.)           |  | 5 à 8 »    |
| DICERMA pulchellum                    |  | 3 »         | rutilla (Lindl.)                    |  | 3 »         | pinceana                              |  | 10 à 20 »  |
| DICHORISANDRA ovata (Mart.)           |  | 10 à 20 »   | sceptrum                            |  | 4 »         | MAGNOLIA fuscata (Andr.)              |  | 2 à 6 »    |
| DIDYMOCARPUS Rexii (Bowie)            |  | 1 »         | Schotti (Mikan.)                    |  | 1 50        | pumila                                |  | 2 à 4 »    |
| DIENÆA muscipula (L.)                 |  | 3 à 6 »     | species du Brésil                   |  | 10 »        | MALVA umbellata (Cav.)                |  | 2 »        |
| DOMBEYA erythroxylon                  |  | 3 »         | superba                             |  | 10 »        | MANETTIA cordifolia (Mart.)           |  | 2 »        |
| DONKELARIA diversifolia. Arthros-     |  |             | tomentosa (Spr.)                    |  | 3 »         | MARANTA capitata (R. et B.)           |  | 3 »        |
| temma diversifolia                    |  | 1 50        | Zebrina                             |  | 1 à 3 »     | grandis                               |  | 2 »        |
| DRACÆNA amaryllifolia?                |  | 20 »        | GLOBA erecta (Red.)                 |  | 3 »         | zebrina (Spr.) Calathea zebrina (B.   |  |            |
| arborea (Link.)                       |  | 5 »         | GLOXINIA caulescens                 |  | 1 à 1 50    | Reg.)                                 |  | 2 à 5 »    |
| australis (Forst.)                    |  | 10 »        | maculata (l'Hérit.)                 |  | 2 »         | MARICA cœlestis (Lehm.)               |  | 1 50       |
| brasiliensis (Hort.)                  |  | 8 à 20 »    | maxima                              |  | 2 »         | iridifolia                            |  | 1 »        |
| Draco (Willd.)                        |  | 5 à 10 »    | pallida                             |  | 1 à 1 50    | Northiana cœrulea                     |  | 2 »        |
| cernua (Jacq.)                        |  | 8 »         | Cerina                              |  | 2 à 3 »     | MELASTOMA cymosum (Vent.)             |  | 2 »        |
| ensifolia (Haw.)                      |  | 2 »         | digitaliflora                       |  | 3 à 8 »     | cœruleum                              |  | 3 »        |
| nigra                                 |  | 20 »        | Douglasi                            |  | 1 à 1 50    | Selloi                                |  | 1 50       |
| paniculata? an nova                   |  | 4 »         | gesnerioides                        |  | 3 à 6 »     | MIMOSA quadrangularis                 |  | 3 »        |
| reflexa (Link.)                       |  | 3 »         | Goodii                              |  | 3 »         | pudica (Linn.)                        |  | 1 »        |
| salicifolia                           |  | 4 »         | hirsuta                             |  | 1 à 3 »     | MURRAYA exotica (Linn.)               |  | 3 »        |
| terminalis (L.)                       |  | 2 à 5 »     | insignis rubra                      |  | 5 »         | MUSA rosacea (Jacq.)                  |  | 3 à 6 »    |
| foliis variegatis                     |  | 2 à 10 »    | Menziesi                            |  | 1 à 2 »     | Cavend shii (Paxt.)                   |  | 3 à 20 »   |
| undulata?                             |  | 10 »        | obscura                             |  | 1 à 3 »     | coccinea (Andr.)                      |  | 6 »        |
| DRYMONIA punctata                     |  | 1 »         | pallida                             |  | 1 50        | indica rosacea nova                   |  | 20 »       |
| DYCKIA remotiflora (Otto)             |  | 1 à 3 »     | Priestleyana                        |  | 1 »         | speciosa (Tenor.)                     |  | 6 à 20 »   |
| ELÆODENDRON orientale                 |  | 6 »         | procellentissima                    |  | 1 à 2 »     | Zebrina                               |  | 25 à 40 »  |
| EMBRYOPTERIS glutinifera (Rox.) Dios- |  |             | rosea                               |  | 1 50        | MYRTUS pimenta (Linn.)                |  | 5 »        |
| pyros Embryopter. (Spr.)              |  | 2 à 8 »     | rubra                               |  | 1 »         | vera                                  |  | 5 »        |
| ERYTHRINA castra (Bot. Reg.)          |  | 3 »         | RUBRA SPECIOSISSIMA, nou-           |  |             | NAPOLEONA IMPERIALIS (Beaur.)         |  | 25 à 40 »  |
| crista galli (L.)                     |  | 1 50 à 3 f. | veau gain superbe                   |  | 10 »        | NEPENTHES de-tillatoria (L.)          |  | » »        |
| laurifolia (Jacq.)                    |  | 4 »         | speciosa (Lod.)                     |  | » 50        | NERIUM caudatum (Lam.)                |  | 3 »        |
| herbacea (L.)                         |  | 4 »         | fl. albo. G. candida                |  | 2 »         | coronarium (Ait.)                     |  | 3 »        |
| pieta (Lin.)                          |  | 10 »        | GOLDFUSSIA anisophylla (Nus.)       |  | 2 »         | OSBEKIA canescens                     |  | 1 »        |
| speciosa (Andr.)                      |  | 3 à 6 »     | glomerata                           |  | 1 »         | OXALIS Barrelieri (Linn.)             |  | 3 à 5 »    |
| species du Mexique à belles feuilles  |  |             | GOSYPIUM arboreum                   |  | 3 »         | Plumieri (Jacq.)                      |  | 3 à 6 »    |
| d'un vert foncé                       |  | 20 »        | GUZMANNIA tricolor (R. P.)          |  | 10 à 20 »   | POGOSTEMON patchouly                  |  | 2 »        |
| ERYTHROCHITON brasiliense (Nus.)      |  | 25 à 48 »   | HABROTHAMNUS elegans                |  | 2 »         | PANCRATIUM amœnum (Salisb.)           |  | 3 »        |
| EUGENIA Jambos (Linc.)                |  | 4 »         | HÆMANTHUS coccineus (Th.)           |  | 2 à 6 »     | Caribæum (L.)                         |  | 1 »        |
| EUPHORBIA Jacquinæfolia (H.) Euph.    |  |             | hyalocarpus                         |  | 6 »         | Guianense (Ker.)                      |  | 10 »       |
| fulgens (Karw.)                       |  | 1 »         | pubescens (Jacq.)                   |  | 2 à 6 »     | Illyricum?                            |  | 4 »        |
| Breoni (Hortul.)                      |  | 1 50        | tigrinus                            |  | 2 à 4 »     | speciosum (Salisb.)                   |  | 3 »        |
| canariensis (L.)                      |  | 2 »         | HARRA HIA speciosa (Jacq.)          |  | 1 50        | spec nov.                             |  | 5 »        |
| Caput Medusæ (L.)                     |  | 1 50        | HEDYCHIUM angustifolium (Roxb.)     |  | 3 »         | PELIOSANTHES Teta (Andr.)             |  | 2 »        |
| dendroides                            |  | 2 »         | coronarium (Kœn.)                   |  | 2 »         | PIPER ulmifolium                      |  | 2 »        |
| eliptica                              |  | 1 50        | Gardnerianum (Wall.)                |  | 2 50        | PISONIA aculeata                      |  | 4 à 8 »    |
| globosa (Sims)                        |  | 2 »         | HELICONIA Bihai (Willd.)            |  | 3 »         | PITCAIRNIA altense (L.)?              |  | 2 à 5 »    |
| lophogona (Lam.)                      |  | 5 »         | humilis (Jacq.)                     |  | 2 »         | intermedia (Hort.) P. furfuracea      |  |            |
| neriifolia (Linn.)                    |  | 2 »         | speciosa                            |  | 3 »         | (R. M.)                               |  | 5 »        |
| pulcherrima (Wil d.) Poinsettia pul-  |  |             | HELIOTROPIMUM grandiflorum (Schr.)  |  | 1 50        | melananthera?                         |  | 5 »        |
| cherrima                              |  | 2 »         | arborescens                         |  | 3 »         | punicea                               |  | 1 à 3 »    |
| punicea (Sw.)                         |  | 3 à 10 »    | peruvianum (L.)                     |  | 1 »         | Les 12 plantes                        |  | 12 »       |
| splendens (Bojer)                     |  | 2 à 5 »     | HEMISANDRA aurantiaca               |  | 8 à 15 »    | ringens. Nouvelle et magnif. plante   |  | 15 à 20 »  |
| EUSTREPHUS angustifolius (R. Br.)     |  | 1 »         | HIBISCUS insignis?                  |  | 1 50        | staminea (Sims.)                      |  | 2 »        |
| FIGUS australis (Willd.)              |  | 2 »         | rosa sinensis (L.)                  |  | 1 50        | suaveolens (Lindl.)                   |  | 3 »        |
| elastica (Roxb.)                      |  | 1 50 à 10 » | cup eo pleno                        |  | 2 »         | PLEROMA Benthamiana                   |  | 5 »        |
| feruginea (Hort.)                     |  | 2 »         | luteo pleno                         |  | 2 »         | PLUMBAGO cœrulea (Humb.)              |  | 2 »        |
| oppositifolia (Roxb.)                 |  | 2 »         | purpureo pleno                      |  | 2 »         | capensis (Th.)                        |  | 1 50       |
| repens (Roxb.)                        |  | 1 »         | mutabilis (Lin.)                    |  | 3 »         | PLUMIERA rubra                        |  | 4 »        |
| FOURCROYA longæva (Karw.) fort.       |  | 50 »        | pedunculatus (Thunb.)               |  | 4 »         | POINCIANA b juga (Lin.)?              |  | 4 »        |
| FRANCISCEA latifolia                  |  | 3 »         | speciosus                           |  | 3 »         | lutea?                                |  | 10 »       |
| Pohlana                               |  | 3 »         | JACARANDA filicifolia               |  | 3 à 8 »     | regia (Bojar)                         |  | 5 à 20 »   |
| uniflora                              |  | 1 à 3 »     | JASMINUM Azoricum                   |  | 1 à 3 »     | PONTEDERIA crassipes (Mart.)          |  | 1 50       |
| GALACTODENDRON speciosum?             |  | 4 »         | grandiflorum                        |  | 1 50 à 4 f. | POTHOS crassinervius (Jacq.)          |  | 3 à 6 »    |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>            | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>                | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>                 | <i>fr. c.</i> |
|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
| POTHOS cordatus (L.) . . . . .         | 1 »           | SOLANUM giganteum (Jacq.) . . . . .        | 4 »           | TALINUM triangulare (Willd.) . . . . .      | 1 »           |
| longifolius, Anthurium longif. (R.S.)  | 3 »           | quitense (N. B.) . . . . .                 | 4 »           | THEOPHRASTA americana . . . . .             | 15 à 25       |
| undulatus . . . . .                    | 2 »           | SPECIES DE L'HONDURAS à feuilles           |               | TILLANDSIA amœna (Link.) . . . . .          | 3 »           |
| POURRETIA pyramidata (H. B.) . . . . . | 5 à 10 »      | très-larges, épineuses sur les deux        |               | farinosa . . . . .                          | 6 »           |
| PUYA Altensteinii . . . . .            | 2 à 4 »       | faces, fruit grand, forme et couleur       |               | lanuginosa . . . . .                        | 5 »           |
| RENEALMIA grandiflora . . . . .        | 1 »           | d'une orange . . . . .                     | 10 »          | nigra . . . . .                             | 3 à 6 »       |
| RHEXIA spec. de la Chine . . . . .     | 5 »           | SOLANDRA grandiflora (Swartz) . . . . .    | 3 »           | pyramidalis . . . . .                       | 3 »           |
| RHODOSTOMA gardenioides . . . . .      | 2 à 5 »       | arborea? . . . . .                         | 4 »           | species du Brésil . . . . .                 | 5 »           |
| RONDELETIA speciosa (Hort.) . . . . .  | 3 à 10 »      | nitida (Zueg.) . . . . .                   | 5 »           | TRADESCANTIA discolor (Ait.) . . . . .      | 2 »           |
| RUELLIA azurea . . . . .               | 2 »           | SPIRONEMA fragrans . . . . .               | 2 »           | ZEBRINA, pour tapisser les murs des         |               |
| formosa (Andr.) . . . . .              | 1 50          | STEPHANOTIS floribunda . . . . .           | 3 à 6 »       | serres chaudes . . . . .                    | 1 50          |
| cristata (Andr.) . . . . .             | 1 50          | STERCULIA acerifolia (Cunningh.) . . . . . | 5 »           | VESALIA floribunda . . . . .                | 2 à 5 »       |
| lactea (Cav.) . . . . .                | 2 50          | platanifolia . . . . .                     | 6 »           | VINGA rosea (L.) . . . . .                  | 1 »           |
| varians (Vent.) . . . . .              | 2 »           | STRELITZIA augusta (Th.) . . . . .         | 50 à 100      | rosea fl. albo . . . . .                    | 1 »           |
| SACCHARUM officinarum (L.) . . . . .   | 2 »           | farinosa (Dryand.) . . . . .               | 25 à 50       | WACHENDORFIA thyrsiflora (Lin.) . . . . .   | 3 »           |
| SAPINDUS indicus (Poir.) . . . . .     | 5 »           | humilis (L.) . . . . .                     | 10 à 15       | XXLOPHYLLA falcata (W.) . . . . .           | 2 50          |
| Rarax (L.) . . . . .                   | 8 »           | imperialis . . . . .                       | 100 »         | arbuscula (W.) . . . . .                    | 2 50          |
| SCHOTIA latifolia (Jacq.) . . . . .    | 10 »          | junceæ, vera (Andr.) . . . . .             | 80 »          | pinnatifida . . . . .                       | 4 »           |
| speciosa (Jacq.) . . . . .             | 6 »           | reginæ (Ait.) . . . . .                    | 20 à 80       | YUCCA spec. de la Havanne . . . . .         | 20 »          |
| SINNINGIA guttata (Lindl.) . . . . .   | 2 à 4 »       | spathulata, vera . . . . .                 | 90 »          | Une collection de 25 plantes bien as-       |               |
| villosa (Lindl.) Gloxinia villosa      |               | STRYCHNOS spinosa (Lam.) . . . . .         | 4 à 5 »       | sorties à notre choix. Fine Samm-           |               |
| (Mart.) . . . . .                      | 2 à 4 »       | SWEETENIA Mahagoni . . . . .               | 15 à 30       | lung von 25 Sorten, gut assortirt . . . . . | 25 »          |
| SIPANEÆ carnea . . . . .               | 1 à 3 »       | TACCA phalifera Bojer . . . . .            | 10 à 15       | ZEPHYRANTHUS candida (Herb.) . . . . .      | 1 50          |
| SOLANUM argenteum (Dunal) . . . . .    | 2 »           | TALINUM lancifolium? . . . . .             | 1 »           | grandiflorus (Lindl.) . . . . .             | 1 50          |
| chloranthum (Spr.) . . . . .           | 2 »           | reflexum (Cav.) . . . . .                  | 1 »           |   |               |

## PLANTES DE SERRE TEMPEREE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kaltehaus- Pflanzen.

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>                  | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>       | <i>fr. c.</i> |
|--|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| ACACIA alata (DC.) . . . . .               | 1 »           | AGAVE americana . . . . .                    | 100 »         | ARISTOLELIA Maqui (Hérit.) Cornus |               |
| Berberiana (Spr.) . . . . .                | 1 à 3 »       | foliis variegatis, petit . . . . .           | 1 50          | chilensis Molin . . . . .         | 3 »           |
| biflora (R. Br.) A. hastulata? . . . . .   | 1 50          | moyenne . . . . .                            | 20 »          | ARDISIA japonica . . . . .        | 1 »           |
| chrysobotrya (Meis.) . . . . .             | 10 »          | foliis striatis . . . . .                    | 3 à 8 »       | ASTELIA Banksii . . . . .         | 1 »           |
| cuneata (Benth.) . . . . .                 | 2 »           | virginica (Linn.) . . . . .                  | 2 »           | ASTER moschatus? . . . . .        | 1 50          |
| cyanophylla (Reut.) Ac Swanriver           |               | AGONIS MARGINATA . . . . .                   | 4 »           | tomentosus (Schrad.) . . . . .    | 1 »           |
| (Hort.) . . . . .                          | 8 »           | ALOE arborescens (Mill.) . . . . .           | 3 à 30 »      |                                   |               |
| Cyclopis (Cunning.) . . . . .              | 2 »           | atrovirens (DC.) Haworthia atrovi-           |               | AZALEA INDICA (L.)                |               |
| dealbata (Link.) A. affinis (Sweet.)       |               | rens (Haw.) . . . . .                        | 2 »           | Rhododendron indicum (Sw.)        |               |
| Esterhazy . . . . .                        | 1 50          | magaritifera (Ait.) Haworthia mar-           |               | alba . . . . .                    | 1 à 3 »       |
| decipiens, A. dolabriformis (Colla.)       |               | garitifera (Haw.) . . . . .                  | 1 50          | semplena . . . . .                | 1 à 3 »       |
| decurrens (Willd.) . . . . .               | 1 à 2 »       | mitraeformis (Willd.) . . . . .              | 2 »           | Aitoni . . . . .                  | 2 »           |
| dodonæifolia (DC.) vi cosa (W.) . . . . .  | 1 »           | plicatilis? . . . . .                        | 2 »           | ardens superba . . . . .          | 2 »           |
| elata (Greh.) . . . . .                    | 10 »          | Radula (Jacq.) . . . . .                     | 1 50          | atrorubens . . . . .              | 1 50          |
| falcifolia . . . . .                       | 3 »           | spiralis (L.) Apicra spiralis (W.) . . . . . | 1 »           | augusta . . . . .                 | 1 à 2 »       |
| Farnesiana (Willd.) . . . . .              | 1 »           | triangularis (Lam.) . . . . .                | 1 »           | aurantiaca . . . . .              | 1 à 2 »       |
| floribunda (Willd.) . . . . .              | 1 »           | variegata (Lin.) . . . . .                   | 2 »           | grandiflora . . . . .             | 1 à 2 »       |
| frondosa (Willd.) . . . . .                | 4 »           | verrucosa (Ait.) Gasteria verrucosa          |               | splendens . . . . .               | 4 50          |
| glaucofolia . . . . .                      | 5 »           | (Haw.) . . . . .                             | 1 »           | bicolor . . . . .                 | 1 à 3 »       |
| heterophylla . . . . .                     | 3 »           | virens (Haw.) . . . . .                      | 1 50          | candida . . . . .                 | 1 »           |
| juniperina (DC.) Ulicifolia (W.) . . . . . | 1 »           | vulgaris (Lam.) . . . . .                    | 1 »           | candidissima . . . . .            | 1 50          |
| latifolia (Desf.) . . . . .                | 1 50          | ALSTROEMERIA acutifolia (L. et O.) . . . . . | 2 »           | coccinea speciosa . . . . .       | 1 à 2 »       |
| linearis (B. M.) . . . . .                 | 1 50          | aurea (Gr.) . . . . .                        | 2 »           | superba . . . . .                 | 1 »           |
| linifolia (Willd.) . . . . .               | 2 »           | Betamea . . . . .                            | 2 50          | cœrulescens . . . . .             | 1 à 2 »       |
| longifolia (Willd.) . . . . .              | 1 »           | DU CHILI, en plusieurs variétés . . . . .    | 3 »           | Crimson . . . . .                 | 1 à 2 »       |
| longissima (Wendl.) . . . . .              | 2 »           | Pelegria (L.) . . . . .                      | 1 50          | Cunninghami . . . . .             | 1 à 2 »       |
| glauca . . . . .                           | 10 »          | psittacina (Lehm.) . . . . .                 | 1 50          | Danielsi . . . . .                | 1 à 5 »       |
| Lophantha (Willd.) . . . . .               | 1 à 4 »       | AMICIA Zygomeres (DC.) . . . . .             | 1 à 2 »       | Dark Crimson . . . . .            | 1 à 3 »       |
| lunata nova . . . . .                      | 4 »           | ANAGALLIS carnea grandiflora . . . . .       | 1 »           | purple . . . . .                  | 1 à 3 »       |
| marginata (R. Br.) . . . . .               | 1 50          | elegans . . . . .                            | » 50          | Esquisite . . . . .               | 4 »           |
| Melanoxylon (R. Br.) . . . . .             | 1 50          | speciosa . . . . .                           | 2 »           | floribunda . . . . .              | 2 »           |
| mucronulata (Mak.) . . . . .               | 3 »           | ANDROMEDA buxifolia (P. S.) Agarist          |               | Foordi . . . . .                  | 2 »           |
| Neumannii? nova . . . . .                  | 5 »           | buxifolia (Don.) . . . . .                   | 1 50          | Georgiana . . . . .               | 3 »           |
| paradoxa (DC.) . . . . .                   | 2 »           | tetragona (Lin.) . . . . .                   | 4 »           | grandiflora . . . . .             | 1 50 à 2f.    |
| pinifolia (Hortul.) . . . . .              | 1 50          | ANIGOZANTHUS Lindenii . . . . .              | 6 »           | pallida . . . . .                 | 1 50          |
| glauca? an spec nova Swanriver.            |               | AMARYLLIS belladonna (L.) . . . . .          | 2 »           | Hibbertii . . . . .               | 1 à 2 »       |
| platyptera . . . . .                       | 2 à 6 »       | ARALIA crassifolia . . . . .                 | 18 à 40       | Hookeri . . . . .                 | 1 50          |
| prostrata (Lodd.) Diffusa (Ker.) . . . . . | 2 à 6 »       | pinnata . . . . .                            | 25 à 45       | hybrida . . . . .                 | 1 à 2 »       |
| pubescens . . . . .                        | 3 »           | Schefferia . . . . .                         | 20 à 40       | insignis pleno . . . . .          | 2 »           |
| pulchella (R. Br.) . . . . .               | 2 »           | ARAUCARIA brasiliensis (Lamb.) . . . . .     | 3 à 40 »      | Jenneri . . . . .                 | 3 »           |
| speciosa nova . . . . .                    | 10 »          | Plantes de graines de 30 centi-              |               | lacteola superba . . . . .        | 2 »           |
| robusta? . . . . .                         | 4 »           | mètres . . . . .                             | 10 »          | lateritia . . . . .               | 2 »           |
| suaveolens (Willd.) . . . . .              | 2 »           | Cunninghami (Steud.) boutures . . . . .      | 20 »          | large pink . . . . .              | 1 50 à 3f.    |
| subcœrulea (B. M.) . . . . .               | 10 »          | excelsa (Ait.) boutures . . . . .            | 12 »          | light pink . . . . .              | 2 »           |
| truncata (Hortul.) . . . . .               | 2 »           | de graines . . . . .                         | 100 à 200     | crimson . . . . .                 | 1 à 3 »       |
| verticillata (Willd.) . . . . .            | 2 »           | imbricata Bav. de graines . . . . .          | 3 à 20 »      | purple . . . . .                  | 2 »           |
| vestita (R. Br.) . . . . .                 | 2 à 4 »       | ABRUTUS Andrachne (Willd.) . . . . .         | 1 »           | lilacina aurantiaca . . . . .     | 1 50          |
| AGMENA floribunda (DC.) . . . . .          | 1 50          | canariensis (L.) . . . . .                   | 2 »           | superba . . . . .                 | 1 à 2 »       |
| AGAPANTHUS umbellatus (l'Hérit.) . . . . . | 1 50          | longifolia (Loid.) . . . . .                 | 3 »           | macrantha . . . . .               | 1 à 3 »       |
| foliis variegatis . . . . .                | 1 50          | Milleri (Don.) . . . . .                     | 4 »           | Mazeppa . . . . .                 | 1 à 2 »       |
| AGAVE Americana (Linn.) Petit . . . . .    | 1 50          | pilosa . . . . .                             | 4 »           | Nedersiana . . . . .              | 5 »           |
| moyenne force . . . . .                    | 20 »          | serratifolia (B. C.) . . . . .               | 3 »           | nerifolia rubra . . . . .         | 1 à 2 »       |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr. c.       |
|---|--------------|
| AZALEA indica neriifolia splendens . . . . .  | 1 50 à 2 fr. |
| new white . . . . .   | 1 50         |
| Orange pink . . . . .   | 2 »          |
| phœnicea grandiflora . . . . .  | 2 à 3 »      |
| prolifera . . . . .   | 2 »          |
| pulchella . . . . .   | 1 à 2 »      |
| pulcherrima pallida . . . . .   | 1 50         |
| verra . . . . .   | 2 à 3 »      |
| punicea . . . . .   | 1 50         |
| plena . . . . .   | 2 »          |
| purpurea nova . . . . .   | 2 à 5 »      |
| grandiflora . . . . .   | 2 à 3 »      |
| Rawsoni . . . . .   | 1 50         |
| rubra aurantiaca . . . . .  | 3 »          |
| Salmon . . . . .  | 1 50         |
| Skrimakerski . . . . .  | 1 50         |
| Smithii coccinea . . . . .  | 1 50         |
| elegans . . . . .   | 2 »          |
| speciosissima . . . . .   | 2 »          |
| splendens . . . . .   | 2 »          |
| superba plena . . . . .   | 2 à 4 »      |
| Thomasii . . . . .  | 1 à 2 »      |
| variegata . . . . .   | 3 »          |
| venusta . . . . .   | 3 »          |
| Victoria . . . . .  | 2 »          |
| violacea . . . . .  | 2 »          |
| superba . . . . .   | 2 »          |
| Wandesi . . . . .   | 1 50         |
| Wardi . . . . .   | 2 »          |
| white perfection . . . . .  | 2 »          |
| Woodforthii . . . . .   | 3 »          |
| Youngii . . . . .   | 3 »          |
| Rhododendroides . . . . .   | 3 »          |
| Sinensis . . . . .  | 2 à 4 »      |
| <i>Une collection de 24 variétés à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten nach unserer Wahl.</i>                                      |              |
|   | 18 »         |
| <i>Une collection d'Azalea indica, en 12 variétés, à notre choix. Eine Sammlung indischer Azaleen, in 12 Sorten, nach unserer Wahl.</i> |              |
|   | 9 »          |
| VARIÉTÉS EN MÉLANGE.  |              |
| Plantes de moyenne force, le 100.   | 50 »         |
| » fortes en boutons, »  | 70 »         |
| » très-fortes en boutons, »   | 100 »        |
| BÆGKEA camphorata (R. Br.) . . . . .  | 1 »          |
| BANKSIA australis (R. Br.) . . . . .  | 5 »          |
| collina (R. Br.) . . . . .  | 4 »          |
| compar . . . . .  | 15 à 25 »    |
| cuneifolia (Wendl.) . . . . .   | 5 »          |
| Cunninghami (Sieb.) . . . . .   | 4 »          |
| denticulata (DC.) . . . . .   | 4 »          |
| Dryandroides (Baxt.) . . . . .  | 15 à 25 »    |
| ericaefolia (L. F.) . . . . .   | 2 à 40 »     |
| foliosa . . . . .   | 18 à 25 »    |
| grandis (Willd.) . . . . .  | 8 à 40 »     |
| ilicifolia . . . . .  | 5 à 10 »     |
| integrifolia (L. F.) . . . . .  | 4 »          |
| latifolia (R. Br.) . . . . .  | 5 »          |
| littoralis (R. Br.) . . . . .   | 6 »          |
| marescens (R. Br.) . . . . .  | 4 »          |
| marginata (Cav.) . . . . .  | 6 »          |
| oblongifolia (Cav.) . . . . .   | 4 »          |
| paludosa (R. Br.) . . . . .   | 5 »          |
| præmorsa (Andr.) . . . . .  | 4 »          |
| serrata (L.) . . . . .  | 5 »          |
| speciosa (R. Br.) . . . . .   | 10 à 25 »    |
| spinulosa (Sm.) . . . . .   | 5 »          |
| verticillata (R. Br.) . . . . .   | 4 »          |
| BAUERA rubioides (And.) . . . . .   | 2 »          |
| BEAUFORTIA rotundifolia . . . . .   | 3 »          |
| splendens (Baxt.) . . . . .   | 1 50         |
| BERBERIS dealbata (Lind.) . . . . .   | 3 à 5 »      |
| tenuifolia (Lindl.) . . . . .   | 5 à 20 »     |
| trifoliata nova . . . . .   | 5 à 10 »     |
| BILLARDIERA fusiformis (Lab.) Sollya . . . . .  |              |
| heterophylla (Lindl.) . . . . .   | 1 50         |
| BONJEANA hirsuta (Reichb.) . . . . .  | 1 »          |
| BORONIA denticulata (Sm.) . . . . .   | 4 »          |
| alata (Sm.) . . . . .   | 2 »          |
| serulata (Sm.) . . . . .  | 3 »          |
| viminea . . . . .   | 2 »          |
| BOSSIA cinerea (R. Br.) . . . . .   | 3 »          |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                         | fr. c.   |
|---|----------|
| BOSSIA thymifolia (Hort.) . . . . .                 | 1 »      |
| BOUVARDIA strigulosa . . . . .                      | 1 à 1 50 |
| BRACHYSEMA latifolium (R. Br.) . . . . .            | 5 »      |
| platyptera. Pontania Celsania . . . . .             | 3 à 10 » |
| undulatum . . . . .                                 | 1 50     |
| BRUNIA imbricata (Wendl.) . . . . .                 | 2 »      |
| BRUNSWIGIA Josephina (Ker.) . . . . .               | 5 »      |
| forte plante . . . . .                              | 30 »     |
| BUDDLEIA globosa . . . . .                          | 2 »      |
| heterophylla (B. fleg.) . . . . .                   | 1 »      |
| Madagascariensis (Vahl.) . . . . .                  | 2 »      |
| BUMELIA tenax . . . . .                             | 1 »      |
| BURCHELLIA capensis (R. Br.) . . . . .              | 1 à 3 »  |
| CACALIA ficoides L. Kleinia ficoid. (DC.) . . . . . | 1 »      |
| Kleinii (L.) Kleinia neriifolia (DC.) . . . . .     | 1 »      |
| CALCEOLARIA belle Amélie . . . . .                  | 3 »      |
| bicolor . . . . .                                   | 1 »      |
| Comte de Langenstein . . . . .                      | 3 »      |
| Donkolmi . . . . .                                  | 2 »      |
| gloriosa . . . . .                                  | 1 »      |
| Ladies Flower . . . . .                             | 2 50     |
| Leonidas . . . . .                                  | 1 50     |
| picta . . . . .                                     | 2 »      |
| Maria . . . . .                                     | 2 »      |
| Milleri . . . . .                                   | 2 »      |
| Ochroleuca picta . . . . .                          | 3 »      |
| Royal Stantard . . . . .                            | 1 50     |
| rugosa (R. Br.) . . . . .                           | 1 »      |
| Schimperi . . . . .                                 | 3 »      |
| Sum Baw . . . . .                                   | 1 50     |
| superbissima . . . . .                              | 1 50     |
| Topaz . . . . .                                     | 1 »      |
| purpurea . . . . .                                  | 1 »      |
| violacea superba . . . . .                          | 1 »      |
| CALLICOMA serratifolia (Spr.) . . . . .             | 3 »      |
| CALLISTACHYS Drummondii . . . . .                   | 5 »      |
| lanceolata (Vent.) . . . . .                        | 1 »      |
| linearis . . . . .                                  | 1 »      |
| ovata (Sims.) . . . . .                             | 1 50     |
| elliptica (Vent.) . . . . .                         | 1 50     |
| CALOTHAMNUS Baxteri . . . . .                       | 4 »      |
| clavata (M.) . . . . .                              | 1 50     |
| longissima (Hort.) . . . . .                        | 3 »      |
| quadrifida (R. Br.) . . . . .                       | 2 »      |
| Shoenophylla nova spec. . . . .                     | 5 »      |
| villosa (R. Br.) . . . . .                          | 1 50     |
| species nova Swan River . . . . .                   | 30 »     |

# CAMELLIA.

Nous accordons une remise de 10 % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 % pour celles dépassant 100 fr. Es wird eine Remise nachgelassen von 10 % von jeder Bestellung die sich über 50 Fr. beläuft; von 15 % von jeder die sich auf mehr als 100 Fr. beläuft.

Nous offrons en outre, à notre choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 ans. Ferner, nach unserer Wahl, geben wir ab: 12 Sorten 2jährige Zweige 20 var. de Camellias greffés de 2 ans 20 Sorten 2jährige Zweige. 40 var. de Camellias greffés de 2 ans. 40 Sorten 2jährige Zweige. 100 » Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten. 220 »

Pour les plantes en boutons, on paie-  
ra un cinquième en sus. Für mit Knospen  
versehene Pflanzen wird ein Fünftel mehr  
bezahlt.

Camellias simples pour la greffe, de la  
force d'un tuyau de plume, le 100.  
Einfache Camellien zum Zweigen, von der  
Stärke eines Federtiels, das 100. 85 »

Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls klei-  
nere, das 100. 70 »

Nous possédons en outre de belles  
pyramides et hautes tiges (celles mar-  
quées d'un \*), pour le prix desquelles  
on s'entendra par correspondance avec  
les amateurs. Wir besitzen eine Anzahl  
schöne große Pyramiden und hochstämmige  
Camellien (die mit \* bezeichnet), über besser  
Preis wir uns schriftlich mit den Liebhabern  
verstehen werden.

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                         | fr. c.  |
|---|---------|
| CAMELLIA axillaris (A. B.) . . . . .                | 3 à 4 » |
| Euryoides (A. B.) . . . . .                         | 1 3 »   |
| rosea . . . . .                                     | 1 3 »   |
| japonica alba fenestralis . . . . .                 | 3 6 »   |
| alba plena (A. B.) . . . . .                        | 1 3 »   |
| Acidalia (F. B.), nova . . . . .                    | 1 3 »   |
| admirabilis . . . . .                               | 2 3 »   |
| agenorea . . . . .                                  | 3 8 »   |
| Aglæ (conchiflora) (A. B.) . . . . .                | 2 3 »   |
| * alba aurata . . . . .                             | 3 4 »   |
| lutescens (A. B.) . . . . .                         | 2 3 »   |
| Alexandre-le-Grand . . . . .                        | 2 8 »   |
| Allioni . . . . .                                   | 2 3 »   |
| althœflora . . . . .                                | 2 3 »   |
| amabilis (A. B.) . . . . .                          | 3 4 »   |
| Amanda (Angresia) . . . . .                         | 4 6 »   |
| amœna . . . . .                                     | 3 4 »   |
| anemoneflora alba (A. B.) . . . . .                 | 2 3 »   |
| * mutabilis . . . . .                               | » 3 »   |
| * rosea (A. B.) . . . . .                           | 2 3 »   |
| * rubra . . . . .                                   | 2 3 »   |
| * striata . . . . .                                 | 2 3 »   |
| * APOLLO, nouvelle d'Italie . . . . .               | 3 15 »  |
| argentea plena . . . . .                            | 2 4 »   |
| ardens superba . . . . .                            | 3 4 »   |
| atra-Warratah nova . . . . .                        | 2 4 »   |
| * aurantiaca nova . . . . .                         | 3 4 »   |
| * Baggroni . . . . .                                | 3 4 »   |
| * Basnebiana . . . . .                              | 3 4 »   |
| * Baumanniana (A. B.) . . . . .                     | 2 3 »   |
| Beali Palmers, Beali, Leeana su-<br>perbe . . . . . | 3 4 »   |
| Bedforthii (Whithini) . . . . .                     | 2 4 »   |
| * Bellina . . . . .                                 | 3 4 »   |
| Berleziana (A. B.) . . . . .                        | » 3 »   |
| * Bianchi . . . . .                                 | 2 4 »   |
| * bicolor . . . . .                                 | 3 6 »   |
| * Blaw . . . . .                                    | 3 4 »   |
| Brochi . . . . .                                    | » 2 »   |
| * Browni . . . . .                                  | » 3 »   |
| Bucklyana (A. B.) . . . . .                         | 2 3 »   |
| CALCIALI, nouvelle d'Italie . . . . .               | 10 30 » |
| CAMPOMOLENTINA . . . . .                            | 5 20 »  |
| candidissima . . . . .                              | 2 3 »   |
| Candolleana . . . . .                               | 2 5 »   |
| CANOVA . . . . .                                    | » 10 »  |
| Cardinalis . . . . .                                | 3 4 »   |
| carnea plena (A. B.) . . . . .                      | 2 4 »   |
| * Caracioli (F. B.) . . . . .                       | 6 7 »   |
| Carlvelliana . . . . .                              | 2 4 »   |
| * Casoretti . . . . .                               | » 5 »   |
| Chandleri (A. B.) . . . . .                         | 2 5 »   |
| China (A. B.) Reves nova . . . . .                  | 2 6 »   |
| Claritas . . . . .                                  | » 2 »   |
| Cliveana (A. B.) . . . . .                          | 2 5 »   |
| * Climene (belle), F. R. . . . .                    | 2 3 »   |
| * coccinea plena . . . . .                          | » 3 »   |
| colorata striata . . . . .                          | » 4 »   |
| Colvilli . . . . .                                  | » 2 »   |
| Columbo . . . . .                                   | 3 5 »   |
| * conchiflora (Ag'laé) . . . . .                    | 2 3 »   |
| conspicua . . . . .                                 | 2 3 »   |
| corallina (A. B.) . . . . .                         | 2 5 »   |
| coronatiflora . . . . .                             | » 3 »   |
| Covanni . . . . .                                   | » 8 »   |
| Crimson perfection . . . . .                        | 2 6 »   |
| cruciata . . . . .                                  | » 6 »   |
| Dalleni . . . . .                                   | 2 5 »   |
| Dallisch . . . . .                                  | » 5 »   |
| DARIO . . . . .                                     | 5 10 »  |
| decora . . . . .                                    | 2 5 »   |
| DELAIRI . . . . .                                   | 20 50 » |
| delecta . . . . .                                   | 2 3 »   |
| * delicatissima . . . . .                           | 2 4 »   |
| DENOTARIS . . . . .                                 | » 30 »  |
| depressa . . . . .                                  | 2 3 »   |
| Derbyana . . . . .                                  | 2 5 »   |
| * Diana . . . . .                                   | 4 6 »   |
| Diadematiflora . . . . .                            | » 2 »   |
| Diva Maria . . . . .                                | » 5 »   |
| Donckelari (A. B.) . . . . .                        | 2 5 »   |
| Dorsetti . . . . .                                  | » 2 »   |
| * Drummondii . . . . .                              | 2 4 »   |
| Duchezza Litta . . . . .                            | 6 7 »   |



| La pièce. Das Stück.                |    | fr. | c. | La pièce. Das Stück.                   |    | fr. | c. | La pièce. Das Stück.                |      | fr.    | c. |
|-------------------------------------|----|-----|----|--|----|-----|----|-------------------------------------|------|--------|----|
| CAMELLIA jap. Duchesse de Nemours . | »  | 2   | »  | * CAMELLIA jap. Maria Dorothea (F. B.) | 2  | 3   | »  | * CAMELLIA japonica Rubioïdes . . . | 2    | 4      | »  |
| Dunlaps americana . . . . .         | »  | 10  | »  | MARIE PADILLA, nouvelle d'I-           |    |     |    | * rubra maxima . . . . .            | 2    | 3      | »  |
| Dux Litta . . . . .                 | »  | 25  | »  | talie . . . . .                        | 3  | 10  | »  | * plena (A. B.) . . . . .           | 2    | 3      | »  |
| Eclipse ou Pressi, Prestons Eclip-  |    |     |    | * marmorata (A. B.) . . . . .          | 2  | 3   | »  | * rubricaulis variegata . . . . .   | 3    | 4      | »  |
| se (Regina Gallorum) . . . . .      | 2  | 3   | »  | Marshall Wilder's aurora (F. B.)       | 2  | 3   | »  | * Saccoi . . . . .                  | »    | 4      | »  |
| * elegantissima (A. B.) . . . . .   | 2  | 4   | »  | Martha . . . . .                       | 10 | 20  | »  | limatensis . . . . .                | 3    | 8      | »  |
| Elise Reck . . . . .                | »  | 3   | »  | Melinetti . . . . .                    | »  | 2   | »  | * SARAH FROST, d'Amérique,          | »    | 10     | »  |
| Eleonore Camphell . . . . .         | 2  | 5   | »  | Melissa . . . . .                      | »  | 5   | »  | Scottiana . . . . .                 | 2    | 3      | »  |
| Elisabeth imperiale . . . . .       | 2  | 4   | »  | Merilli . . . . .                      | »  | 5   | »  | Scherwoodi . . . . .                | 3    | 5      | »  |
| * Elphinstonii (A. B.) . . . . .    | 2  | 3   | »  | Micantica . . . . .                    | »  | 4   | »  | * sericea . . . . .                 | 2    | 3      | »  |
| Empereur d'Autriche . . . . .       | 15 | 20  | »  | Milleri . . . . .                      | 3  | 6   | »  | * Sieboldii (imbricat. tricol.) .   | 3    | 4      | »  |
| * Epsomiana . . . . .               | »  | 2   | »  | mira . . . . .                         | 2  | 3   | »  | * Simsia . . . . .                  | 3    | 4      | »  |
| * excelsa (A. B.) . . . . .         | 3  | 4   | »  | monstrosa . . . . .                    | 3  | 4   | »  | * Sinica . . . . .                  | »    | 3      | »  |
| eximia (vera) (A. B.) . . . . .     | 2  | 4   | »  | * Monti . . . . .                      | 2  | 4   | »  | Smith's grandiflora . . . . .       | 2    | 4      | »  |
| Fastuosa . . . . .                  | 3  | 8   | »  | Montironi . . . . .                    | »  | 3   | »  | Soulangeana . . . . .               | 2    | 3      | »  |
| Favre Henri . . . . .               | 3  | 4   | »  | * mutabilis, Traversi (A. B.) .        | 3  | 5   | »  | speciosa . . . . .                  | 2    | 4      | »  |
| Feastü (M. Wilder's) . . . . .      | 40 | 60  | »  | MUZIANA, nouveau de semis,             |    |     |    | Spofortia . . . . .                 | 3    | 6      | »  |
| fimbriata alba plena . . . . .      | 2  | 3   | »  | superbe . . . . .                      | »  | 40  | »  | sterilis . . . . .                  | 1 50 | à 3 f. |    |
| rubra . . . . .                     | 4  | 6   | »  | myrtifolia (A. B.) . . . . .           | 2  | 4   | »  | striata . . . . .                   | 3    | à 4    | »  |
| * Fintelmanni . . . . .             | »  | 2   | »  | Napiniana? . . . . .                   | 5  | 8   | »  | superba (A. B.) . . . . .           | 3    | 4      | »  |
| flammea (A. B.) . . . . .           | 2  | 4   | »  | Napoléon . . . . .                     | »  | 6   | »  | superbissima grandissima . .        | 2    | 5      | »  |
| flammeola superba . . . . .         | »  | 2   | »  | Nassiniana . . . . .                   | 2  | 3   | »  | supina . . . . .                    | 2    | 4      | »  |
| flavesceus (alb. lutescens) . . .   | 2  | 4   | »  | NEOBORACENSIS, nouvelle                |    |     |    | Susannah . . . . .                  | 2    | 5      | »  |
| florida rosea . . . . .             | 2  | 4   | »  | d'Amérique . . . . .                   | 5  | 10  | »  | Sweetiana (A. B.) . . . . .         | 2    | 5      | »  |
| * Floyi. Grand Frédéric . . . .     | »  | 4   | »  | new-imported (A. B.) China .           | 2  | 3   | »  | * Taylori . . . . .                 | 3    | 5      | »  |
| Fordii . . . . .                    | »  | 4   | »  | nivea . . . . .                        |    |     |    | * Theresiana (A. B.) . . . . .      | 2    | 5      | »  |
| formosa (A. B.), formosissima .     | 3  | 4   | »  | Noacki, nouveau semis superbe .        | »  | 20  | »  | Teutonia . . . . .                  | 4    | 10     | »  |
| * Francofurtensis. Wellingtoni      | 2  | 3   | »  | * nobilissima (A. B.) Waddi (A. R.)    | 2  | 3   | »  | * Traversi mutabilis . . . . .      | 3    | 5      | »  |
| fulgentissima . . . . .             | 3  | 5   | »  | Norma . . . . .                        | »  | 10  | »  | * Triphosa lactea (F. B.) . . .     | 2    | 4      | »  |
| Fulling, Reawesi, Rozeanum .        | 2  | 4   | »  | ochroleuca . . . . .                   | »  | 4   | »  | * triumphans . . . . .              | 3    | 4      | »  |
| gallica alba (A. B.) . . . . .      | 2  | 4   | »  | Omboni . . . . .                       | »  | 5   | »  | Turnbulli . . . . .                 | 3    | 6      | »  |
| général Zighsi . . . . .            | 6  | 8   | »  | Orlando . . . . .                      | 4  | 5   | »  | * variegata chinensis . . . . .     | 3    | 6      | »  |
| GERANDOI, nouvelle blanche,         |    |     |    | * ornata (A. B.) . . . . .             | 2  | 3   | »  | * plena (A. B.) . . . . .           | 2    | 3      | »  |
| forme très-régulière, fleur très-   |    |     |    | Oudiniana . . . . .                    | 6  | 10  | »  | * venasta (A. B.) . . . . .         | 2    | 4      | »  |
| grande . . . . .                    | »  | 50  | »  | Ourselli . . . . .                     | 5  | 10  | »  | * verecunda . . . . .               | 6    | 10     | »  |
| * Ghittina . . . . .                | 3  | 5   | »  | Oxoniensis (A. B.) . . . . .           | 2  | 3   | »  | * versicolor variegata . . . .      | 3    | 4      | »  |
| * gigantea (A. B.) . . . . .        | 2  | 3   | »  | pæoniflora rosea (A. B.) . . . .       | 2  | 3   | »  | atroviolacea . . . . .              | »    | 5      | »  |
| Gioja . . . . .                     | »  | 4   | »  | pallida nova . . . . .                 | 3  | 4   | »  | Vesuvio . . . . .                   | 2    | 6      | »  |
| * Gillesii (Nancy Dawton) . . .     | 2  | 3   | »  | * Palmer's perfection . . . . .        | 3  | 4   | »  | Victor Hugo . . . . .               | »    | 7      | »  |
| * gloria mundi . . . . .            | 2  | 3   | »  | rosea . . . . .                        | 2  | 3   | »  | Victoria Antverbiensis . . .        | »    | 3      | »  |
| Goussoni . . . . .                  | »  | 3   | »  | Parmentieri nivea . . . . .            | 3  | 5   | »  | * virginica . . . . .               | 5    | 6      | »  |
| Gozzi . . . . .                     | »  | 5   | 8  | Park's striped (Parksii) . . . .       | 2  | 3   | »  | * Wardii . . . . .                  | 2    | 3      | »  |
| GREISSI nova . . . . .              | 4  | 10  | »  | Partheniana . . . . .                  | »  | 4   | »  | WASHINGTONIANA, nouvelle            |      |        |    |
| superba . . . . .                   | »  | 3   | »  | * Pawhattow . . . . .                  | 5  | 20  | »  | d'Amérique . . . . .                | 8    | 15     | »  |
| * Graya nova (A. B.) . . . . .      | 3  | 6   | »  | Pawlikowski rosea . . . . .            | 2  | 3   | »  | * Watsoniana . . . . .              | 2    | 3      | »  |
| * Griffini . . . . .                | 3  | 4   | »  | perceya (A. B.) . . . . .              | 2  | 3   | »  | Welbanksiana heptangularis .        | 3    | 4      | »  |
| Grunelli . . . . .                  | 2  | 3   | »  | Peregalli . . . . .                    | »  | 5   | »  | * Weymariana . . . . .              | 2    | 3      | »  |
| Harrissonia . . . . .               | »  | 3   | »  | Pénélope . . . . .                     | »  | 5   | »  | Wilmorgiana . . . . .               | 3    | 4      | »  |
| Haylocki (Lokarl) . . . . .         | 2  | 3   | »  | * PERCYVALII, nouvelle d'Amé-          |    |     |    | * Wirkafled . . . . .               | 4    | 10     | »  |
| heptangularis . . . . .             | 2  | 4   | »  | rique . . . . .                        | 5  | 10  | »  | * Woodsii (A. B.) . . . . .         | 3    | 6      | »  |
| Hebertii (A. B.) . . . . .          | 2  | 4   | »  | perfecta carminea . . . . .            | »  | 3   | »  | Zucchi (général) . . . . .          |      |        |    |
| Henchmannii (A. B.) . . . . .       | »  | 2   | »  | Persleys victoria, queen Victoria      | 5  | 10  | »  | * Kissi (DC.) . . . . .             | »    | 2      | »  |
| Henry Favre . . . . .               | 2  | 5   | »  | picturata (A. B.) . . . . .            | 2  | 3   | »  | Sassangua rosea plena . . . .       | 2    | 3      | »  |
| * hexangularis . . . . .            | 2  | 3   | »  | Pyroleana . . . . .                    | 4  | 8   | »  | * nepalensis . . . . .              | »    | 4      | »  |
| hibiscus . . . . .                  | »  | 3   | »  | Pomponia alba . . . . .                | 2  | 3   | »  | * oleifera (Abel) . . . . .         | 2    | 3      | »  |
| humilis . . . . .                   | »  | 4   | »  | * rosea . . . . .                      | 2  | 3   | »  | * latifolia . . . . .               | 2    | 3      | »  |
| imbricata (A. B.) . . . . .         | 2  | 3   | »  | præcellentissima (A. B.) . . . .       | 4  | 5   | »  | * reticulata (Lindl.) . . . . .     | 4    | 6      | »  |
| albo pleno (A. B.), triumphans      |    |     |    | PRATOMOLENTINA . . . . .               | »  | 20  | »  | Thea Bohea . . . . .                | 2    | 3      | »  |
| albo, albo picto . . . . .          | 2  | 3   | »  | Preston Eclipse (A. B.) . . . .        | 2  | 3   | »  | camellioides . . . . .              | »    | 3      | »  |
| imbricata spiralis . . . . .        | 4  | 5   | »  | Prince d'Orange . . . . .              | 3  | 5   | »  | sassangua . . . . .                 | »    | 3      | »  |
| impérialis . . . . .                | »  | 4   | »  | Princesse Amélie . . . . .             | 3  | 5   | »  | viridis (Green Thea) . . . . .      | 2    | 4      | »  |
| * incarnata . . . . .               | 2  | 3   | »  | Bacciochi . . . . .                    | »  | 10  | »  | CAMPANULA Barkeri? . . . . .        | 1    | »      | »  |
| insignis albo (A. B.) . . . . .     | »  | 4   | »  | pulcherrima striata . . . . .          | 3  | 5   | »  | fragilis Cyril . . . . .            | 1    | »      | »  |
| involuta (myrtifolia) . . . . .     | 2  | 3   | »  | pulchra . . . . .                      | 3  | 4   | »  | laciniata (Lin.) . . . . .          | »    | 1      | »  |
| JAHNII . . . . .                    | »  | 20  | »  | Pulesia . . . . .                      | 2  | 4   | »  | CANDOLLEA cuneiformis (Labill.)     | 1    | »      |    |
| Kentii . . . . .                    | »  | 4   | »  | punctata major (invincible) .          | 2  | 3   | »  | Cunninghami . . . . .               | 2    | »      |    |
| Kings royale, Clussi (A. B.) . .    | »  | 3   | »  | Queen Victoria . . . . .               | 3  | 10  | »  | CASSIOPE tetragona (G. Don.)        |      |        |    |
| * Kookia . . . . .                  | 2  | 4   | »  | * RADAELLII . . . . .                  | 10 | 20  | »  | meda tetragona . . . . .            | 4    | »      |    |
| Lamberti . . . . .                  | »  | 4   | »  | * Regina Gallorum . . . . .            | 2  | 3   | »  | CASUARINA lateriflora (Lam.) .      | 2    | »      |    |
| Lechit . . . . .                    | »  | 4   | »  | * Regina (Kings.) . . . . .            | 3  | 6   | »  | nana (Sieber.) . . . . .            | 3    | »      |    |
| Leeana superba (A. B.) . . . . .    | 3  | 4   | »  | Reignieri . . . . .                    | 3  | 4   | »  | stricta (Willd) . . . . .           | 2    | »      |    |
| * Lechiana nova . . . . .           | »  | 4   | »  | Revini . . . . .                       | 2  | 3   | »  | species nova . . . . .              | 10   | »      |    |
| Lemairi . . . . .                   | 3  | 4   | »  | Richardii . . . . .                    | 2  | 3   | »  | CEANOTUS azureus (Desf.) . . .      | 2    | »      |    |
| Leopoldina . . . . .                | »  | 4   | »  | * Rives nova (China) . . . . .         | 2  | 3   | »  | CELASTRUS buxifolia . . . . .       | 1 50 |        |    |
| Lefevriana . . . . .                | 3  | 6   | »  | Rolleni (pulcherrima) . . . . .        | 2  | 3   | »  | edulis . . . . .                    | 2    | »      |    |
| L'infanto . . . . .                 | »  | 4   | »  | Rollisoni (A. B.) . . . . .            | 2  | 4   | »  | CELSIA grandiflora (Hort) . . .     | 1 50 |        |    |
| Loudon . . . . .                    | 4  | 10  | »  | Rosa pictorum . . . . .                | 3  | 4   | »  | CERATONIA siliqua (L.) . . . .      | 1 50 |        |    |
| * lucida (A. B.) . . . . .          | 3  | 4   | »  | Rose Agathe . . . . .                  | 5  | 10  | »  | CESTRUM grandiflorum (Hort) .       | 1 50 |        |    |
| Macdonaldi . . . . .                | »  | »   | »  | rosæflora . . . . .                    | 2  | 3   | »  | roseum (H. B.) . . . . .            | 1 50 |        |    |
| maliflora. Sasangua roseo plena,    |    |     |    | Rosamundi . . . . .                    | 4  | 5   | »  | CHMÆROSTEMUM polyanthus? . .        | 1    | »      |    |
| multiflora . . . . .                | 2  | 3   | »  | Rossi . . . . .                        | »  | 2   | »  | CHASMONE Andrewsiana (E. M.)        | 1    | »      |    |
| Manotti . . . . .                   | 2  | 4   | »  | Rosli (Rawsiani) . . . . .             | 2  | 3   | »  | CHIRONIA jasminoides (L.) . . .     | 1 50 |        |    |
| Manzoni . . . . .                   | 3  | 5   | »  | Rouvroy . . . . .                      | »  | »   | »  | linoides (L.) . . . . .             | 1    | »      |    |
| Maometti . . . . .                  | 2  | 4   | »  | rubicunda . . . . .                    | »  | 3   | »  | trinervis (Lin.) . . . . .          | 1 50 |        |    |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>                | fr. c.  | <i>La pièce. Das Stück.</i>                     | fr. c.   | <i>La pièce. Das Stück.</i>                   | fr. c.   |
|--|---------|---|----------|---|----------|
| CINERARIA Amethysyte . . . . .             | 1 »     | CITRUS Limon. striatum foliis varieg. .         | 3 »      | DROSMA formosa . . . . .                      | 2 »      |
| beauté tendre . . . . .                    | 1 50    | stricta C. buxifolia . . . . .                  | 2 »      | fragrans . . . . .                            | 2 »      |
| blanda . . . . .                           | 1 50    | trifoliata . . . . .                            | 3 »      | grandiflora . . . . .                         | 2 »      |
| Canlus . . . . .                           | 1 »     | <i>Une collection de 25 variétés diverses,</i>  |          | purpurea (Hort.) . . . . .                    | 1 50     |
| celestina . . . . .                        | 1 »     | <i>à notre choix. Eine Sammlung von 25</i>      |          | rubra. <i>Agathosma rubra</i> (W.) . .        | 1 à 2 »  |
| Chandleri . . . . .                        | 1 50    | <i>verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.</i> | 30 »     | umbellata (W.) . . . . .                      | 2 »      |
| David superbe . . . . .                    | 1 »     | <i>20 variétés en greffes de 2 ans, au</i>      |          | uniflora (Schrud.) . . . . .                  | 1 à 3 »  |
| formosa . . . . .                          | 1 »     | <i>choix des amateurs. 20 Sorten 2jäh-</i>      |          | DIPTOLENA Dampierii . . . . .                 | 4 »      |
| Green's (Ring.) . . . . .                  | 1 »     | <i>riger Stämme, nach der Wahl der Lieb-</i>    |          | DODONEA pinnata (Sm.) . . . . .               | 2 à 4 »  |
| impérial bleu . . . . .                    | 1 50    | <i>haber . . . . .</i>                          | 40 »     | DOMBEYA Erythroxylon (Willd.). <i>Mel-</i>    |          |
| inwoodia . . . . .                         | 1 »     | CHIRITA chinensis . . . . .                     | 8 à 10 » | <i>hania Erythroxylon . . . . .</i>           | 3 »      |
| King . . . . .                             | 1 »     | CLETHRA arborea (Ait.) . . . . .                | 1 50     | DORIANTHES excelsa (R. B.), <i>très-fort.</i> | 60 »     |
| magica . . . . .                           | 1 50    | foliis variegatis . . . . .                     | 1 50     | DROEMANDRA floribunda . . . . .               | 1 »      |
| Showeana . . . . .                         | 1 50    | maderiensis (Hort.) . . . . .                   | 3 »      | DRYANDRA floribunda (R. Br.) . . .            | 10 »     |
| splendita . . . . .                        | 2 »     | mexicana . . . . .                              | 3 »      | formosa (R. Br.) . . . . .                    | 20 »     |
| urania . . . . .                           | 1 50    | CLIANTHUS puniceus (Soland.) . . .              | 1 à 3 »  | longifolia (R. Br.) . . . . .                 | 20 »     |
| Waterhousiana . . . . .                    | 1 »     | CLUTIA berberifolia . . . . .                   | 2 50     | nervosa (R. Br.) . . . . .                    | 25 »     |
| Youngii . . . . .                          | 1 »     | CORREA alba (DC.) . . . . .                     | 1 »      | nivea (R. Br.) . . . . .                      | 10 »     |
| CHORIZEMA ilicifolium (Labill.) . .        | 1 »     | <i>Jeunes plantes propres à la greffe.</i>      |          | tenuifolia (R. Br.) . . . . .                 | 15 »     |
| varium . . . . .                           | 1 50    | <i>Junge Pflanzen zur Vermehrung</i>            |          | EDWARDSIA grandiflora (Salisb.) . .           | 1 à 3 »  |
| <i>novum.</i> . . . . .                    | 3 »     | <i>tauglich, 12 plavtes . . . . .</i>           | 6 »      | microphylla . . . . .                         | 2 50     |
| CITRUS aurantiacum chin. longifol.         | 3 »     | Alexandrina . . . . .                           | 7 »      | ELICHRYSUM argenteum (Th.) . . .              | 2 »      |
| nobilis, Or. douce . . . . .               | 2 à 8 » | bicolor . . . . .                               | 1 50     | fulgidum (Willd.) . . . . .                   | 1 50     |
| digitatum (Ris.) . . . . .                 | 2 »     | glomerata . . . . .                             | 4 à 6 »  | proliferum. <i>Phænocoma proliferum</i>       |          |
| latifolia foliis variegatis . . . .        | 2 »     | Grevillii . . . . .                             | 1 »      | (Don.) . . . . .                              | 1 à 3 »  |
| longifolia variegatis . . . . .            | 2 »     | Harrisoni . . . . .                             | 2 à 4 »  | retortum (W.) . . . . .                       | 1 50     |
| lunatum (Ris.), Or. turc. . . . .          | 2 50    | longiflora . . . . .                            | 1 à 4 »  | sesamoides (W.) . . . . .                     | 2 »      |
| mandarina, C. sinensis . . . . .           | 2 à 4 » | quadrangularis . . . . .                        | 1 à 4 »  | spectabile . . . . .                          | 2 »      |
| mandarina minor . . . . .                  | 2 à 3 » | rosea multiflora . . . . .                      | 2 à 4 »  | EMBOTHRUM speciosissimum . . . .              | 10 à 50  |
| mandarina à feuilles de myrthe .           | 2 50    | rubra major . . . . .                           | 2 »      | ENKIANTHUS longifolius . . . . .              | 6 à 10 » |
| Marocco . . . . .                          | 2 »     | rufa (Gœrtn.) . . . . .                         | 1 »      | quinqueflorus (Lour.) . . . . .               | 3 à 12 » |
| Otahitense (Ris.) . . . . .                | 1 à 2 » | speciosa (Andr.) . . . . .                      | 1 à 2 »  | reticulatus . . . . .                         | 10 à 15  |
| Pomina rosa . . . . .                      | 2 »     | speciosissima . . . . .                         | 2 à 4 »  | undulatus . . . . .                           | 6 à 10 » |
| Portugal vaniglia . . . . .                | 2 »     | Slockwelliana . . . . .                         | 2 »      | EPACRIS amabilis . . . . .                    | 8 »      |
| prolifera dulcis . . . . .                 | 2 50    | viridiflora (Andr.) . . . . .                   | 1 à 2 »  | campanulata (Lodd.) . . . . .                 | 2 à 6 »  |
| rotundifolia . . . . .                     | 2 50    | CORONILLA glauca foliis variegatis .            | 1 50     | alba . . . . .                                | 5 »      |
| Senz agro . . . . .                        | 2 »     | grandiflora . . . . .                           | 2 »      | ciliata . . . . .                             | 1 »      |
| sacula . . . . .                           | 2 à 0 » | CRASSULA bicolor . . . . .                      | 1 »      | crassifolia . . . . .                         | 5 à 8 »  |
| Tangerin . . . . .                         | 3 »     | coccinea . . . . .                              | 1 »      | elegans . . . . .                             | 5 à 8 »  |
| Tipain . . . . .                           | 3 »     | lactea . . . . .                                | 1 »      | heteronema (Labill.) . . . . .                | 2 à 3 »  |
| anstralis . . . . .                        | 2 à 3 » | CRATÆGUS glabra . . . . .                       | 1 50     | grandiflora (Sm.) . . . . .                   | 2 »      |
| Bergamia melarosa . . . . .                | 2 à 3 » | serratifolia . . . . .                          | 2 »      | coccinea . . . . .                            | 4 »      |
| bastardo . . . . .                         | 2 à 3 » | <i>species nova à feuilles persistantes,</i>    |          | impressa (Labill.) . . . . .                  | 3 »      |
| flore pleno . . . . .                      | 2 »     | <i>très-grande et belle plante . . .</i>        | 5 »      | lævigata . . . . .                            | 5 »      |
| merveille d'Esagne . . . . .               | 2 à 3 » | CROTALLARIA elegans . . . . .                   | 1 50     | miniata . . . . .                             | 12 »     |
| du Pérou . . . . .                         | 3 50    | CUPHEA miniata . . . . .                        | » »      | mucronulata (R. P.) . . . . .                 | 3 »      |
| Bigaradia crispifol. Bouquetier . .        | 2 »     | scabrida (H. B.) . . . . .                      | 1 50     | nivalis (Grah.) . . . . .                     | 3 »      |
| Japonaise . . . . .                        | 3 »     | strigulosa . . . . .                            | » »      | onosmaeflora (Cun.) <i>Lysinema rusei-</i>    |          |
| foliis aureo variegatis . . . .            | 3 »     | CUSSONIA spicata (Thun.) . . . . .              | 4 »      | <i>folia</i> (Sieb.) . . . . .                | 2 à 5 »  |
| melangola de la Chine à larges             |         | tbyrsiflora (Thun.) . . . . .                   | 3 »      | pulchella (Sieb.) . . . . .                   | 3 »      |
| feuilles . . . . .                         | 3 »     | CYCLAMEN africanum . . . . .                    | 6 à 20 » | major . . . . .                               | 3 »      |
| douce . . . . .                            | 2 à 3 » | intermedium . . . . .                           | 3 »      | variabilis (Lodd.) . . . . .                  | 4 »      |
| stellata riccia . . . . .                  | 2 à 3 » | neapolitanum (Ttn.) . . . . .                   | 1 50     | EPHEDRA altissima (Desf.) . . . .             | 1 »      |
| myrtifolia (Ris.) . . . . .                | 2 à 8 » | persicum (Mill.) . . . . .                      | 1 »      | ERICA amœna (Wendl.) incarnata . .            | 2 »      |
| foliis variegatis . . . . .                | 2 à 8 » | roseum . . . . .                                | 1 50     | arborea (L.) . . . . .                        | 1 »      |
| hystrix (DC.) . . . . .                    | 2 à 4 » | DACRIDIDIUM cupressiforme . . . .               | 10 à 40  | australis (L.) . . . . .                      | 1 50     |
| Limetta Pomum Adami. Cedra des             |         | elatum (Wall.) . . . . .                        | 25 »     | baccans (L.) . . . . .                        | 2 »      |
| juifs . . . . .                            | 2 à 4 » | spicatum . . . . .                              | 2 à 6 »  | Banksii purpurea . . . . .                    | 2 »      |
| pyriformis . . . . .                       | 2 à 3 » | DAIS cotinifolia (L.) . . . . .                 | 1 50     | Blæria (Th.) <i>Blæria ericoides</i> (L.) .   | 1 »      |
| quercifolia . . . . .                      | 3 »     | DAMARA australis . . . . .                      | 20 à 200 | Bowieana (Lodd.) . . . . .                    | 2 »      |
| scanellatone . . . . .                     | 2 à 3 » | DAPHNE Aucklandi . . . . .                      | 4 »      | calycina (L.) . . . . .                       | 2 »      |
| Limonium balotinum (Ris.) . . . .          | 2 »     | Cneorum maximum . . . . .                       | 1 à 1 50 | cerinthoides (L.) . . . . .                   | 4 »      |
| Capo d'Aro . . . . .                       | 2 »     | foliis variegatis . . . . .                     | 2 »      | colorans (Andr.) . . . . .                    | 2 »      |
| cardinalisque . . . . .                    | 2 50    | collina (W.) . . . . .                          | 1 à 2 »  | concinna (Ait.) . . . . .                     | 1 50     |
| chinense . . . . .                         | 2 à 3 » | Delahayana . . . . .                            | 3 »      | concolor (Lodd.) . . . . .                    | 2 »      |
| douce . . . . .                            | 2 à 3 » | Fioni, Daphne Delphini . . . . .                | 1 à 3 »  | corsica . . . . .                             | 1 25     |
| foliis integris . . . . .                  | 2 à 3 » | indica foliis variegatis . . . . .              | 1 à 2 »  | costata superba . . . . .                     | 1 »      |
| fructu maxim. obl. . . . .                 | 2 à 3 » | flore rubra . . . . .                           | 4 »      | cruenta (H. K.) . . . . .                     | 2 »      |
| grossa della regina . . . . .              | 3 »     | neapolitana (Lodd.) . . . . .                   | 1 à 2 »  | cubica (L.) . . . . .                         | 1 50     |
| longo punto. <i>C. umbellicato</i>         | 2 à 4 » | odora (Thun.) . . . . .                         | 3 »      | minor (B.) . . . . .                          | 1 50     |
| incomparable . . . . .                     | 2 à 4 » | pontica (Spr.) . . . . .                        | 1 »      | cupressima . . . . .                          | 2 »      |
| moscardina . . . . .                       | 2 »     | DATURA arborea (L.) <i>Brugmansia can-</i>      |          | cylindrica (And.) . . . . .                   | 2 »      |
| à suc noir . . . . .                       | 2 »     | <i>dida</i> (Pers.) . . . . .                   | 1 à 6 »  | superba (Hoffms.) . . . . .                   | 3 »      |
| monstrosum . . . . .                       | 2 à 3 » | DAVIESIA quadrilatera . . . . .                 | 7 »      | discolor . . . . .                            | 2 »      |
| Peretto domingensis . . . . .              | 2 50    | DIGITALIS canariensis (L.) . . . .              | 1 50     | empetrifolia . . . . .                        | 3 »      |
| Pompelmus Chadec. à feuilles ve-           |         | DIOSMA alba (DC.) <i>Coleonema alba</i>         |          | exigua (Salisb.) . . . . .                    | 1 »      |
| lues . . . . .                             | 2 à 3 » | (B. W.) . . . . .                               | 1 50     | exsudens (Andr.) . . . . .                    | 2 »      |
| crispatus C. decum. . . . .                | 3 »     | angustifolia (Hort.) <i>Coleonema pul-</i>      |          | exurgens . . . . .                            | 2 »      |
| des colonies . . . . .                     | 2 à 3 » | <i>chra</i> (Hook.) . . . . .                   | 2 »      | filamentosa (Andr.) . . . . .                 | 1 50     |
| de Portorico, nouvelle variété .           | 5 »     | Bruniades (Wis.) . . . . .                      | 1 »      | glandinosa? . . . . .                         | 2 »      |
| rubescens . . . . .                        | 2 à 4 » | capitata (Dum.) . . . . .                       | 1 »      | globularis . . . . .                          | 1 50     |
| saladina (Ris.) <i>Cédratier de Saint-</i> |         | ciliata . . . . .                               | 1 »      | gracilis (Wendl.) . . . . .                   | 1 »      |
| Jérôme . . . . .                           | 2 à 4 » | cordata (Hort.) . . . . .                       | 1 »      | grandiflora (Linn.) . . . . .                 | 5 »      |
| striatum, scanellatum . . . . .            | 2 à 3 » | dioica . . . . .                                | 2 »      | Hartnelli (Lodd.) . . . . .                   | 4 »      |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>                   | fr. | c. |
|---|-----|----|
| ERICA hybernica var. <i>de Mediterranea</i>   | 1   | 50 |
| hiemalis . . . . .                            | 2   | »  |
| incarnata . . . . .                           | 2   | »  |
| ignescens (Andr.) . . . . .                   | 2   | »  |
| jasminiflora (Andr.) . . . . .                | 4   | »  |
| Juliana (Nois.) . . . . .                     | 3   | »  |
| Lambertii . . . . .                           | 3   | »  |
| laniflora (Wendl.) . . . . .                  | 1   | 50 |
| Linneana (H. K.) Linnæides (A. H.)            | 5   | »  |
| mammosa (L.) . . . . .                        | 3   | »  |
| <i>coccinea</i> . . . . .                     | 3   | 50 |
| <i>major</i> . . . . .                        | 2   | »  |
| <i>minor</i> . . . . .                        | 3   | »  |
| <i>rosea</i> . . . . .                        | 3   | »  |
| mediterranea (L.) . . . . .                   | 1   | »  |
| Monsoniae (L.) . . . . .                      | 3   | »  |
| montana (Bedt. E.) <i>fabrilis</i> (Salisb.)  | 3   | »  |
| multiflorum anglorum (Hort.) . . . . .        | 2   | »  |
| nigricans (Lodd.) . . . . .                   | 3   | »  |
| oppositifolia (A. H.) . . . . .               | 2   | »  |
| Ottois (Hort.) . . . . .                      | 1   | »  |
| passerna (L.) . . . . .                       | 2   | »  |
| pellucida rubra (A. H.) . . . . .             | 3   | »  |
| persoluta alba (L.) . . . . .                 | 2   | »  |
| polytrichifolia (Salisb.) . . . . .           | 1   | »  |
| præstans (Andr.) . . . . .                    | 2   | »  |
| pubescens major . . . . .                     | 1   | »  |
| pulchella (Andr.) . . . . .                   | 2   | »  |
| pyramidalis . . . . .                         | 2   | »  |
| regerminans (L.) . . . . .                    | 1   | 50 |
| rosea (H. K.) . . . . .                       | 2   | »  |
| rubens Andr.) . . . . .                       | 2   | 50 |
| rubra calix . . . . .                         | 2   | »  |
| siemla . . . . .                              | 2   | »  |
| socciflora (Salisb.) <i>Sebana viridis</i>    | 4   | »  |
| (A. H.) . . . . .                             | 4   | »  |
| sparsa . . . . .                              | 2   | »  |
| speciosa (Andr.) . . . . .                    | 2   | »  |
| squamosa (Andr.) . . . . .                    | 3   | »  |
| suaveolens (Andr.) . . . . .                  | 4   | »  |
| tenella (Andr.) . . . . .                     | 2   | »  |
| Tetralix speciosa (Hort.) . . . . .           | 1   | 50 |
| tortuosa (Lodd.) . . . . .                    | 2   | 50 |
| tubifloris (Willd.) . . . . .                 | 4   | »  |
| Urtia pilosa . . . . .                        | 2   | »  |
| ventricota (Th.) . . . . .                    | 1   | 50 |
| verticillata . . . . .                        | 3   | »  |
| ventricosa purpurea . . . . .                 | 1   | 50 |
| <i>stellata</i> . . . . .                     | 2   | »  |
| vernix coccinea <i>Petit, Klein</i> . . . . . | 4   | »  |
| versicolor glutinosa (Andr.) . . . . .        | 3   | »  |
| <i>nova</i> . . . . .                         | 3   | »  |
| princeps . . . . .                            | 3   | »  |
| viridiflora (Andr.) . . . . .                 | 2   | »  |
| Une collection de 25 espèces à notre          |     |    |
| choix. Eine Sammlung von 25 Sorten            |     |    |
| nach unserer Wahl . . . . .                   | 25  | »  |
| ESCALLONIA floribunda (H. H.) . . . . .       | 1   | 50 |
| <i>rubra</i> (Pers.) . . . . .                | 1   | 50 |
| EUCALYPTUS cordata (Labill.) . . . . .        | 5   | »  |
| <i>falcata</i> . . . . .                      | 3   | »  |
| <i>glauca</i> (Dec.) . . . . .                | 5   | »  |
| <i>marginata</i> (Smith.) . . . . .           | 5   | »  |
| <i>paniculata</i> (Smith.) . . . . .          | 4   | »  |
| EUCOMIS nana . . . . .                        | 3   | »  |
| <i>punctata</i> (Ait.) . . . . .              | 1   | 50 |
| EUGENIA australis (Wendl.) <i>Jambosa</i>     |     |    |
| <i>australis</i> (DC.) . . . . .              | 2   | 50 |
| EUPATORIUM odoratissimum . . . . .            | 1   | 50 |
| <i>grandiflorum rosenm.</i> . . . . .         | 1   | 50 |
| EUTAXIA Baxteri (K. et W.) . . . . .          | 2   | »  |
| <i>myrtifolia</i> (R. Br.) . . . . .          | 1   | 50 |
| EXCOECARIA tinifolia (Swartz) . . . . .       | 1   | 50 |
| FABIANA imbricata (R. P.) . . . . .           | 1   | 25 |
| FABRICIA lævigata (Sm.) . . . . .             | 1   | 50 |
| <b>FUCHSIA.</b>                               |     |    |
| <i>affinis</i> . . . . .                      | 1   | »  |
| <i>amata</i> . . . . .                        | 1   | »  |
| <i>Armide</i> . . . . .                       | 1   | »  |
| <i>aurantiaca</i> . . . . .                   | 1   | »  |
| <i>Audot Salter's</i> . . . . .               | 1   | 50 |
| <i>Bride of Pekin</i> . . . . .               | 1   | »  |
| <i>Britania</i> . . . . .                     | 1   | »  |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                 | fr.          | c.  |
|---|--------------|-----|
| FUCHSIA Brookmanni . . . . .                | 1            | 50  |
| <i>cylindrica</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| <i>coccinea vera</i> (Smith's) . . . . .    | 1            | »   |
| <i>Cooperi</i> . . . . .                    | 1            | »   |
| <i>Conqueror</i> . . . . .                  | 1            | »   |
| <i>Cormarkii</i> . . . . .                  | 1            | »   |
| <i>grandiflora maxima</i> . . . . .         | 1            | 50  |
| <i>corymbiflora</i> (R. B.) . . . . .       | 75 c. à 3 f. |     |
| <i>défilance</i> . . . . .                  | 2            | »   |
| <i>Dezeanii</i> (Baumann) . . . . .         | 3            | »   |
| <i>Dicksoni</i> . . . . .                   | 1            | »   |
| <i>Duchesse of Sutherland</i> . . . . .     | 1            | 50  |
| <i>Emperor</i> . . . . .                    | 2            | »   |
| <i>Epsi</i> . . . . .                       | 1            | 50  |
| <i>Emeralda</i> . . . . .                   | 2            | 50  |
| <i>Estella</i> . . . . .                    | 2            | »   |
| <i>Exoniensis</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| <i>Fanny Esler</i> . . . . .                | 1            | »   |
| <i>Fairy Rosamunda</i> . . . . .            | 2            | »   |
| <i>formosissima</i> . . . . .               | 2            | »   |
| <i>fulgens</i> (B. R.) . . . . .            | 1            | » 3 |
| <i>multiflora</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| <i>superba</i> . . . . .                    | 1            | »   |
| <i>Gem's superba</i> . . . . .              | 1            | »   |
| <i>gigantea</i> . . . . .                   | 1            | 50  |
| <i>Hartenicus</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| <i>insignis</i> . . . . .                   | 1            | »   |
| <i>invincible</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| <i>Joan of Arc</i> . . . . .                | 3            | »   |
| <i>Janius</i> . . . . .                     | 1            | 50  |
| <i>King John</i> . . . . .                  | 1            | 50  |
| <i>Lanei</i> . . . . .                      | 1            | 50  |
| <i>Londons rival</i> . . . . .              | 1            | 50  |
| <i>Lowii</i> . . . . .                      | 1            | 50  |
| <i>magnet</i> (Regel's) . . . . .           | 2            | »   |
| <i>magniflora</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| <i>magnificens</i> (Hort.) . . . . .        | 1            | »   |
| <i>marginata</i> . . . . .                  | 1            | 50  |
| <i>Meteor</i> . . . . .                     | 1            | 50  |
| <i>Monnypenny</i> . . . . .                 | 1            | 50  |
| <i>Napoléon</i> . . . . .                   | 3            | »   |
| <i>NOBILISSIMA</i> . . . . .                | 2            | »   |
| <i>Nymphé</i> (Eps.) . . . . .              | 2            | »   |
| <i>pendula terminalis</i> . . . . .         | 1            | »   |
| <i>Praney</i> . . . . .                     | 1            | 50  |
| <i>Prima Donna</i> (Regel's) . . . . .      | 1            | 50  |
| <i>Prince of Wales</i> . . . . .            | 1            | »   |
| <i>Queen Victoria</i> . . . . .             | 3            | »   |
| <i>racemiflora</i> . . . . .                | 1            | »   |
| <i>Rebecca</i> . . . . .                    | 2            | »   |
| <i>reflexa</i> . . . . .                    | 1            | »   |
| <i>scaramoche</i> . . . . .                 | 1            | 50  |
| <i>theneyana</i> . . . . .                  | 1            | 50  |
| <i>Rogersiana</i> . . . . .                 | 1            | 50  |
| <i>splendens</i> . . . . .                  | 1            | »   |
| <i>splendidissima</i> . . . . .             | »            | »   |
| <i>Standishii</i> (Hort.) . . . . .         | 1            | »   |
| <i>stylosa</i> . . . . .                    | 1            | »   |
| <i>STORMUNDI</i> . . . . .                  | 1            | 50  |
| <i>Toddiana</i> . . . . .                   | 1            | 50  |
| <i>triumphans</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| <i>Venus victrix</i> . . . . .              | 1            | »   |
| <i>Vesta</i> (Smith's) . . . . .            | »            | »   |
| <i>Wales Taylor's</i> . . . . .             | »            | »   |
| <i>Wooli</i> . . . . .                      | 1            | »   |
| Nous offrons en outre, à notre choix :      |              |     |
| Une collection de FUCHSIA de 12 esp.        | 6            | »   |
| » » de 24 »                                 | 15           | »   |
| » » de 30 »                                 | 20           | »   |
| <i>Au choix des amateurs :</i>              |              |     |
| 12 espèces . . . . .                        | 12           | »   |
| 24 » . . . . .                              | 24           | »   |
| 30 » . . . . .                              | 25           | »   |
| GARDOQUIA betonicoides . . . . .            | 1            | »   |
| <i>Hookeri</i> (Benth.) . . . . .           | 1            | »   |
| <i>Gillesii</i> . . . . .                   | 1            | 50  |
| <i>multiflora</i> . . . . .                 | 1            | »   |
| GASTROLOBium vimineum . . . . .             | 1            | »   |
| GAULTHERIA mexicana? . . . . .              | 10           | »   |
| <b>GERANIUMS OU PELARGONIUM.</b>            |              |     |
| NB. Variétés tirées des meilleures          |              |     |
| sources pour ce beau genre et offrant       |              |     |
| toutes les fleurs du 1 <sup>er</sup> ordre. |              |     |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                        | fr. | c. |
|--|-----|----|
| NB. Spielarten welche aus den besten               |     |    |
| Quellen gezogen worden sind, alles Blumen          |     |    |
| erster Qualität.                                   |     |    |
| Adela (F.) . . . . .                               | 1   | 50 |
| Adelphie (Ch.) . . . . .                           | 1   | 50 |
| Alicia (Ch.) . . . . .                             | 2   | »  |
| Amaranthe . . . . .                                | 2   | »  |
| Amélie . . . . .                                   | 4   | »  |
| Anais Chauvière (Ch.) . . . . .                    | 2   | »  |
| Arabella (F.) . . . . .                            | 3   | »  |
| Belle Louise . . . . .                             | 1   | 50 |
| Black-eyed Susanne . . . . .                       | 2   | »  |
| Bride groom (F.) . . . . .                         | 2   | »  |
| Britania . . . . .                                 | 4   | »  |
| Cherau (Nadame) . . . . .                          | 1   | 50 |
| Clarissa Garth's . . . . .                         | 2   | »  |
| Claude Laurain . . . . .                           | 1   | 50 |
| Claudia . . . . .                                  | 2   | »  |
| Clotilde . . . . .                                 | 2   | »  |
| conservative . . . . .                             | 1   | »  |
| coronation . . . . .                               | 2   | »  |
| Cressida . . . . .                                 | 2   | »  |
| Discount (Garth's) . . . . .                       | 1   | 50 |
| Duchesse d'Abrantès . . . . .                      | 2   | »  |
| Duke of Buckingham . . . . .                       | 1   | »  |
| <i>of Devonshire</i> . . . . .                     | 1   | »  |
| Duenna (Garth's) . . . . .                         | 2   | »  |
| Elvira . . . . .                                   | 1   | 50 |
| Emperor . . . . .                                  | 2   | »  |
| faire maid . . . . .                               | 3   | »  |
| Fanny (Garth's) . . . . .                          | 2   | »  |
| Figaro . . . . .                                   | 2   | »  |
| fire fly . . . . .                                 | 2   | »  |
| Flamingo (G.) . . . . .                            | 1   | »  |
| Fleur de Marie . . . . .                           | 3   | »  |
| Florina Lacelle (Garth's) . . . . .                | 3   | »  |
| Fortuna . . . . .                                  | 2   | 50 |
| Gaine's King . . . . .                             | 2   | »  |
| Gloria Parisiensis (Chauv.) . . . . .              | 3   | »  |
| Grand Corneille . . . . .                          | 3   | »  |
| Grand Duke (Gaine's) . . . . .                     | 1   | 50 |
| Grand papillon . . . . .                           | 3   | »  |
| Indian chief . . . . .                             | 2   | »  |
| Imogène . . . . .                                  | 1   | 50 |
| Iewess (Forst.) . . . . .                          | 1   | 50 |
| Joan of Arc . . . . .                              | 2   | »  |
| Joséphine . . . . .                                | 4   | »  |
| Julia Gressi . . . . .                             | 1   | 50 |
| Jupiter . . . . .                                  | 2   | »  |
| King James (Gaine's) . . . . .                     | 1   | 50 |
| Lady Blanche . . . . .                             | 2   | »  |
| <i>Carlisle</i> . . . . .                          | 2   | »  |
| <i>Nythdade</i> . . . . .                          | 1   | »  |
| Lamberty . . . . .                                 | 2   | »  |
| Life guardsman (F.) . . . . .                      | 1   | »  |
| Little wonder . . . . .                            | 2   | »  |
| London's perfection . . . . .                      | 1   | 50 |
| Lord Auckland . . . . .                            | 1   | 50 |
| <i>Byron</i> . . . . .                             | 2   | »  |
| Louis XIV. . . . .                                 | 2   | »  |
| Lucifer . . . . .                                  | 2   | »  |
| MADAME IWAN SCHLUMBERGER                           |     |    |
| <i>nouveau coloris, fleur magnifique</i> . . . . . | 10  | »  |
| Mademoiselle Rachel . . . . .                      | 5   | »  |
| Madona (Stewarts.) . . . . .                       | 3   | »  |
| Magna charta . . . . .                             | 2   | »  |
| Marie de Médicis . . . . .                         | 2   | »  |
| Master peace (Ch.) . . . . .                       | 1   | 50 |
| Mazeppa . . . . .                                  | 2   | »  |
| Mirabeau . . . . .                                 | 2   | »  |
| Miranda . . . . .                                  | 2   | »  |
| MONTE CHRISTO, <i>nouveau de semis,</i>            |     |    |
| <i>belle fleur et beau coloris</i> . . . . .       | 10  | »  |
| Napoléon . . . . .                                 | 2   | »  |
| Non such (G.) . . . . .                            | 2   | »  |
| Olivier (Tweste) . . . . .                         | 1   | »  |
| Olympicum . . . . .                                | 1   | 50 |
| Ophelia . . . . .                                  | 2   | »  |
| Pelegrinum superbum . . . . .                      | 1   | 50 |
| perfection . . . . .                               | 1   | 50 |
| Premier (G.) . . . . .                             | 1   | 50 |
| Prima donna . . . . .                              | 1   | 50 |
| Prince Albert (Gaine's) . . . . .                  | 1   | »  |
| Queen Dowager . . . . .                            | 1   | 50 |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>                 | fr. c.  | <i>La pièce. Das Stück.</i>                  | fr. c.      | <i>La pièce. Das Stück.</i>                 | fr. c.      |
|---|---------|--|-------------|---|-------------|
| Queen superbe (J) . . . . .                 | 2 »     | HAKKA species de Swan River . . . . .        | 25 »        | MAGNOLIA grandiflora canaliculata . . . . . | 3 »         |
| VICTORIA, superbe blanc. . . . .            | 5 »     | HELICHRYSUM fulgidum (Willd.) . . . . .      | 1 50        | Exmouth . . . . .                           | 4 »         |
| Rachel (Mlle) Cat. . . . .                  | 4 »     | vestitum (Less.) . . . . .                   | 1 50        | ferruginea . . . . .                        | 4 »         |
| Rebecca (Forst.) . . . . .                  | 2 »     | HERMANNIA aenea (Jacq) . . . . .             | 1 50        | glabra ovata . . . . .                      | 4 »         |
| Reine des beautés . . . . .                 | 3 »     | HOVEA Celsii (Boupl) . . . . .               | 4 à 8 »     | HARTWICUS, nouvel e hybride                 |             |
| Réné-le-Normand (Leseble) . . . . .         | 2 »     | pungens . . . . .                            | 5 à 8 »     | du pumila et grandiflora, nain              |             |
| Rienzi (G.) . . . . .                       | 2 »     | pinquaca . . . . .                           | 2 50 à 5 f. | et multiflore . . . . .                     | 6 »         |
| Rising Sung (Gaine's) . . . . .             | 3 »     | HOUSTONIA coccinea (Andr.) . . . . .         | 1 »         | latifolia . . . . .                         | 4 »         |
| Roi des noirs . . . . .                     | 2 »     | HYDRANGEA Hortensia (DC) Hortensia           |             | oxoniensis . . . . .                        | 3 »         |
| Roseum elegans (Garth's) . . . . .          | 2 »     | opuloides (Lam) . . . . .                    | 1 »         | præcox . . . . .                            | 4 »         |
| Saint-Léger . . . . .                       | 2 »     | moyenne force . . . . .                      | 2 »         | pumila (Andr.) . . . . .                    | 2 à 4 »     |
| Simile (Garth's) . . . . .                  | 2 »     | forte plante . . . . .                       | 2 »         | rotundifolia . . . . .                      | 3 »         |
| Sophocles . . . . .                         | 1 50    | cœrulea . . . . .                            | 1 50        | undulata . . . . .                          | 3 »         |
| Speculum mundi . . . . .                    | 2 »     | forte plante . . . . .                       | 6 »         | MAHERNIA incisa . . . . .                   | 1 50        |
| variegatum . . . . .                        | 3 »     | japonica . . . . .                           | 1 à 3 »     | MANGLESIA Drumondi . . . . .                | 2 à 4 »     |
| Surprise de Nancy . . . . .                 | 1 50    | HYPERICUM japonicum (Thunb.) . . . . .       | 2 »         | MELALEUCA calycina (R. Br.) . . . . .       | 1 50        |
| Sussiana . . . . .                          | » »     | ILEX excelsa . . . . .                       | 10 »        | coronata (Andr) . . . . .                   | 1 50        |
| Tricolor . . . . .                          | 1 à 2 » | gigantea . . . . .                           | 10 »        | deussata (R. Br.) . . . . .                 | 1 50        |
| Triomphe d'Effen . . . . .                  | 3 »     | LATIFOLIA (Thunb) . . . . .                  | 6 à 30 »    | fulgens (R. Br) . . . . .                   | 1 50        |
| de Dijon . . . . .                          | 4 »     | ILLICIMUM anisatum (L.) . . . . .            | 2 »         | ovata (Hort) . . . . .                      | 1 »         |
| Unique . . . . .                            | 2 »     | floridanum (L.) . . . . .                    | 2 50        | polygaloides . . . . .                      | 1 50        |
| Victory (Garth's) . . . . .                 | 2 »     | religiosum . . . . .                         | 5 »         | pulchella (R. Br) . . . . .                 | 1 50        |
| Viola . . . . .                             | 1 50    | INDIGOFERA australis (Willd) . . . . .       | 1 »         | species N° 2 Swan river . . . . .           | 5 »         |
| Vivid . . . . .                             | 1 50    | caroliniana . . . . .                        | 1 à 3 »     | » N° 3 » . . . . .                          | 5 »         |
| Wild fire (Forst) . . . . .                 | 2 50    | coccinea . . . . .                           | 2 »         | splendens (Lee.) . . . . .                  | 1 50        |
| William Arousohn . . . . .                  | 1 50    | Dosua (Hamil.) . . . . .                     | 3 à 10 »    | MENISPERMUM laurifolium (Roxb.) . . . . .   |             |
| Zénobie (Lacombe) . . . . .                 | 2 »     | verucosa . . . . .                           | 1 50        | Cocculus laurifolius (DC) . . . . .         | 2 »         |
| Une collection, à notre choix, de 25        |         | ISOPOGON formosus . . . . .                  | 3 »         | MESEMBRYANTHEMUM barbatum (L) . . . . .     | 1 »         |
| belles variétés. Eine Sammlung von          |         | ISOTOMA axillaris (R. Br.) . . . . .         | 1 »         | diminutum (Haw.) . . . . .                  | 1 50        |
| 25 Sorten, nach unserer Wahl. . . . .       |         | JASMINUM azoricum (L) . . . . .              | 1 50        | pusillum (Hort.) . . . . .                  | 1 »         |
| NB. Indépendamment des variétés             |         | grandiflorum (L) . . . . .                   | 1 50        | spectabile (Haw.) . . . . .                 | 2 »         |
| dénommées, nous en possédons encore         |         | nepalense (Spr.) . . . . .                   | 2 »         | MESPIUS japonica (Willd) . . . . .          | 2 »         |
| beaucoup d'autres plus anciennement         |         | heterophyllum (Wall.) . . . . .              | 2 »         | METROSIDEROS albida . . . . .               | 2 50        |
| publiées, que nous pouvons fournir de       |         | odoratissimum (L) . . . . .                  | 2 »         | glauca (Damp) Callistemon specio-           |             |
| 50 à 75 cent                                |         | Wallichianum (Lindl) . . . . .               | 1 50        | sum (DC.) . . . . .                         | 2 »         |
| NB. Außer den ebenbenannten, besitzen       |         | LACHENALIA pendula (Ait) . . . . .           | 1 »         | lanceolata . . . . .                        | 2 »         |
| wir noch mehrere schon länger bekannte Sor- |         | tricolor (Thunb) . . . . .                   | 1 50        | Lophanta (Vent) Callistemon lan-            |             |
| ten, die wir 50 bis 75 C abgeben können.    |         | LACHNOEA conglomerata (Linn.) . . . . .      | 2 »         | ceolatus (DC.) . . . . .                    |             |
| GNAPHALIUM congestum (Lam) . Helich-        |         | LALAGE ornata . . . . .                      | 20 »        | nodosa . . . . .                            | 1 50        |
| chrysum felinum (Less.) . . . . .           |         | LAMBERTIA echinata (R. Br.) . . . . .        | 2 à 4 »     | præcox (Hort.) . . . . .                    | 1 à 3 »     |
| ignescens (Linn.) . Helichrysum are-        |         | formosa (Sm.) . . . . .                      | 1 50 à 3 f. | rigida (Hort.) . Callistemon rigidus        |             |
| narium . . . . .                            |         | propinqua (R. Br.) . . . . .                 | 1 à 3 »     | (DC.) . . . . .                             | 2 »         |
| odoratum (Thunb) . . . . .                  |         | LAPEYROUSIA grandiflora . . . . .            | 1 »         | ruscifolia . . . . .                        | 2 »         |
| orientale (L) . Helichr. or (Gært.)         |         | Les 12 plantes . . . . .                     | 4 »         | semperflorens (Lodd) . . . . .              | 2 »         |
| retorum (Bojer) . . . . .                   |         | LASIOPETALUM purpureum (H. K.) . Tho-        |             | viminea . . . . .                           | 2 »         |
| GNIDIA aurea (Eckl.) . . . . .              |         | masia purpurea (DC.) . . . . .               | 1 »         | viridiflora (Hort. Cels.) . Galistemon      |             |
| denudata (Lindl.) . imbricata (Lin) .       |         | solanaceum (R. M) . Thomasia sola-           |             | viridiflorus (DC) . . . . .                 | 2 »         |
| simplex (W.) . . . . .                      |         | nacea (DC.) . . . . .                        | 1 50        | MIMULUS guttatus fulgens . . . . .          | 1 »         |
| GOODIA lotifolia (Sal) . . . . .            |         | LAURUS camphora (L) . . . . .                | 5 »         | eximius . . . . .                           | 1 50        |
| GOODENIA grandiflora (Sims) . . . . .       |         | caroliniensis (Mich.) . . . . .              | 1 50        | MIRBELIA ilicifolia . M. undulata . . . . . | 2 à 6 »     |
| laevigata (Curt.) . Scævola microcar-       |         | foetens (Ait.) . . . . .                     | 2 »         | MONSONIA filia ? . . . . .                  | 1 »         |
| pa (Law) . . . . .                          |         | glaucochyta ? . . . . .                      | 2 »         | lobata (Ait) . . . . .                      | 1 1         |
| GORDONIA Lasianthus (L) . . . . .           |         | indica (Linn) . . . . .                      | 3 »         | speciosa . . . . .                          | 2 »         |
| GORTERIA ringens (L) . G. zaniaringens      |         | involuta (Heb) . . . . .                     | 2 »         | MORÆA iridoides (L) Iris moræoides          |             |
| (DC.) . . . . .                             |         | nobilis (L) . . . . .                        | 1 à 10 »    | (Ker.) . . . . .                            | 2 »         |
| GREWIA occidentalis (L) . . . . .           |         | salicifolia . . . . .                        | 2 »         | MYOPORUM rubricaula (Hort.) . . . . .       | 1 50        |
| saligna ? . . . . .                         |         | foliis variegatis . . . . .                  | 2 »         | MYRTUS bullata (Salisb.) . . . . .          | 5 à 10 »    |
| GREWILLEA acanthifolia (Sieb.) . . . . .    |         | Persea (L) . Persea gratissima (Goert.)      | 10 »        | communis (L) . . . . .                      | 1 à 8 »     |
| Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.) . . . . . |         | tomentosa . . . . .                          | 2 »         | foliis variegatis . . . . .                 | 1 50 à 6 f. |
| bipinnatifida . . . . .                     |         | LESCHENAUULTIA biloba . . . . .              | 2 »         | romana . . . . .                            | 1 à 8 »     |
| ceratophylla . . . . .                      |         | drumondi . . . . .                           | 1 »         | horizontalis (Vent.) . Eugenia disti-       |             |
| ferruginea (Sieb.) . . . . .                |         | formosa (R. Br.) . . . . .                   | » 75        | cha . . . . .                               | 2 à 3 »     |
| juniperina (R. Br) . . . . .                |         | oblata . . . . .                             | 1 50        | mucronanata (Pers.) . . . . .               | 1 50        |
| Lawrenceana . . . . .                       |         | LEPTOSPERMUM dubium ? . . . . .              | 1 50        | torentina (Will.) . . . . .                 | 1 50        |
| Manglesii (Hort.) . Manglesia cuneata       |         | grandiflorum (Lodd) . . . . .                | 1 50        | NANDINA domestica (Thunb.) . . . . .        | 1 à 3 »     |
| Endl.) . . . . .                            |         | pubescens (Smith) . . . . .                  | 1 50        | NERIUM oleander (L.) . . . . .              | 1 »         |
| robusta (Cunn.) . . . . .                   |         | roseum ? . . . . .                           | 1 50        | album niveum . . . . .                      | 1 50        |
| rosmarinifolia (Cunn.) . . . . .            |         | thymitolum (Cels) . . . . .                  | 1 50        | flore albo pleno . . . . .                  | » »         |
| sericea . . . . .                           |         | LEUCOTHOE buxifolia (DC) . Androme-          |             | atropurpureum odoratissim. . . . .          | 2 »         |
| Sternbergiana . . . . .                     |         | da buxifolia . . . . .                       | 1 à 3 »     | angustifolium foliis variegatis . . . . .   | 2 »         |
| sulphurea (Cunn) . . . . .                  |         | LIPARIA sphaerica . . . . .                  | 2 »         | cardinae fl. pleno . . . . .                | 2 »         |
| Thelemaniana (Hug.) . . . . .               |         | LINUM suffruticosum . . . . .                | 1 50        | carneum grandiflorum . . . . .              | 2 »         |
| vestita . . . . .                           |         | trigynum (W.) . . . . .                      | 1 »         | coccineum . . . . .                         | 1 »         |
| HAKKA Baxteri (R. Br.) . . . . .            |         | LITHOSPERMUM rosmarinifolium (Ten) . . . . . | 1 »         | columbianum . . . . .                       | 1 »         |
| ceratophylla (R. Br.) . . . . .             |         | LOBELIA Erinus (L) . . . . .                 | 1 »         | elegans . . . . .                           | 1 50        |
| flexilis (R. Br.) . . . . .                 |         | fulgens (Willd.) . . . . .                   | 1 »         | flavum . . . . .                            | 1 50        |
| florida (R. Br.) . . . . .                  |         | longiflora (L) . Isotoma longiflora          |             | fulvum . . . . .                            | 2 »         |
| ilicifolia . . . . .                        |         | (Presl.) . . . . .                           | 1 »         | grandiflorum pleno . . . . .                | 1 50        |
| Lambertii (Sweet.) . . . . .                |         | LOMATIA ilicifolia (R. B.) . . . . .         | 4 »         | Grisard du Seugot . . . . .                 | 1 50        |
| nitida (R. Br) . . . . .                    |         | longifolia (R. Br.) . . . . .                | 3 »         | Henry de France . . . . .                   | 1 50        |
| palmaria . . . . .                          |         | silaifolia (R. Br.) . . . . .                | 4 à 10 »    | Jeanne d'Arc . . . . .                      | 3 »         |
| pugioniformis (Cav.) . . . . .              |         | MAGNOLIA fuscata (Andr.) . . . . .           | 2 à 4 »     | lacteolum . . . . .                         | 2 »         |
| saligna (R. Br.) . . . . .                  |         | grandiflora (L.) . . . . .                   | 2 50        | luteum . N. pumilum . . . . .               | 1 50        |
|   |         | Biquelin . . . . .                           | 3 »         | Mabiri . . . . .                            | 2 »         |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>  | fr. c.     |
|--|------------|
| <i>NERIUM</i> oleander Madame Le Sieur . . . . .                         | 2 »        |
| maculatum (W.) . . . . .   | 1 50       |
| pumilum luteum . . . . .   | 2 »        |
| punctatum plenum . . . . .   | 2 »        |
| purpureum . . . . .  | 1 50       |
| coccineum . . . . .  | 3 »        |
| Quellenia fl. pleno . . . . .  | 3 »        |
| Richardsoni . . . . .  | 3 »        |
| salicifolium . . . . .   | 2 »        |
| spectabile . . . . .   | 1 50       |
| foliis variegatis . . . . .  | 3 »        |
| tinctorium . . . . .   | 1 50       |
| variegat. simplex . . . . .  | 1 50       |
| vittatum . . . . .   | 2 »        |
| splendens fl. pleno . . . . .  | 2 »        |
| foliis variegatis . . . . .  | 2 50       |
| <i>NIERENBERGIA</i> filicaulis (Lindl.) . . . . .                        | » 75       |
| <i>NYMPHÆA</i> cœrulea (W.) . . . . .                                    | 3 »        |
| Lotus . . . . .  | 10 »       |
| <i>OLEA</i> europæa (W.) . . . . .                                       | 1 à 3 »    |
| buxifolia . . . . .  | 1 à 2 »    |
| fragrans (Thunb.) . . . . .  | 1 à 3 »    |
| <i>OXALIS</i> Bowii (Lodd.) . . . . .                                    | 1 50       |
| caprina (Th.) . . . . .  | 1 »        |
| pentaphylla (Sims.) . . . . .  | 1 »        |
| purpurea (Jacq.) . . . . .   | 1 »        |
| reptatrix (Jacq.) . . . . .  | 1 »        |
| rosea (Jacq.), floribunda (B. R.) . . . . .                              | 1 »        |
| pectinata (Jacq.) . . . . .  | 1 »        |
| <i>OXYLOBUM</i> arborescens (R. Br.) . . . . .                           | 3 »        |
| cordifolium (H. K.) . . . . .  | 1 »        |
| <i>PENSTEMON</i> primuloides, <i>P. mexicanum</i> . . . . .              | 1 »        |
| <i>PETROPHILA</i> pedunculata (R. Br.) . . . . .                         | 3 »        |
| pulchella (R. Br.) . . . . .   | 3 »        |
| <i>PETUNIA</i> Adolphii . . . . .  | 1 »        |
| Beauté du jour . . . . .   | 1 »        |
| Beauty Sophia . . . . .  | 1 »        |
| Decandolli . . . . .   | 1 »        |
| delicatissima . . . . .  | 1 »        |
| Donald . . . . .   | 1 »        |
| Duc of Devonshire . . . . .  | 1 »        |
| Frédéric II. . . . .   | 1 50       |
| Heldida . . . . .  | 1 »        |
| intermedia (DS.) . . . . .   | 1 »        |
| maculata . . . . .   | 1 »        |
| Marie de Bourgogne . . . . .   | 1 50       |
| maxima . . . . .   | 1 »        |
| Pagina Maria . . . . .   | 1 50       |
| Princesse Aline . . . . .  | 1 »        |
| Léopoldine . . . . .   | 1 50       |
| Sophie . . . . .   | 1 »        |
| Queen of the May . . . . .   | 1 »        |
| robusta . . . . .  | 1 50       |
| Schiller . . . . .   | 1 50       |
| Sieur Lion . . . . .   | 1 »        |
| striatiflora delicatissima . . . . .                                     | 1 »        |
| Superbe . . . . .  | 1 »        |
| Talisman . . . . .   | 1 »        |
| violacea (Hook.) <i>Nierenbergia punicea</i> (Hort.) . . . . .           | 1 »        |
| grandiflora . . . . .  | 1 »        |
| Walter Scott . . . . .   | 1 »        |
| <i>PHLOX</i> Drummondii (Hook.) . . . . .                                | 1 »        |
| Donkelari . . . . .  | 1 »        |
| <i>PHORMIUM</i> tenax (Forst.) . . . . .                                 | 1 50       |
| <i>PHOTINIA</i> laevis <i>Ph. levigata</i> . . . . .                     | 1 50       |
| serrulata (Lindl.) . . . . .   | 1 50       |
| <i>PHYLICA</i> paniculata (Willd.) . . . . .                             | 2 »        |
| rosmarinifolia (Lam.) <i>Soulangia axillaris</i> (Bogn.) . . . . .       | 1 »        |
| <i>PHYLLOCLADUS</i> TRICHOMANOIDES . . . . .                             | 8 à 100    |
| <i>PHYSIANTHUS</i> albens (Mart.) <i>Arauja calycina</i> (DC.) . . . . . | 2 »        |
| <i>PIMELEA</i> drupacea (Labill.) . . . . .                              | » 50       |
| decussata rubra . . . . .  | 1 »        |
| hypericina (Hook.) . . . . .   | 1 »        |
| mirabilis . . . . .  | 3 »        |
| nivea (Labill.) . . . . .  | 2 »        |
| spectabilis . . . . .  | 1 50 à 3f. |
| sylvestris (R. Br.) . . . . .  | 2 »        |
| canariensis . . . . .  | 4 à 20 »   |
| <i>PINUS</i> Coulteri (Don.) . . . . .                                   | 10 »       |
| Deodora (Roxb.) <i>Cedrus Deodora</i> . . . . .                          | 3 à 6 »    |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                             | fr. c.   |
|---|----------|
| <i>PINUS</i> Donglasi (Lamb.) . . . . .                 | 20 »     |
| filifolia . . . . .                                     | 25 »     |
| longifolia (Lamb.) . . . . .                            | 4 à 20 » |
| Un échantillon haut de 1 mètre 50 centimètres . . . . . | 30 »     |
| palustris (Mill.) <i>Australis</i> (Mich.) . . . . .    | 1 à 8 »  |
| patula (Ch et Chl.) . . . . .                           | 20 »     |
| pinæa (Linn.) . . . . .                                 | 2 »      |
| religiosa . . . . .                                     | 10 à 25  |
| species du Mexique à très-longues aiguilles . . . . .   | 20 »     |
| <i>PISTACIA</i> Terebinthus (Linn.) . . . . .           | 1 50     |
| vera (L.) . . . . .                                     | 3 »      |
| <i>PITTOSPERUM</i> discolor . . . . .                   | 3 »      |
| revolutum . . . . .                                     | 2 à 3 »  |
| sinense (Desf.) . . . . .                               | 1 »      |
| Tobira (Ait.) . . . . .                                 | 1 »      |
| foliis variegatis . . . . .                             | 2 »      |
| undulatum (Vent.) . . . . .                             | 1 »      |
| <i>PLATYLOBUM</i> microphyllum (Sims.) . . . . .        | 3 »      |
| <i>PODOCARPUS</i> elongatus (l'Herit.) . . . . .        | 2 à 8 »  |
| Jacea (C. Don.) . . . . .                               | 3 à 5 »  |
| latifolius . . . . .                                    | 4 à 5 »  |
| longifolius . . . . .                                   | 3 à 20 » |
| macrophyllus (Wall.) . . . . .                          | 3 à 15 » |
| nucifera (Lodd.) . . . . .                              | 3 »      |
| <i>POINCIANA</i> Gillesi . . . . .                      | 2 à 3 »  |
| <i>POLYGALA</i> borboniæfolia (Burch.) . . . . .        | 2 »      |
| cordifolia (Thunb.) . . . . .                           | 1 »      |
| Dalmaïsiæna . . . . .                                   | 1 à 3 »  |
| gracilis H. B.) . . . . .                               | 1 50     |
| grandiflora (B. C.) . . . . .                           | 1 50     |
| Heisteria (L.) <i>Muraltia Heist</i> (DC.) . . . . .    | 1 »      |
| latifolia (Br.) . . . . .                               | 1 50     |
| speciosa (Sims.) . . . . .                              | 1 »      |
| Zeyheri (Spreng.) . . . . .                             | 2 »      |
| <i>PONTEDERIA</i> cordata (L.) . . . . .                | 2 »      |
| <i>PORTERIA</i> hygrometrica (Ruiz et Pav.) . . . . .   | 1 50     |
| <i>PRIMULA</i> chinensis (Lour.) . . . . .              | 1 »      |
| flore albo . . . . .                                    | 1 50     |
| pleno . . . . .   | 2 à 6 »  |
| rubro pleno . . . . .                                   | 6 à 10 » |
| Palinuri (R. S.) . . . . .                              | 2 »      |
| <i>PROSTANTHERA</i> lasianthos (Lab.) . . . . .         | 1 à 2 »  |
| rotundifolia (R. Br.) . . . . .                         | 1 50     |
| violacea (R. Br.) . . . . .                             | 1 »      |
| <i>PROTEA</i> argentea (L.) . . . . .                   | 3 à 6 »  |
| cinerea . . . . .                                       | 2 50     |
| coccinea . . . . .                                      | 6 »      |
| conferta . . . . .                                      | 3 »      |
| conifera . . . . .                                      | 5 »      |
| cordata . . . . .                                       | 10 »     |
| cynaroides . . . . .                                    | 4 à 8 »  |
| incompta (R. B.) . . . . .                              | 3 »      |
| nerifolia . . . . .                                     | 5 »      |
| pallens (Linn.) . . . . .                               | 2 »      |
| pinifolia (L.) <i>Aunax pinifolia</i> (Berg.) . . . . . | 4 »      |
| plumosa (Ait.) . . . . .                                | 5 »      |
| saligna (L.) . . . . .                                  | 3 50     |
| umbellata . . . . .                                     | 4 »      |
| <i>PSORALEA</i> pinnata . . . . .                       | 1 »      |
| sempervirens . . . . .                                  | 1 »      |
| <i>PSOROPHYTUM</i> undulatum (Spach.) . . . . .         | 3 »      |
| <i>PULTENÆA</i> candida (Lood.) . . . . .               | 1 50     |
| flexilis (DC.) . . . . .                                | 1 50     |
| retusa (Sm.) . . . . .                                  | 1 50     |
| subumbellata (Hook.) . . . . .                          | 1 »      |
| tenuifolia (R. Br.) . . . . .                           | 1 »      |
| villosa (Sims.) . . . . .                               | 2 »      |
| <i>PUNICA</i> granatum (L.) . . . . .                   | 1 »      |
| sujets en tige . . . . .                                | 6 à 10 » |
| lutea . . . . .   | 1 à 3 »  |
| fl. pleno . . . . .                                     | 2 »      |
| sujets en tige . . . . .                                | 5 à 25 » |
| prolifera . . . . .                                     | 3 »      |
| nana (L.) . . . . .                                     | 3 »      |
| <i>QUERCUS</i> rugosa (Nee) . . . . .                   | 3 »      |
| <i>RAPHIOLEPIS</i> indica (Lindl.) . . . . .            | 1 50     |
| <i>RHEXIA</i> elegans? . . . . .                        | 2 »      |
| <b>RHODODENDRON</b>                                     |          |
| arborescens . . . . .                                   | 2 à 8 »  |
| album (Bot. Reg.) . . . . .                             | 3 à 15 » |
| acuminatum . . . . .                                    | 3 à 15 » |

| <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr. c.   |
|---|----------|
| <i>RHODODENDRON</i> arborescens angustum . . . . .  | 4 »      |
| Batterseanum . . . . .  | 4 »      |
| Burggravianum . . . . .   | 3 »      |
| Catherine II . . . . .  | 4 »      |
| Chelsoni . . . . .  | 2 à 3 »  |
| cinerea . . . . .   | 3 »      |
| CLITO . . . . .   | 5 »      |
| Cronenbergensis . . . . .   | 20 »     |
| Cunninghami . . . . .   | 3 à 10 » |
| album . . . . .   | 6 »      |
| elegans . . . . .   | 10 »     |
| diadematum . . . . .  | 6 »      |
| Drummondii . . . . .  | 4 »      |
| electum . . . . .   | 2 à 5 »  |
| elegans . . . . .   | 2 à 3 »  |
| Emilie . . . . .  | 5 »      |
| elegantissimum . . . . .  | 3 »      |
| fulgens . . . . .   | 3 »      |
| FORKELLI . . . . .  | 5 à 25 » |
| Fromontianum . . . . .  | 2 à 6 »  |
| GRAD DUC DE BADEN . . . . .   | 5 à 15 » |
| grandissimum . . . . .  | 4 »      |
| HÄMMERLINI . . . . .  | 5 à 20 » |
| Impératrice Josephine . . . . .   | 4 à 6 »  |
| JOSCHTI . . . . .   | 6 à 25 » |
| Ketleri . . . . .   | 5 »      |
| lacteo um superbum . . . . .  | 4 à 6 »  |
| Lady Warender . . . . .   | 4 »      |
| Brougham . . . . .  | 4 »      |
| Lexoviensis . . . . .   | 3 à 8 »  |
| macranthum . . . . .  | 4 à 10 » |
| magniflorum . . . . .   | 3 »      |
| magnoliæfolium . . . . .  | 4 à 6 »  |
| MAY (de) . . . . .  | 10 »     |
| MARSHAL WILDER . . . . .  | 6 »      |
| MULLREI . . . . .   | 6 »      |
| MUZIANUM . . . . .  | 6 »      |
| nivaticum . . . . .   | 3 »      |
| Noblium . . . . .   | 4 »      |
| NEUMANNII (Nob.) . . . . .  | 5 à 10 » |
| OCTAVIE MOREL . . . . .   | 10 »     |
| OTTOI . . . . .   | 20 »     |
| pallidum (Rh.) <i>Carciolæ f. (B.)</i> . . . . .  | 2 à 4 »  |
| phœniceum . . . . .   | 5 »      |
| Portolatum . . . . .  | 6 à 10 » |
| PRINCE DE JOINVILLE . . . . .   | 8 »      |
| purpureum . . . . .   | 3 à 6 »  |
| pyramidalis . . . . .   | 4 à 5 »  |
| QUEEN VICTORIA . . . . .  | 4 à 15 » |
| ROCHETUILLE (CAM. DE) . . . . .   | 8 »      |
| Roi des pourpres . . . . .  | 3 à 6 »  |
| R. lisoni . . . . .   | 4 à 20 » |
| rubiculis . . . . .   | 2 à 5 »  |
| rubrum pallidum . . . . .   | 2 à 5 »  |
| rugosum . . . . .   | 8 »      |
| Russelianum . . . . .   | 4 »      |
| Smithii . . . . .   | 5 à 10 » |
| album . . . . .   | 3 »      |
| elegans . . . . .   | 4 »      |
| strictum . . . . .  | 8 »      |
| superbum . . . . .  | 3 à 8 »  |
| Triumphans Londinensis . . . . .  | 3 »      |
| Triomphe d'Anvers . . . . .   | 3 »      |
| venustum . . . . .  | 10 à 20  |
| Wiltoni . . . . .   | 3 »      |
| Altaclarens (Lindl.) . . . . .  | 3 à 10 » |
| campanulatum (Wall.) . . . . .  | 3 à 10 » |
| cartonianum (DC.) . . . . .   | 8 »      |
| caucasicum (Pall.) . . . . .  | 4 à 8 »  |
| album . . . . .   | 5 à 10 » |
| cinnamomeum (Lindl.) . . . . .  | 6 à 20 » |
| Tarreri . . . . .   | 4 »      |
| Gowenianum (B. F. G.) . . . . .   | 3 à 8 »  |
| Gypsoni . . . . .   | 15 à 20  |
| Une collection de Rhododendron arborescens de 15 variétés, à notre choix  |          |
| Eine Sammlung von 25 Sorten Rhododendron arborescens, nach unserer Wahl . . . . .                                 |          |
| 25 »  |          |
| Une collection de 25 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl . . . . . |          |
| 37 50   |          |
| Des individus forts d'un à deux mètres  |          |
| Stücke Exemplar von 3 bis 6 Fuß . . . . .   |          |
| 10 à 25   |          |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>                       | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>              | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>   | <i>fr. c.</i> |
|---|---------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| RIBES albidum . . . . .                           | 2 »           | THEA viridis (Linn.) . . . . .           | 2 »           | VERBENA rosa elegans. . . . . | » 50          |
| du Chili, nouveau. . . . .                        | 5 »           | Bohea (Linn.) . . . . .                  | 2 »           | odorata . . . . .             | 1 »           |
| SALVIA azurea (Lam.) . . . . .                    | 1 50          | THERMOPSIS laburnifolia (Don.) . . . . . | 4 »           | splendens . . . . .           | 1 »           |
| cardinalis (Humb.) . . . . .                      | » 50          | THOMASIA microcarpa . . . . .            | 3 »           | superba . . . . .             | » 50          |
| coccinea (L.) . . . . .                           | » 50          | TREMANDRA floribunda . . . . .           | 2 50          | Teucrioides . . . . .         | 1 »           |
| fulgens (Cav.) . . . . .                          | 1 50          | TRISTANIA laurina (R. Br.) . . . . .     | 3 »           | atrosanguinea. . . . .        | » 50          |
| Grahami (DS.) . . . . .                           | » 50          | neriifolia (R. Br.) . . . . .            | 2 50          | foliis variegatis . . . . .   | 1 »           |
| patens (Cav.) . . . . .                           | 1 50          | ULIX hybernicus (DS.) . . . . .          | 1 50          | sulphurea . . . . .           | » 50          |
| splendens (Ker.) . . . . .                        | 1 50          | nepalensis . . . . .                     | 1 »           | vitabilis . . . . .           | » 50          |
| tricolor var s. officinalis . . . . .             | 1 »           |  |               | Voltaire . . . . .            | » 75          |
| SCUTELLARIA splendens (Link.) . . . . .           | 1 à 2 »       |  |               | Zimmermanni . . . . .         | » 75          |
| SELAGO Gillii (Bot. Reg.) . . . . .               | 2 »           |  |               |                               |               |
| SEMPERVIVUM arboreum. . . . .                     | 1 50          |  |               |                               |               |
| variegatum . . . . .                              | 1 50          |  |               |                               |               |
| aureum . . . . .                                  | 1 »           |  |               |                               |               |
| capitatum ? . . . . .                             | 2 »           |  |               |                               |               |
| tabulaeformis . . . . .                           | 3 »           |  |               |                               |               |
| SIPHOCAMPYLUS betulæfolius . . . . .              | 1 50          |  |               |                               |               |
| bicolor (Sims.) . . . . .                         | 1 »           |  |               |                               |               |
| cordatus. . . . .                                 | 1 50          |  |               |                               |               |
| duplo serratus . . . . .                          | 1 50          |  |               |                               |               |
| lantaniifolius . . . . .                          | 1 »           |  |               |                               |               |
| SPARMANNIA suberosa (Hort.) . . . . .             | 2 »           |  |               |                               |               |
| SPHÆROLOBUM vimineum (Lm.) . . . . .              | 1 »           |  |               |                               |               |
| STATICE arborea (Brouss.) . . . . .               | 5 à 25 »      |  |               |                               |               |
| Dicksonia . . . . .                               | 3 à 5 »       |  |               |                               |               |
| grandiflora (Hérit.) . . . . .                    | 1 50          |  |               |                               |               |
| monopetala (Linn.) . . . . .                      | 1 50          |  |               |                               |               |
| STYPHELIA tubiflora (Smith.) . . . . .            | 3 »           |  |               |                               |               |
| viridiflora . . . . .                             | » »           |  |               |                               |               |
| STYLIDIUM adnatum (R. B.) . . . . .               | 1 »           |  |               |                               |               |
| androsacea . . . . .                              | 4 »           |  |               |                               |               |
| Brunonianum (Benth.) . . . . .                    | 1 »           |  |               |                               |               |
| Drumondi . . . . .                                | 10 »          |  |               |                               |               |
| fruticosum . . . . .                              | 1 »           |  |               |                               |               |
| SWAINSONIA coronillæfolia alba . . . . .          | 1 50          |  |               |                               |               |
| rubra . . . . .                                   | 1 75          |  |               |                               |               |
| TASMANNIA aromatica . . . . .                     | 12 »          |  |               |                               |               |
| TAXUS capensis (Lin.) . . . . .                   | 2 »           |  |               |                               |               |
| nucifera (Linn.) <i>Podocarpus nucif.</i> . . . . | 2 à 3 »       |  |               |                               |               |
| TEMPLETONIA retusa (R. Br.) . . . . .             | 2 »           |  |               |                               |               |
| glauca (Sims.) . . . . .                          | 1 50          |  |               |                               |               |
| spec. nova ? . . . . .                            | 10 »          |  |               |                               |               |
| TETRANEMA mexicana. <i>Penstemon pri-</i>         |               |  |               |                               |               |
| <i>muloides.</i> . . . . .                        | 1 »           |  |               |                               |               |

VERBENA

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| alba grandiflora . . . . .      | 1 50 |
| pura . . . . .                  | » 75 |
| Anais. . . . .                  | » 50 |
| Andromaque . . . . .            | 1 »  |
| Araniana . . . . .              | » 50 |
| Barkerii . . . . .              | 1 »  |
| Beauté suprême . . . . .        | 1 »  |
| bicolor . . . . .               | » 50 |
| Braunii . . . . .               | » 50 |
| Buisti . . . . .                | » 50 |
| roseo superba . . . . .         | 1 »  |
| Carli . . . . .                 | » 50 |
| Comte de Paris . . . . .        | 1 »  |
| Cunninghami . . . . .           | » 50 |
| Duchesse d'Orléans . . . . .    | 1 »  |
| Elfordensis . . . . .           | » 50 |
| Empereur du Maroc . . . . .     | 1 »  |
| fine scarlet . . . . .          | » 75 |
| Gasiana . . . . .               | 1 »  |
| Hebée . . . . .                 | » 75 |
| igneæ . . . . .                 | 1 50 |
| Imperatrice Joséphine . . . . . | 1 50 |
| incisa . . . . .                | 1 »  |
| lilacina grandiflora . . . . .  | » 50 |
| majestica . . . . .             | » 75 |
| mamaliana . . . . .             | » 50 |
| maxima . . . . .                | » 50 |
| Musiana . . . . .               | » 50 |
| nec plus ultra . . . . .        | » 50 |
| Paul . . . . .                  | » 50 |
| Phoenix . . . . .               | 1 »  |
| incisa . . . . .                | » 50 |
| sabina . . . . .                | » 50 |
| Regeli . . . . .                | 1 »  |

|  |              |
|--|--------------|
| Une collection de 20 <i>Verbena</i> bien as- |              |
| sortis. Eine Sammlung von 20 gut as-         |              |
| sortierten Sorten. . . . .                   | 9 »          |
| Puis une collection de 15 variétés à         |              |
| notre choix. . . . .                         | 6 »          |
| Une collection de 30 variétés à notre        |              |
| choix . . . . .                              | 15 »         |
| VERONICA salicifolia . . . . .               | 2 »          |
| speciosa . . . . .                           | 1 à 1 50     |
| species de la Nouvelle-Zélande . . . . .     | 2 »          |
| VIBURNUM dentatum (L.) . . . . .             | 1 50         |
| odoratissimum (Ker.) . . . . .               | 2 »          |
| Tinus (W.) . . . . .                         | 75 c. à 5 f. |
| foliis variegatis . . . . .                  | 1 à 8 »      |
| WESTRINGIA angustifolia (R. Br.) . . . . .   | 2 »          |
| triphylla (Ait.) . . . . .                   | 2 »          |
| WITSENIA corymbosa (Sm.) . . . . .           | 4 »          |
| XENOPOMA obovata (W.) . . . . .              | 1 50         |
| YUCCA aloifolia (L.) . . . . .               | 3 »          |
| foliis variegatis . . . . .                  | 4 à 40 »     |
| flaccida (Haw.) . . . . .                    | 4 »          |
| glaucescens (Haw.) . . . . .                 | 3 »          |
| gloriosa (L.) . . . . .                      | 3 »          |
| recurva (Salisb.) . . . . .                  | 4 »          |
| ZIERIA trifoliata (Sm.) . . . . .            | 2 »          |
|  |              |
| Nous offrons en outre :                      |              |
| 1° Une collection de 50 plantes, en 50       |              |
| espèces, à notre choix . . . . .             | 25 »         |
| 2° Une collection de 75 plantes, en 75       |              |
| espèces . . . . .                            | 45 »         |
| 3° Une collection de 100 plantes, en         |              |
| 100 espèces . . . . .                        | 70 »         |

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPEREE ET D'ORANGERIE.

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                                 | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>                    | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>               | <i>fr. c.</i> |
|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
| <i>Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.</i>  |               |  |               |   |               |
| <i>Die mit * bezeichneten Sorten sind für's warme Haus.</i> |               |  |               |   |               |
| * ÆSCHYNANTHUS Boschianus . . . . .                         | 3 »           | BIGNONIA jasminifolia (H. B.) . . . . .        | 2 »           | * COMBRETUM purpureum . . . . .           | 6 à 8 »       |
| * grandiflora (Spr.). <i>Incarvillea pa-</i>                |               | Pandorana . . . . .                            | 2 50          | ECCREMOCARPUS scaber (R. P.) . . . . .    | 1 »           |
| rasitica (Roxb.) . . . . .                                  | 3 »           | speciosa . . . . .                             | 1 à 2 »       | * ECHITES purpurea . . . . .              | 7 à 10 »      |
| * Roxburghii. <i>A. macrophyllus</i> . . . . .              | 4 »           | Turedeana . . . . .                            | 1 à 2 »       | * picta . . . . .                         | 2 à 5 »       |
| ALSTROEMERIA acutifolia . . . . .                           | 2 »           | * venusta. <i>Tecoma venusta.</i> . . . .      | 3 »           | * FICUS repens (Roxb.) . . . . .          | » 75          |
| AMPHICOME arguta (Royale) . . . . .                         | 1 »           | BILLARDIERA scandens . . . . .                 | 1 »           | * GLORIOSA superba (W.) . . . . .         | 2 à 3 »       |
| ARGYREA nervosa nova . . . . .                              | 10 »          | * BOUGAINVILLEA spectabilis (Willd.) . . . . . | 2 à 3 »       | GYCINE brachyphylla? <i>Brachybotrya?</i> | 2 »           |
| * ARISTOLOCHIA barbata (Jacq.) . . . . .                    | 2 »           | BRACHYSEMA latifolium (R. Br.) . . . . .       |               | ebimensis coccinea . . . . .              | 3 »           |
| Gigas . . . . .   | 3 »           | undulatum (Ker.) . . . . .                     | 5 »           | HARDENBERGIA monophylla (Bth) Gly-        |               |
| * hyperborea (Sweet) . . . . .                              | 2 »           | * BRUGMANIA floribunda. <i>Juvanuloa</i>       |               | cine bimaculata (Hort.) . . . . .         | 1 »           |
| * labiosa (Ker.) . . . . .                                  | 2 »           | aurantiaca . . . . .                           | 3 »           | Comptoniana (Bth) . . . . .               | 1 »           |
| * saccata . . . . .   | 1 à 3 »       | CADSURA japonica (Van Sieb.) . . . . .         | 2 »           | macrophylla (Benth.) . . . . .            | 2 »           |
| sempervirens . . . . .                                      | 1 50          | CAJOPHORA lateritia ( <i>Loasa</i> ) . . . . . | » 50          | ovata (Benth.) . . . . .                  | 2 »           |
| tomentosa . . . . .   | 1 à 2 »       | CANDOLLEA Cunninghami (Hort.) . . . . .        | 2 »           | HIBBERTIA volubilis (Andr.) . . . . .     | 1 »           |
| * ASCLEPIAS carnosa (L.). <i>Hoye carn.</i>                 |               | * CEROPEGIA elegans (Hook.) . . . . .          | 1 »           | crenata (Andr.), <i>grossulariæfolia</i>  |               |
| (R. B.) . . . . .   | 1 à 2 »       | * africana (R. B.) . . . . .                   | 1 50          | (Salisb.) . . . . .                       | 2 »           |
| * coccinea . . . . .  | 2 à 3 »       | CHORIZEMA cordatum (Lindl.) . . . . .          | 1 »           | * IPOMEA Horsfalliæ (Hook.) . . . . .     | 2 à 4 »       |
| * pendula . . . . .   | 3 »           | illicifolium (Lab.) . . . . .                  | 1 »           | * Leari . . . . .                         | 1 50          |
| * BANISTERIA tenuis . . . . .                               | 1 50          | rhombeum (R. Br.) . . . . .                    | » 75          | mexicana . . . . .                        | 1 »           |
| * argentea . . . . .  | 5 »           | triangulare (Lindl.) . . . . .                 | 2 à 5 »       | pendula . . . . .                         | 1 »           |
| BASILLA tuberosa . . . . .                                  | 1 50          | CLEMATIS azurea (Sieb.) . . . . .              | 1 50          | * Rollissonii . . . . .                   | 3 »           |
| BATATAS betacea. <i>Ipomea Humboldt</i>                     |               | bicolor (BM.) . . . . .                        | 1 50          | rubra cœrulea . . . . .                   | 1 »           |
| Wildenowi . . . . .   | 1 »           | florida (Th.), flore pleno . . . . .           | 2 »           | Selloi . . . . .                          | 1 »           |
| BAUERSIA maculata? . . . . .                                | 2 »           | insulensis . . . . .                           | 4 à 6 »       | species de la Chine . . . . .             | 5 »           |
| * BEAUMONTIA grandiflora . . . . .                          | 3 »           | nepalensis (DC.) . . . . .                     | 1 50          | de St.-Thomas . . . . .                   | 10 »          |
| * BAUHINIA macrophylla . . . . .                            | 15 »          | pinnata . . . . .                              | 2 »           | * JASMINUM Azoricum . . . . .             | 1 »           |
| BIGNONIA capensis . . . . .                                 | 1 »           | tubulosa mongolica . . . . .                   | 10 à 15       | grandiflorum . . . . .                    | 1 à 3 »       |
| capreolata (L.) . . . . .                                   | 1 »           | CLERODENDRON splendens (Hugel) . . . . .       | 2 à 4 »       | heterophyllum (Wall.) . . . . .           | 1 50          |
| heterophylla (W.). <i>Kerere (Aubl.)</i> . . . . .          | 2 »           | COBÆA scandens (Cav.) . . . . .                | » 50          | nepalense (Spr.) . . . . .                | 1 50          |
|   |               | stipularis (Hort.) . . . . .                   | » 75          | * Sambac fl plena . . . . .               | 1 à 3 »       |
|   |               | * COLUMNEA scandens . . . . .                  | 2 »           | Wallichianum (Lindl.) . . . . .           | 1 50          |
|   |               | * COMBRETUM Afzeli (Don.) . . . . .            | 6 à 8 »       | KENNEDYA Marryatiana (Lindl.) . . . . .   | 3 »           |
|   |               | * macrophyllum (Roxb.) . . . . .               | 6 »           | nigricans (Lindl.) . . . . .              | 1 50          |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr. c.  | <i>La pièce. Das Stück.</i>               | fr. c.  | <i>La pièce. Das Stück.</i>   | fr. c.   |
|---|---------|---|---------|---|----------|
| KENNEDYA OBLONGATA (Lem.). <i>Ken nedy</i> <i>Baumannii</i> . . . . .               | 2 50    | PASSIFLORA cœrulea (L.). . . . .          | 1 50    | ROSA Roi des Banks . . . . .  | 1 »      |
| prostrata (R. B.). <i>Glycine coccin.</i> (C.)                                      | 1 50    | * <i>Herbertiana</i> (Ker.) . . . . .     | 1 50    | * <i>RUBUS japonicus</i> . . . . .                                    | 5 »      |
| rubiunda (Vent.) . . . . .  | 1 »     | * <i>holosericea</i> . . . . .            | 1 50    | molucanus (Linn.) . . . . .   | 2 »      |
| splendens nob. . . . .  | 2 »     | * <i>Kermesina</i> (L. et O.) . . . . .   | 1 50    | smilacifolius . . . . .   | 4 »      |
| spectabilis . . . . .   | 2 »     | * <i>Lemichéziana</i> . . . . .           | 5 »     | SOLLYA heterophylla (Lindl.). . . . .                                 | 1 »      |
| undulata . . . . .  | 2 »     | * <i>linearis</i> . . . . .               | 1 à 2 » | salicifolia . . . . .   | 1 50     |
| LOMALIA laurifolia . . . . .  | 2 »     | * <i>Londonia</i> (Baum.) . . . . .       | 1 50    | * <i>STIGMATOPHYLLUM aristatum</i> (Liavt.)                           | 2 »      |
| LONCERA japonica . . . . .  | 1 »     | * <i>Neillii</i> . . . . .                | 2 »     | TAMUS Ephantipes . . . . .  | 4 à 60 » |
| LOPHOSPERMUM scandens (B. M.), eru-<br>bescens (Don.) . . . . .                     | 1 »     | * <i>palmata</i> (Lodd.) . . . . .        | 2 »     | THUNBERGIA alata . . . . .  | 1 »      |
| Hendersonii . . . . .   | 3 »     | * <i>Princeps</i> (Lodd.) . . . . .       | 1 50    | aurantiaca . . . . .  | 1 »      |
| atrosanguineum (Zucc.). <i>Rodochi-</i><br>ton volubile (Zucc.) . . . . .           | 1 »     | * <i>racemosa</i> . . . . .               | 1 50    | chrysops . . . . .  | 2 à 3 »  |
| MANDEVILLEA suaveolens . . . . .  | 1 à 2 » | * <i>quadrangularis</i> (Linn.) . . . . . | 2 »     | coccinea (Wallich) . . . . .  | 1 50     |
| * <i>MANETTIA bicolor</i> . . . . .   | 2 »     | * <i>sanguinea</i> . . . . .              | 2 »     | Freyeri . . . . .   | 1 »      |
| cordifolia (Mart.) . . . . .  | 1 »     | suberosa . . . . .                        | 3 »     | grandiflora (Roxb.) . . . . .   | 1 50     |
| splendens . . . . .   | 3 »     | PHASEOLUS Caracalla (Linn.) . . . . .     | 2 »     | Hawteyana (Wall.) . . . . .   | 2 »      |
| MAURANDIA Barckleyana (Bot. Mag.) .   | » 50    | PHILIBERTIA grandiflora . . . . .         | 1 »     | species nova . . . . .  | 3 »      |
| Laccayana . . . . .   | 1 »     | PHYSIANTHUS undulatus (Hort.) . . . . .   | 2 »     | TROPEOLUM lobianum . . . . .  | 1 50     |
| purpurea grandiflora . . . . .  | 1 50    | * <i>PIPER aromaticum</i> . . . . .       | 2 »     | minus (L.), flore pleno . . . . .                                     | 1 50     |
| semperflorens (Jacq.) . . . . .   | » 50    | * <i>flexuosum</i> . . . . .              | 2 »     | pentaphyllum (Lam.). <i>Chymocarp.</i><br>pentaphyll (Don.) . . . . . | » 75     |
| flore albo . . . . .  | » 75    | * <i>nigrum</i> . . . . .                 | 1 50    | tricolorum (Sweet.) . . . . .   | 1 à 4 »  |
| MEDEOLA asparagoides (L.). <i>Myrsiphy-</i><br>llum asparagoides (Willd.) . . . . . | 1 50    | * <i>POTHOS undulata</i> . . . . .        | 5 »     | TWEEDIA cœrulea (Sweet.) . . . . .                                    | 1 »      |
| MICANTIA senceioides . . . . .  | 1 »     | * <i>PTERIS flexuosa</i> . . . . .        | 2 à 3 » | ZICHYA BAUMANNI (Lem.) . . . . .                                      | 2 »      |
| MIMOSA prostrata . . . . .  | 3 »     | RHODOCHITON volubile . . . . .            | 1 »     | floribunda . . . . .  | 8 à 12 » |
| * <i>MORINDA odorata?</i> . . . . .   | 2 »     | Rosa Banksiana alba plena . . . . .       | 2 »     | rotundifolia . . . . .  | 15 »     |
| MUTISIA speciosa (Hook.) . . . . .  | 2 »     | grandiflora alba plena . . . . .          | 2 »     | Une collection de 15 espèces, à notre<br>choix . . . . .              | 15 »     |
| PASSIFLORA edulis (Sims.) . . . . .   | 1 50    | lutea plena . . . . .                     | 1 50    | Une collection de 20 espèces, à notre<br>choix . . . . .              | 25 »     |
|   |         | pallida . . . . .                         | 1 »     |   |          |
|   |         | plena . . . . .                           | 1 »     |   |          |
|   |         | multiflora plena . . . . .                | 1 »     |   |          |
|   |         | purpurea plena . . . . .                  | 1 »     |   |          |

## CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANÆ.

| <i>La pièce. Das Stück.</i>          | fr. c.  | <i>La pièce. Das Stück.</i>             | fr. c.   | <i>La pièce. Das Stück.</i>      | fr. c.   |
|--------------------------------------|---------|---|----------|----------------------------------|----------|
| ARECA Catechu. (Willd.). . . . .     | 25      | Cocos Lapidea . . . . .                 | 40       | PANDANUS graminifolius . . . . . | 5 à 15   |
| pinanga . . . . .                    | 50 à 60 | oleracea . . . . .                      | 25       | inermis . . . . .                | 30       |
| rubra (Boyr.) . . . . .              | 10 à 15 | species N° 1, c. . . . .                | 150      | pygmeus . . . . .                | 60       |
| BACTRIS setosa . . . . .             | 10 à 30 | CORYPHA australis, forte . . . . .      | 370      | utilis . . . . .                 | 25 à 130 |
| BRAHIA dulcis (Mart.), très-fort . . | 300     | miraguana, charmante espèce . .         | 20 à 25  | PHOENIX dactilifera . . . . .    | 3 à 25   |
| CALAMUS Draco (Willd.) . . . . .     | 70      | CYCAS circinalis . . . . .              | 30 à 60  | spinosa . . . . .                | 60       |
| CARLUDOWIGIA angustifolia . . . . .  | 25      | revoluta . . . . .                      | 10 à 80  | PINANGA latisepta . . . . .      | 30       |
| latifolia . . . . .                  | 25 à 30 | species N° 1 . . . . .                  | 100      | SABAL Adansonii . . . . .        | 1 à 15   |
| palmata . . . . .                    | 10 à 20 | N° 2 . . . . .                          | 100      | SAGUS farinifera . . . . .       | 100      |
| CARYOTA urens (Linn.) . . . . .      | 35      | DIPLOTEIA martinicensis . . . . .       | 120      | ZALACEA asamica . . . . .        | 20 à 30  |
| CHAMÆDorea elegans . . . . .         | 15 à 35 | ELAIS guienensis . . . . .              | 15       | ZAMIA horrida . . . . .          | 40 à 100 |
| elatior . . . . .                    | 70      | ELATE sylvestris . . . . .              | 20 à 25  | integrifolia . . . . .           | 50       |
| Schiedeana . . . . .                 | 5 à 15  | EUTERPE globosa. <i>Areca rubra</i> . . | 10 à 15  | lanuginosa . . . . .             | 40 à 100 |
| simplicifrons . . . . .              | »       | FULCHIRONIA senegalensis . . . . .      | 50 à 150 | muricata . . . . .               | 15 à 20  |
| CHAMÆROPS excelsa (Thunb.) . . . .   | 10 à 30 | GUILIELM speciosa . . . . .             | 80       | pumila . . . . .                 | 40       |
| humilis (Linn.) . . . . .            | 3 à 10  | LATANIA chinensis, forte . . . . .      | 300      | pungens . . . . .                | 40 à 100 |
| histris (Fras.) . . . . .            | 15 à 30 | rubra . . . . .                         | 50       | spiralis . . . . .               | 60       |
| Palmetto (Mich.) . . . . .           | 15 à 30 | OREODOXIA regia . . . . .               | 40       | tridendata . . . . .             | 70       |
| Cocos chilenses . . . . .            | 8 à 30  | PALMIER nouveau de l'Honduras . .       | 60 à 100 |                                  |          |
| flexuosa . . . . .                   | 60      | PANDANUS amaryllifolius . . . . .       | 8 à 20   |                                  |          |

## FILICES.

| <i>La pièce. Das Stück.</i>  | fr. c. | <i>La pièce. Das Stück.</i>                | fr. c.  | <i>La pièce. Das Stück.</i>                 | fr. c.  |
|--|--------|--|---------|---|---------|
| ACROSTICHUM alcicorne (Sw.) . . . .  | 2 »    | ASPIDIUM Adiantum nigrum . . . .           | » 50    | longère en arbre . . . . .                  | 20 à 50 |
| * <i>aureum</i> (L.) . . . . .   | 2 50   | biserratum (Presl.) . . . . .              | 2 »     | † <i>CYSTOPTERIS fragilis</i> (Desu.) . . . | 1 50    |
| † <i>ADIANTUM assimile</i> (Sw.). <i>A. tigrinum</i><br>(Labil.) . . . . . | 3 »    | † <i>germanicum</i> (Weis.) . . . . .      | 1 »     | DAVALLIA canariensis . . . . .              | 2 »     |
| capillus veneris . . . . .   | 1 »    | furcatum (Thunb.) . . . . .                | 3 »     | DICKSONIA Adiantoides . . . . .             | 2 »     |
| concinnum (H.) . . . . .   | 2 50   | * <i>Ruta muraria</i> (Lin.) . . . . .     | 1 »     | Davallioides . . . . .                      | 5 »     |
| formosum (R. Br.) . . . . .  | 3 »    | † <i>septentrionale</i> (Sw.) . . . . .    | 1 »     | pilosiuscula . . . . .                      | 2 »     |
| Moritzianum . . . . .  | 4 »    | † <i>trichomanes</i> (L.) . . . . .        | » 50    | rubiginosa . . . . .                        | 6 »     |
| † <i>pedatum</i> . . . . .   | 2 »    | † <i>ATHYRIUM filix femina</i> (Roth.) . . | 1 »     | DIPLAZIUM decussatum? . . . . .             | 4 »     |
| pubescens (Schk.) . . . . .  | 1 »    | BLECHNUM glandulosum . . . . .             | 2 »     | * <i>DOODIA aspera</i> (R. B.) . . . . .    | 1 50    |
| * <i>tenerum</i> (Sw.) . . . . .   | 2 »    | * <i>gracile</i> (Kaulf.) . . . . .        | 3 »     | distans . . . . .                           | 2 »     |
| * <i>trapeziforme</i> (L.) . . . . .                                       | 3 »    | * <i>lanceolatum</i> (Rud.) . . . . .      | 2 »     | rupestris . . . . .                         | » 50    |
| ANEIMIA collina (Radd.) . . . . .  | 2 »    | pteroides . . . . .                        | 2 »     | * <i>GYMNOGRAMME chrysophylla</i> (K.) .    | 6 »     |
| † <i>ASPIDIUM aculeatum</i> . . . . .                                      | 1 »    | CAMPILONEURUS decurrens . . . . .          | 10 à 20 | * <i>calomelanos</i> (Kaulf.) . . . . .     | 3 »     |
| brassiliense (Willd.) . . . . .  | 1 50   | CEROPTERIS sulphurea . . . . .             | 1 »     | lupulata? . . . . .                         | 1 50    |
| * <i>capense</i> (Willd.) . . . . .  | 3 »    | COENOPTERIS japonica (Thunb.) . .          | 2 »     | LYCOPodium alpinum (L.) . . . . .           | 1 »     |
| * <i>cuneatum</i> . . . . .  | 1 50   | CHEILANTHES micronema . . . . .            | 3 »     | * <i>apodum</i> (L.) . . . . .              | 3 »     |
| falcatum (Sw.) . . . . .   | 2 »    | pteridioides . . . . .                     | 2 »     | brasiliense . . . . .                       | 1 »     |
| * <i>foeniscei</i> . . . . .   | 2 »    | tomentosus . . . . .                       | 1 »     | * <i>circinatum</i> . . . . .               | 1 »     |
| † <i>fragile</i> . . . . .   | 1 »    | viscosa . . . . .                          | 2 »     | * <i>cordifolium</i> . . . . .              | 1 »     |
| † <i>lonchitis</i> (Sw.) . . . . .   | 1 »    | CHRYOPTERIS lepidopoda . . . . .           | 3 »     | * <i>denticulatum</i> . . . . .             | 1 »     |
| † <i>marinum</i> . . . . .   | 1 50   | spherodocarpa . . . . .                    | 3 »     | † <i>Helveticum</i> . . . . .               | 2 »     |
|  |        | CYPOTIUM SCHIEDEI, magnifique . .          |         | † <i>selago</i> . . . . .                   | » 50    |



| <i>La pièce. Das Stück.</i>              | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>                  | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>                         | <i>fr. c.</i> |
|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
| † LYCOPODIUM selaginoides. . . . .       | 1 »           | * POLYPODIUM repens (W.). . . . .            | 3 »           | nach unserer Wahl. . . . .                          | 10 »          |
| * stoloniferum (Sw.) . . . . .           | 1 »           | † rhæticum (Linn.) . . . . .                 | 2 »           | <i>Les espèces de serre chaude convien-</i>         |               |
| MARGINARIA dimorpha . . . . .            | 3 »           | trifoliatum (Linn.) . . . . .                | 2 »           | <i>nent bien dans un local où l'on cultive</i>      |               |
| MICROSORUS irregularis . . . . .         | 3 »           | vacillare . . . . .                          | 3 »           | <i>les Orchidées des pays chauds. Leurs</i>         |               |
| † NEPHRODIUM dilatatum (Desv.) . . . . . | 1 »           | † vulgare (Linn.) . . . . .                  | » 50          | <i>feuillages délics se marient d'une ma-</i>       |               |
| † filix mas. (Desv.) . . . . .           | 1 »           | * PTERIS arguta (Willd.) . . . . .           | 3 »           | <i>nière très-agréable avec les formes lar-</i>     |               |
| † Oreopteris (Desv.) . . . . .           | 1 50          | * bianrita . . . . .                         | 6 »           | <i>ges et vigoureuses des dernières.</i>            |               |
| † Thelypteris (Desv.) . . . . .          | 1 »           | * chrysocarpa . . . . .                      | » 50          | <i>Les espèces marquées d'un * peuvent</i>          |               |
| * tuberosum . . . . .                    | 1 »           | * crenata (L.) . . . . .                     | 2 »           | <i>être cultivées en serre tempérée. Celles</i>     |               |
| NIPHOBOLUS chinensis. . . . .            | 5 »           | * falcata (R. B.) . . . . .                  | 0 »           | <i>marquées d'une † sont pour la pleine</i>         |               |
| rupestris. . . . .                       | 4 »           | * flexuosa . . . . .                         | 2 »           | <i>terre. Celles sans marques doivent être</i>      |               |
| NOTOCHLENA pumila . . . . .              | 1 50          | * hastata . . . . .                          | 1 »           | <i>cultivées en serre chaude.</i>                   |               |
| † ONOCLEA sensibilis . . . . .           | 1 »           | * leptophylla (Sw.) . . . . .                | 3 »           | <i>Die sich im warmen cultivierende eignen sich</i> |               |
| † SMUNDA interrupta . . . . .            | 4 »           | * longifolia . . . . .                       | 2 »           | <i>hauptsächlich zur Vermischung mit den tropi-</i> |               |
| † regalis . . . . .                      | 2 »           | * nemoralis (W.) . . . . .                   | 2 »           | <i>schen Orchideen; ihr zartes Laub macht einen</i> |               |
| † PHOROLOPUS crispus. . . . .            | 1 »           | * serulata (Willd.) . . . . .                | 2 »           | <i>sehr angenehmen Contrast mit den kräftigen</i>   |               |
| * POLYPODIUM aureum (L.) . . . . .       | 5 »           | stenophylla . . . . .                        | 3 »           | <i>Formen der Legtern.</i>                          |               |
| † calcareum. . . . .                     | 1 50          | † SCOLOPENDRIUM officinarum (L.) . . . . .   | » 75          | <i>Die mit * bezeichneten Sorten können im</i>      |               |
| * crassifolium (W.) . . . . .            | 3 »           | † cristatum . . . . .                        | 2 »           | <i>temperirten Haus cultivirt werden Die mit</i>    |               |
| † dryopteris (L.) . . . . .              | 1 »           | † undulatum . . . . .                        | 1 »           | <i>† bezeichnet sind für in's freie Land. Die</i>   |               |
| * effusum (Sw.) . . . . .                | 2 »           | † STRUTHIOPTERIS germanica (W.) . . . . .    | 1 50          | <i>ohne Zeichen sollen im warmen Haus culti-</i>    |               |
| harpeoides . . . . .                     | 3 »           | * WOODWARDIA Onocleoides (Willd.) . . . . .  | 2 »           | <i>virt werden.</i>                                 |               |
| longifolium. . . . .                     | 3 »           | <i>Une collection de 10 espèces, à notre</i> |               |   |               |
| paradisæ (Willd.) . . . . .              | 1 »           | <i>choix. Eine Sammlung von 10 Sorten,</i>   |               |   |               |

## ORCHIDEE.

| <i>La pièce. Das Stück.</i>                 | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>              | <i>fr. c.</i> | <i>La pièce. Das Stück.</i>                              | <i>fr. c.</i> |
|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| ACROPERA Loddigesii (Lindl.). Maxil-        |               | EPIDENDRON crassifolium . . . . .        | 20 à 30       | ONCIDIUM Species N° 1. S. de l'Hon-                      |               |
| laria galeata (Lodd.) . . . . .             | 5 »           | cuspidatum (Lodd.) . . . . .             | 5 »           | duras . . . . .  | 40 »          |
| luteola . . . . .                           | 7 à 10 »      | elongatum (Jacq.) . . . . .              | 2 »           | N° 2. . . . .  | 30 »          |
| ANGRÆCUM maculatum (Lindl.) . . . . .       | 5 »           | polybulbon (Sw.) . . . . .               | 4 »           | N° 3. . . . .  | 50 »          |
| odoratissimum . . . . .                     | 12 à 15 »     | species du Mexique . . . . .             | 30 »          | N° 4. . . . .  | 50 »          |
| BIFRENNARIA atropurpurea. Maxillaria.       | 5 à 8 »       | ERIA pubescens (Lindl.) . . . . .        | 10 »          | S. H. du Brésil . . . . .                                | 50 »          |
| BLETIA florida (R. Br.) . . . . .           | 5 »           | floribunda . . . . .                     | 15 »          | * PERISTERIA Barkeri (Bale) . . . . .                    | 10 »          |
| gracilis (Lindl.) . . . . .                 | » »           | rosea . . . . .                          | 15 »          | * elata (Hook.) . . . . .                                | 10 à 40       |
| hyacinthina (R. Br.) . . . . .              | 3 »           | stellata (Lindl.) . . . . .              | 10 »          | Species della Guera. . . . .                             | 80 à 100      |
| purpurea? . . . . .                         | 20 »          | GONGORA atropurpurea (Hook.) . . . . .   | 15 »          | * PHAJUS grandifolius (Lour.). Limodo-                   |               |
| verecunda (H. Kew.). Limodorum              |               | pallida . . . . .                        | 15 »          | rum Tankervilleæ (W.) . . . . .                          | 3 »           |
| altum (Jacq.) . . . . .                     | 4 »           | GRAMMATOPHYLLUM speciosum . . . . .      | » »           | PHYSOSIPHON Loddigesii . . . . .                         | 3 »           |
| Woodfordii . . . . .                        | 30 »          | GROBYA Amherstiae . . . . .              | 15 à 20       | PHOLIDOTA imbricata (Lindl.) . . . . .                   | 4 »           |
| BOLBOPHYLLUM saltatorium. . . . .           | 15 à 20       | HARWÆEGIA purpurea. . . . .              | 5 »           | * RENANTHERA coccinea (R. Br.) . . . . .                 | 10 »          |
| BRASSAVOLA glauca . . . . .                 | » »           | * HOEMARIA discolor . . . . .            | 3 »           | rosea? . . . . .   | 20 »          |
| venosa . . . . .                            | 5 à 10 »      | * LÆLIA acuminata . . . . .              | 40 »          | RODRIGUEZIA Barkeri (B. R.) . . . . .                    | 10 »          |
| BRASSIA caudata . . . . .                   | 8 à 12 »      | albida . . . . .                         | 20 »          | * SARCANTHUS rostratus (B. R.) . . . . .                 | 8 »           |
| CATTLEYA citrina (Lindl.) . . . . .         | 20 »          | anceps (Lindl.). Barkeriana . . . . .    | 15 à 30       | SCHOMBURGKIA crispa . . . . .                            | 25 à 40       |
| crispa (Lindl.) . . . . .                   | 12 à 20 »     | * LIPARIS foliosa (L. ndl.). CYMBIDIUM   |               | SOPHRONITIS cernua (B. R.) . . . . .                     | 20 »          |
| Forbesii (Lindl.) . . . . .                 | 5 »           | reflexum (R. Br.) . . . . .              | 15 »          | * STANHOPEA aurantia. . . . .                            | 40 »          |
| isopetala? C. Forbesii? . . . . .           | 5 »           | * MAXILLARIA aromatica (Grah.) . . . . . | 5 à 10 »      | contracta. . . . .                                       | 30 »          |
| piperita . . . . .                          | 20 »          | decolor (Lindl.) . . . . .               | 5 à 10 »      | eburnea . . . . .  | 8 à 12 »      |
| CIRRHÆA viridipurpurea (Lodd.) . . . . .    | 10 »          | densa . . . . .                          | 3 à 6 »       | grandiflora (Sw.) . . . . .                              | 10 »          |
| CYMBIDIUM aloifolium (Sw.) . . . . .        | 3 à 6 »       | * Deppei (Lodd.) . . . . .               | 5 à 10 »      | * insignis (B. M.) . . . . .                             | 6 à 12 »      |
| ensifolium (Sw.) . . . . .                  | 3 »           | * Harrisoniæ (Lindl.) . . . . .          | 1 »           | odoratissima . . . . .                                   | 20 »          |
| dependens (Bot. Cab.) . . . . .             | 20 »          | punctata (Lodd.) . . . . .               | 5 »           | quadricornis . . . . .                                   | 35 »          |
| purpuratum. . . . .                         | 20 à 25 »     | species ex Brass N° 1 . . . . .          | 50 »          | saccata . . . . .  | 20 »          |
| sinenses (Willd.) . . . . .                 | 5 »           | N° 3 du Mexique . . . . .                | 50 »          | * oculata (Sw.) . . . . .                                | 6 à 15 »      |
| * CYPRIPEDIUM insigne (Wall.) . . . . .     | 3 à 5 »       | squalens (R. Br.) Dendrobium squa-       |               | Wardii . . . . .   | 15 à 25       |
| * purpuratum . . . . .                      | 25 »          | lens (R. Br.) . . . . .                  | 3 »           | * STENORRHYNCHUS speciosus (B. M.).                      |               |
| * venustum (Wall.) . . . . .                | 5 à 10 »      | stapelioides (Lindl.) . . . . .          | 5 à 20 »      | Neottia speciosa (Hook.) . . . . .                       | 5 »           |
| CYRTOCHILUM maculatum (Lindl.) . . . . .    | » »           | tenuifolia . . . . .                     | 20 à 30       | TRICHOPELIA tortilis . . . . .                           | 20 à 30       |
| * CYRTOPODIUM Andersonii (R. Br.) . . . . . | » »           | tetragona (Lindl.) . . . . .             | 15 »          | VANILLA aromatica (H. K.) . . . . .                      | 20 »          |
| DENDROBIUM aggregatum (Lindl.) . . . . .    | 20 »          | * NEOTTIA picta (Sims.) . . . . .        | 3 »           | claviculata . . . . .                                    | 20 »          |
| Baringtonii. . . . .                        | » »           | ODONTOGLOSSUM grande . . . . .           | 50 à 80       | pomponia . . . . .                                       | 10 »          |
| buxifolium? . . . . .                       | 5 »           | membranaceum . . . . .                   | 15 à 25       | * ZYGOPETALUM crinitum (B. K.) . . . . .                 | 15 »          |
| cærulescens (Wall.) . . . . .               | » »           | * ONCIDIUM ampliatus (Lindl.) . . . . .  | 20 »          | Makayi (B. M.) . . . . .                                 | 15 »          |
| humile . . . . .                            | 6 à 10 »      | * altissimum (Sm.) . . . . .             | 6 à 10 »      | * maxillaria (Sw.) . . . . .                             | 10 à 20       |
| moschatum. . . . .                          | » »           | * crispum (Lodd.) . . . . .              | 25 »          | odoratissimum . . . . .                                  | 30 à 50       |
| nobile. . . . .                             | 15 à 30       | Cebolella . . . . .                      | 10 à 20       | * stenochylum (Sw.) . . . . .                            | 10 »          |
| Oncidioidis. . . . .                        | » »           | flexuosum . . . . .                      | 10 à 20       | <i>A notre choix, 20 espèces d'Orchidées.</i>            |               |
| Pierardi. D. cuculatum . . . . .            | 5 à 10 »      | Harrisonianum (Lindl.) . . . . .         | 25 »          | <i>Nach unserer Wahl, 20 Sorten. . . . .</i>             |               |
| * pulchellum (Roxb.) . . . . .              | 6 à 10 »      | luridum . . . . .                        | 10 à 15       | <i>Une chaleur de 12 à 15° Réaumur</i>                   |               |
| * speciosum (Sm.) . . . . .                 | 5 »           | macrochilum . . . . .                    | 15 à 20       | <i>suffit pour les espèces marquées d'un *.</i>          |               |
| EPIDENDRON ciliare (Willd.) . . . . .       | 6 à 10 »      | * papilio (Lindl.) . . . . .             | 20 à 30       | <i>Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur</i>             |               |
| * cochleatum (L.) . . . . .                 | 3 à 5 »       | sciurus . . . . .                        | 35 »          | <i>ist hinlänglich für die mit * bezeichneten Arten.</i> |               |
| * latifolium . . . . .                      | 10 »          | Species de Mexique . . . . .             | 80 à 100      |  |               |




# GRAINES. — Saamen.

|  |                               |   |                                |  |                                |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Graines de Giroflées d'Erfurth.</b><br>30 Variétés très-distinctes.<br><i>Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui nous avons fourni de ces graines les années précédentes, nous engage à les recommander spécialement; nous les tirons directement d'Erfurth.</i><br>Le paquet de 30 variétés assorties . . | fr. c.<br><br><br><br><br>5 » | <b>GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.</b> Perennirende freie Landpflanzen=Saamen.<br>Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .                     | fr. c.<br><br><br><br><br>10 » | Une collection de 50 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . .  | fr. c.<br><br><br><br><br>10 » |
| <b>GRAINES DE PLANTES ANNUELLES D'ORNEMENT.</b> Sommerflor=Saamen.<br>Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach unserer Wahl . . .<br>Une collection de 50 espèces et variétés. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .                              | <br><br><br>10 »<br><br>8 »   | <b>GRAINES FORESTIÈRES.</b> Waldsaamen<br><b>GRAINES FOURRAGÈRES ET DE GRANDE CULTURE.</b> Wiesen= und Feldsaamen.<br><b>GRAINES DE PLANTES DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE.</b> Drangerie= und Warmhauspflanzen=Saamen. | <br><br><br><br><br>           | <b>GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.</b> Zierbäume= und Gesträuch=Saamen in's freie Land.<br>Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .<br><b>Oignons de fleurs de Hollande de toute espèce</b> (voyez le Catalogue spécial). <b>Holländische Blumenzwiebeln von allen Gattungen</b> , wovon ein besonderer Catalog vorhanden ist. | <br><br><br><br><br>10 »       |

## TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdbarten.

*Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.*

*Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.*





## TABLE DES MATIÈRES.

|  | Pages.  |
|--|---------|
| Arbres et arbustes à fruits divers.....            | 8       |
| Arbres et arbustes d'ornement.....                 | 10 à 15 |
| »      »      »      jeunes plants de se-          |         |
| mis et de boutures, au cent et au mille .....      | 15 à 17 |
| Arbres fruitiers divers .....                      | 5 à 8   |
| »      »      leurs prix.....                      | 4       |
| Avis important sur la réception des végétaux ....  | 2       |
| Fougères de serre chaude, tempérée et de pleine    |         |
| terre .....  | 33      |
| Fraisiers .....                                    | 9       |
| Graines diverses .....                             | 35      |
| Orchidées .....                                    | 34      |
| Outils d'horticulture en dépôt .....               | 2       |
| Ouvrages d'horticulture en commission.....         | 2       |
| Palmiers et Cycadées .....                         | 33      |
| Plantes grimpantes de serre chaude et d'orangerie. | 32 à 33 |
| »      potagères diverses .....                    | 9       |
| »      de serre chaude .....                       | 23 à 25 |
| »      »      tempérée et d'orangerie .....        | 25 à 32 |
| »      vivaces de pleine terre .....               | 19 à 22 |
| »      »      »      pour bordures et              |         |
| massifs.....                                       | 22 à 23 |
| Roses.....   | 17 à 19 |
| Terre de bruyère et pour les hortensias bleus .... | 35      |
| Vignes et raisins de table .....                   | 9       |

## Inhalts-Tabelle.

|   | Seite.    |
|---|-----------|
| Erdbeeren .....                                     | 9         |
| Farren-Kräuter für das warme und kalte Haus so wie  |           |
| für's freie Land .....                              | 33        |
| Früchte tragende Bäume und Sträucher .....          | 8         |
| Gartenbücher in Commission .....                    | 2         |
| Garten-Werkzeuge .....                              | 2         |
| Erde, Heidenerde und für blaue Hortensien.....      | 35        |
| Küchengarten-Gewächse .....                         | 9         |
| Obstbäume.....                                      | 5 bis 8   |
| »      deren Preise.....                            | 4         |
| Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen .....             | 25 bis 32 |
| Orchideen .....                                     | 34        |
| Palmen und Cycadeen .....                           | 33        |
| Perennirende und freie Landpflanzen .....           | 19 bis 22 |
| »                                  für Borduren und |           |
| Gruppen .....                                       | 22 bis 23 |
| Rosen .....   | 17 bis 19 |
| Saamen (verschiedene) .....                         | 35        |
| Spinnende Pflanzen für's warme und kalte Haus ....  | 32 bis 33 |
| Warmehaus-Pflanzen .....                            | 23 bis 25 |
| Weinreben und Tafeltrauben .....                    | 9         |
| Wichtige Nachricht über den Empfang der Pflanzen... | 2         |
| Zierbäume und Sträucher in das freie Land .....     | 10 bis 15 |
| »                                  ein-, zwei-      |           |
| und mehrjährige Sämlinge und Stecklinge .....       | 15 bis 17 |





# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer